

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลสาลีสดจากสาธารณรัฐเกาหลี

พ.ศ. ๒๕๖๑

กรมวิชาการเกษตรได้วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชของผลสาลีสดนำเข้าเพื่อการค้าจากสาธารณรัฐเกาหลีเสร็จสิ้นแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ (๒) และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๕ ประกอบกับ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย อธิบดีกรมวิชาการเกษตรโดยคำแนะนำของคณะกรรมการกักพืช จึงออกประกาศเงื่อนไขการนำเข้าผลสาลีสดเพื่อการค้าจากสาธารณรัฐเกาหลี ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลสาลีสดจากสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. ๒๕๖๑”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ชนิดพืชที่อนุญาต

ผลสาลีสด (pear, *Pyrus pyrifolia*)

ข้อ ๔ ศัตรูพืชกักกันที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทยสำหรับผลสาลีสดจากสาธารณรัฐเกาหลี ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ข้อ ๕ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๕.๑ ราชอาณาจักรไทย คือ กรมวิชาการเกษตร

๕.๒ สาธารณรัฐเกาหลี คือ Animal and Plant Quarantine Agency (APQA) ได้รับมอบหมายให้เป็นองค์กรอารักขาพืชแห่งชาติ (National Plant Protection Organization) อย่างเป็นทางการของสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งต่อไปในประกาศนี้จะเรียกว่า “NPPO”

ข้อ ๖ การอนุญาตนำเข้า

ต้องมีใบอนุญาตนำเข้าซึ่งออกให้โดยกรมวิชาการเกษตร

ข้อ ๗ วิธีการขนส่ง

ต้องส่งผลสาลีสดมาจากเมืองท่าแห่งหนึ่งในสาธารณรัฐเกาหลีไปยังเมืองท่าปลายทางในราชอาณาจักรไทยในลักษณะเป็นสินค้าขนส่งทางน้ำหรือทางอากาศ

ข้อ ๘ แหล่งปลูก

ผลสาลีสดต้องเป็นผลผลิตจากสาธารณรัฐเกาหลีและมาจากพื้นที่ซึ่ง NPPO กำหนดให้เป็นแหล่งปลูกสำหรับส่งออกไปยังราชอาณาจักรไทยและกรมวิชาการเกษตรได้ให้การรับรองแล้ว ก่อนที่จะส่งออก

ข้อ ๙ ข้อกำหนดสำหรับสวน

๙.๑ สวนในแหล่งปลูกที่ได้รับอนุญาตที่จะส่งออกผลสาลีสดไปยังราชอาณาจักรไทย ต้องเป็นสวนที่ปลูกเพื่อการค้าและจดทะเบียนไว้กับ NPPO หรือภายใต้ระบบที่ NPPO ให้การรับรอง NPPO ต้องมอบบันทึกรายละเอียดการจดทะเบียนสวนให้แก่กรมวิชาการเกษตรเมื่อได้รับการร้องขอ และต้องดำเนินการจดทะเบียนสวนให้เสร็จสิ้นก่อนเริ่มการส่งออก

๙.๒ เกษตรกรเจ้าของสวนที่จดทะเบียนต้องมีการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีในสวน โดยต้องรักษาความสะอาดสวน และต้องมีการบริหารจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน หรือมีมาตรการอื่น ๆ ในการควบคุมศัตรูพืช ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทยได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม

๙.๓ เกษตรกรต้องเก็บรักษาบันทึกการบริหารจัดการ การติดตามประชากรศัตรูพืช และการควบคุมศัตรูพืชที่ดำเนินการในสวนที่จดทะเบียนตลอดฤดูกาลปลูก และต้องมอบข้อมูลเหล่านี้ให้แก่ NPPO และกรมวิชาการเกษตรเมื่อได้รับการร้องขอ

ข้อ ๑๐ ข้อกำหนดสำหรับโรงคัดบรรจุผลไม้

๑๐.๑ NPPO ต้องจดทะเบียนและติดตามตรวจสอบโรงคัดบรรจุผลไม้ที่จะส่งออกผลสาลีสดไปยังราชอาณาจักรไทย ต้องมอบบันทึกรายละเอียดการจดทะเบียนโรงคัดบรรจุผลไม้ให้แก่กรมวิชาการเกษตรเมื่อได้รับการร้องขอ และต้องดำเนินการจดทะเบียนโรงคัดบรรจุผลไม้ให้เสร็จสิ้นก่อนเริ่มการส่งออก

๑๐.๒ โรงคัดบรรจุผลไม้ที่จดทะเบียนต้องนำผลสาลีสดมาจากสวนที่จดทะเบียนในแหล่งปลูกที่กำหนดเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถดำเนินการทวนสอบย้อนกลับแหล่งที่มาได้อย่างรวดเร็ว ต้องเก็บบันทึกรายชื่อของเกษตรกรเจ้าของสวนซึ่งส่งออกผลไม้ไปยังราชอาณาจักรไทย และต้องมอบข้อมูลเหล่านี้ให้แก่ NPPO และกรมวิชาการเกษตรเมื่อได้รับการร้องขอ

๑๐.๓ โรงคัดบรรจุผลไม้ต้องจัดทำเอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งแสดงรายละเอียดขั้นตอนเกี่ยวกับการคัดขนาด การจัดการ และการบรรจุ

๑๐.๔ NPPO ต้องดำเนินการตรวจสอบระบบของโรงคัดบรรจุผลไม้ก่อนจดทะเบียนโรงคัดบรรจุผลไม้ และต้องตรวจสอบระบบเป็นประจำทุกปี โรงคัดบรรจุผลไม้ต้องรับผิดชอบในการเก็บรักษาข้อมูลต่าง ๆ ทั้งหมด

๑๐.๕ การตรวจผลสาลีสดว่าปราศจากศัตรูพืชกักกันต้องดำเนินการภายในโรงคัดบรรจุผลไม้ที่จดทะเบียน

ข้อ ๑๑ ข้อกำหนดสำหรับบรรจุภัณฑ์และฉลาก

๑๑.๑ ต้องบรรจุผลสาลีสดในบรรจุภัณฑ์ซึ่งใหม่และสะอาดเท่านั้น และต้องปราศจากแมลงที่มีชีวิต ดิน ทราาย และไม่มี การปะปนของชิ้นส่วนของพืชอื่น เช่น ใบ กิ่งก้าน เมล็ด เศษซากพืช เป็นต้น หรือสิ่งอื่นใดที่มีศักยภาพนำพาศัตรูพืชกักกันได้

๑๑.๒ ผลสาลีสดต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่ป้องกันศัตรูพืชได้ เพื่อให้สินค้ามีความปลอดภัยตามหลักการกักกันพืช เมื่อมาถึงราชอาณาจักรไทย

๑๑.๓ ต้องแสดงข้อมูลที่จำเป็นบนบรรจุภัณฑ์เพื่อให้การทวนสอบย้อนกลับแหล่งที่มา เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว แต่อย่างไรก็ตาม อย่างน้อยที่สุดต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้เป็นภาษาอังกฤษ บนแต่ละบรรจุภัณฑ์ ได้แก่

- ผลผลิต หรือผลผลิตของเกาหลี่
- ชื่อบริษัทส่งออก
- ชื่อผลไม้
- หมายเลขทะเบียนโรงคัดบรรจุผลไม้
- หมายเลขทะเบียนสวน

๑๑.๔ ในกรณีส่งออกผลสาลีสดมายังราชอาณาจักรไทยโดยบรรจุในบรรจุภัณฑ์ แยกเป็นกล่องไม่ได้มัดรวมกัน ต้องมีข้อความต่อไปนี้ “EXPORT TO THAILAND” ปรากฏ อย่างชัดเจนบนบรรจุภัณฑ์แต่ละกล่อง แต่อย่างไรก็ดี ในกรณีบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่ถูกมัดรวมกันวางบน แท่นวางในตู้ขนส่งสินค้าอนุญาตให้มีข้อความต่อไปนี้ “EXPORT TO THAILAND” ปรากฏ อย่างชัดเจนบนแต่ละด้านได้

๑๑.๕ ผลสาลีสดที่จะส่งออกไปยังราชอาณาจักรไทยโดยมีการใช้บรรจุภัณฑ์ ที่ทำจากไม้ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรการสุขอนามัยพืช ที่เกี่ยวข้อง

ข้อ ๑๒ การตรวจสอบส่งออก

๑๒.๑ ต้องตรวจสอบผลสาลีสดก่อนส่งออกตามกระบวนการที่เหมาะสมอย่างเป็นทางการ และต้องปราศจากศัตรูพืชกักกันตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

๑๒.๒ ในกรณีตรวจพบศัตรูพืชกักกันที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ต้องกำจัดศัตรูพืชเหล่านั้นด้วยวิธีที่เหมาะสม (ถ้ามีวิธีการกำจัด) หรือปฏิเสธการส่งออก

ข้อ ๑๓ การรับรองสุขอนามัยพืช

๑๓.๑ ต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชซึ่งออกให้โดย NPPO กำกับมาด้วย โดยต้นฉบับใบรับรองสุขอนามัยพืชต้องแนบมาพร้อมกับสินค้าทุกครั้งที่จะส่งไปยังราชอาณาจักรไทย และต้องระบุข้อความเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

“ The consignment of pear fruit was produced and prepared for export in accordance with the conditions for import of pear fruit from Korea to Thailand.”

๑๓.๒ ในกรณีขนส่งทางน้ำ ต้องระบุหมายเลขตู้ขนส่งสินค้าและหมายเลขฉลากปิดตู้ขนส่งสินค้าในใบรับรองสุขอนามัยพืช

ข้อ ๑๔ การตรวจนำเข้า

๑๔.๑ เมื่อผลสาลีสดมาถึงด่านนำเข้าในราชอาณาจักรไทย การตรวจนำเข้าจะดำเนินการหลังจากพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของเอกสารทั้งหมดที่แนบมาพร้อมกับสินค้า

๑๔.๒ สินค้าที่ส่งมอบทั้งหมดต้องปราศจากแมลงที่มีชีวิต อาการของโรคพืช เมล็ดพืชที่ปนเปื้อน ดิน ขยะ และเศษซากอื่น ๆ เมื่อมาถึงราชอาณาจักรไทย

๑๔.๓ พนักงานเจ้าหน้าที่จะเก็บตัวอย่างผลสาลีสดและตรวจสอบเพื่อยืนยันว่ามีศัตรูพืชหรือไม่ ถ้าตรวจพบศัตรูพืชมีชีวิตจะส่งตัวอย่างศัตรูพืชไปยังห้องปฏิบัติการเพื่อจำแนกชนิดและต้องกักผลไม้ไว้จนกว่าจะทราบผลจากห้องปฏิบัติการ

๑๔.๔ ถ้ามีผลสาลีสดจำนวนน้อยกว่า ๑,๐๐๐ ผล ต้องเก็บตัวอย่างตรวจจำนวน ๔๕๐ ผล หรือตรวจทั้งหมด ถ้ามีจำนวนเท่ากับหรือมากกว่า ๑,๐๐๐ ผล ต้องเก็บตัวอย่างตรวจจำนวน ๖๐๐ ผล

๑๔.๕ ในกรณีตรวจพบศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทยตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ระหว่างการตรวจนำเข้าผลสาลีสด ต้องกำจัดศัตรูพืชเหล่านั้นด้วยวิธีที่เหมาะสม (ถ้ามีวิธีการกำจัด) ส่งกลับ หรือทำลาย โดยผู้นำเข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

๑๔.๖ ในกรณีตรวจพบสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่ไม่มีรายชื่อปรากฏในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ที่มีศักยภาพเป็นศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทย ต้องกำจัดศัตรูพืชเหล่านั้นด้วยวิธีที่เหมาะสม (ถ้ามีวิธีการกำจัด) ส่งกลับ หรือทำลาย โดยผู้นำเข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย กรมวิชาการเกษตรมีสิทธิระงับการนำเข้าเป็นการชั่วคราว จนกว่าการประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชที่ตรวจพบนั้นได้ดำเนินการแล้วเสร็จ

๑๔.๗ กรมวิชาการเกษตรมีสิทธิสั่งให้ส่งผลสาลีสดกลับหรือทำลาย โดยผู้นำเข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ถ้าพบกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้เกิดขึ้น

๑๔.๗.๑ ประตูดูขนส่งสินค้าปิดไม่สนิท

๑๔.๗.๒ ฉลากปิดตู้ขนส่งสินค้าถูกทำลาย หรือถูกสับเปลี่ยน หรือหมายเลขไม่ตรงตามที่ระบุไว้ในใบรับรองสุขอนามัยพืช

๑๔.๗.๓ ฉลากบนบรรจุภัณฑ์ไม่มี ไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์

ข้อ ๑๕ การประเมินกระบวนการส่งออก

๑๕.๑ การส่งออกผลผลิตที่สกัดจากสาธารณรัฐเกาหลีไปยังราชอาณาจักรไทย จะเริ่มดำเนินการได้หลังจากที่กรมวิชาการเกษตรได้ทำการประเมินกระบวนการตรวจรับรองส่งออกของสาธารณรัฐเกาหลีแล้วเท่านั้น โดยสาธารณรัฐเกาหลีต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

๑๕.๒ ในกรณีที่มีการระงับการนำเข้าหรือการนำเข้าไม่เป็นไปตามที่กำหนด กรมวิชาการเกษตรอาจส่งพนักงานเจ้าหน้าที่เดินทางไปประเมินกระบวนการตรวจรับรองส่งออกในสาธารณรัฐเกาหลี แล้วแต่กรณี ก่อนจะตัดสินใจอนุญาตให้นำเข้าได้อีกต่อไป โดยสาธารณรัฐเกาหลีต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

รายชื่อศัตรูพืชที่ชุกกันของผลสาาลีสดจากสาธารณรัฐเกาหลี
 แนบท้ายประกาศกรมวิชาการเกษตร
 เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลสาาลีสดจากสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. ๒๕๖๑

| ชื่อวิทยาศาสตร์ | ชื่อสามัญ |
|----------------------------------|-------------------------|
| แมลง | |
| Order Coleoptera | |
| Family Attelabidae | |
| <i>Rhynchites foveipennis</i> | Korean pear weevil |
| <i>Rhynchites heros</i> | peach curculio |
| Order Hemiptera | |
| Family Aphididae | |
| <i>Eriosoma lanigerum</i> | woolly pear aphid |
| <i>Hyalopterus pruni</i> | mealy plum aphid |
| Family Coccidae | |
| <i>Ceroplastes japonicus</i> | tortoise wax scale |
| <i>Parthenolecanium corni</i> | European fruit lecanium |
| Family Diaspididae | |
| <i>Lepidosaphes conchiformis</i> | fig oystershell scale |
| <i>Lepidosaphes ulmi</i> | pear mussel scale |
| <i>Lopholeucaspis japonica</i> | pear white scale |
| <i>Pseudaonidia duplex</i> | camphor scale |
| <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> | mulberry scale |
| Family Pemphigidae | |
| <i>Prociphilus kuwanai</i> | Kuwana pear aphid |
| Family Pentatomidae | |
| <i>Dolycoris baccarum</i> | sloe bug |
| Family Pseudococcidae | |
| <i>Crisicoccus matsumotoi</i> | Matsumoto mealybug |
| <i>Dysmicoccus wistariae</i> | pear mealybug |

| ชื่อวิทยาศาสตร์ | ชื่อสามัญ |
|-------------------------------|--------------------------|
| <i>Phenacoccus aceris</i> | apple mealybug |
| <i>Planococcus kraunhiae</i> | Japanese mealybug |
| Family Psyllidae | |
| <i>Cacopsylla pyrisuga</i> | pear sucker |
| Order Hymenoptera | |
| Family Carposinidae | |
| <i>Carposina sasakii</i> | peach fruit moth |
| Family Gracillariidae | |
| <i>Spulerina astaurota</i> | pear barkminer |
| Family Lymantriidae | |
| <i>Orgyia antiqua</i> | European tussock moth |
| Family Pyralidae | |
| <i>Acrobasis pyrivorella</i> | pear fruit moth |
| <i>Nephoterix bicolorella</i> | pear red-striped pyralid |
| <i>Ostrinia scapularis</i> | adzuki bean borer |
| Family Tortricidae | |
| <i>Adoxophyes orana</i> | summer fruit tortrix |
| <i>Archips breviplicanus</i> | Asiatic leafroller |
| <i>Archips crataegana</i> | brown oak tortrix |
| <i>Archips fuscocupreanus</i> | apple tortrix |
| <i>Archips xylosteanus</i> | apple leaf roller |
| <i>Grapholita dimorpha</i> | plum fruit moth |
| <i>Grapholita molesta</i> | oriental fruit moth |
| <i>Pandemis heparana</i> | brown tortrix |
| <i>Spilonota albicana</i> | white fruit moth |
| <i>Spilonota ocellana</i> | eye-spotted bud worm |
| Family Yponomeutidae | |
| <i>Argyresthia conjugella</i> | pear fruit moth |
| Order Thysanoptera | |

| ชื่อวิทยาศาสตร์ | ชื่อสามัญ |
|------------------------------------|----------------------|
| Family Thripidae | |
| <i>Taeniothrips inconsequens</i> | pear thrips |
| ไร | |
| Order Trombidiformes | |
| Family Eriophyidae | |
| <i>Epitrimerus pyri</i> | pear rust mite |
| <i>Amphitetranychus viennensis</i> | hawthorn spider mite |
| <i>Bryobia praetiosa</i> | clover mite |
| <i>Panonychus ulmi</i> | European red mite |
| เชื้อสาเหตุโรคพืช | |
| แบคทีเรีย | |
| <i>Erwinia pyrifoliae</i> | shoot blight |
| รา | |
| <i>Alternaria gaisen</i> | leaf spot |
| <i>Botryosphaeria obtusa</i> | pear black rot |
| <i>Diaporthe eres</i> | Phomopsis rot |
| <i>Gibberella avenacea</i> | bud rot |
| <i>Gymnosporangium asiaticum</i> | Japanese pear rust |
| <i>Gymnosporangium shiraianum</i> | pear-juniper rust |
| <i>Monilinia fructicola</i> | brown rot |
| <i>Monilinia fructigena</i> | brown rot |
| <i>Monilinia laxa</i> | blossom blight |
| <i>Mycosphaerella pomi</i> | black spot |
| <i>Neonectria ditissima</i> | European canker |
| <i>Phyllachora pomigena</i> | sooty blotch |
| <i>Venturia nashicola</i> | Japanese pear scab |
| <i>Venturia pyrina</i> | pear scab |
| <i>Amphitetranychus viennensis</i> | hawthorn spider mite |
| <i>Bryobia praetiosa</i> | clover mite |
| <i>Panonychus ulmi</i> | European red mite |

| ชื่อวิทยาศาสตร์ | ชื่อสามัญ |
|-----------------------------------|--------------------|
| เชื้อสาเหตุโรคพืช | |
| แบคทีเรีย | |
| <i>Erwinia pyrifoliae</i> | shoot blight |
| รา | |
| <i>Alternaria gaisen</i> | leaf spot |
| <i>Botryosphaeria obtusa</i> | pear black rot |
| <i>Diaporthe eres</i> | Phomopsis rot |
| <i>Gibberella avenacea</i> | bud rot |
| <i>Panonychus ulmi</i> | European red mite |
| เชื้อสาเหตุโรคพืช | |
| แบคทีเรีย | |
| <i>Erwinia pyrifoliae</i> | shoot blight |
| รา | |
| <i>Alternaria gaisen</i> | leaf spot |
| <i>Botryosphaeria obtusa</i> | pear black rot |
| <i>Diaporthe eres</i> | Phomopsis rot |
| <i>Gibberella avenacea</i> | bud rot |
| <i>Gymnosporangium asiaticum</i> | Japanese pear rust |
| <i>Gymnosporangium shiraianum</i> | pear-juniper rust |
| <i>Monilinia fructicola</i> | brown rot |
| <i>Monilinia fructigena</i> | brown rot |
| <i>Monilinia laxa</i> | blossom blight |
| <i>Mycosphaerella pomi</i> | black spot |
| <i>Neonectria ditissima</i> | European canker |
| <i>Phyllachora pomigena</i> | sooty blotch |
| <i>Venturia nashicola</i> | Japanese pear scab |
| <i>Venturia pyrina</i> | pear scab |