

การสำรวจรวมและจัดการแมลงศัตรูขิง

Surveys and Management Insect Pests of Ginger

นางลัดดาวลัย อินทร์สังข์^{๑/} นายสมศักดิ์ ศิริผลตั้งมั่น ^{๒/} นางจิตอาภา ชุมเชย^{๓/}

บทคัดย่อ

การสำรวจแมลงศัตรูที่เข้าทำลายขิงโดยการสำรวจในแปลงปลูกขิง และในแหล่งรับซื้อ ในจังหวัด เพชรบูรณ์ เลย และเชียงราย พบรแมลงที่เข้าทำลายในแปลงปลูก คือ หนอนกระทู้ผัก (common cutworm; *Spodoptera litura*) หนอนม้วนใบ (skipper butterfly) หนอนเจาะยอดและลำต้น (shoot and stem borer; *Conogethes punctiferalis*) เพลี้ยไฟ (thrips), เพลี้ยแปঁ (mealy bug), เพลี้ยอ่อน (aphid) ไร (mite) เพลี้ยหอย (scale insect) และหนอนด้วง(ยังไม่ทราบชนิด) ส่วนแมลงที่พบในแหล่งรับซื้อ คือเพลี้ยแปঁ เพลี้ยหอย หนอนแมลงวัน (rhizome moggot) นอกจากนี้ยังพบได้อีกหลายชนิดอีกด้วย

^{๑/} สถาบันวิจัยพืชสวน

^{๒/} สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

^{๓/} ศูนย์วิจัยพัฒนาเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์

๑. คำนำ

ขิง (Ginger; *Zingiber officinale* Rosc.) เป็นพืชล้มลุก ในเดียว มีลำต้น อยู่ในวงศ์ Zingiberaceae นิยมนิยมนำไปใช้ในด้านปรุงอาหาร สมุนไพร และด้านการแพทย์ เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีศักยภาพในการส่งออก มีมูลค่า การส่งออกเพิ่มขึ้นทุกปี ปัจจุบันมีรายงานเกี่ยวกับแมลงศัตรูที่เข้าทำลายขิงอยมาก เนื่องจากยังไม่ค่อยพบมีการ ระบาดทำลายอย่างรุนแรงของแมลงศัตรูขิง จึงมีการสำรวจและรายงานเกี่ยวกับแมลงศัตรูขิงไม่มากนัก ดังนั้นการ ทำการสำรวจชนิดของแมลงศัตรูขิงมีความสำคัญที่จะทำให้ทราบถึง แมลงศัตรูขิงที่พบเข้าทำลายในแหล่งปลูก ขิงที่สำคัญเพื่อเป็นข้อมูล และแนวทางในการห้าวห้ามในการป้องกันกำจัดต่อไป

๒. วิธีดำเนินการ

- อุปกรณ์

- แปลงขิง
- อุปกรณ์เก็บตัวอย่างแมลง เช่น ขวดขนาดเล็ก กล่องเลี้ยงแมลง แอลกอฮอล์ ฯลฯ
- อุปกรณ์บันทึกข้อมูลต่างๆ

- วิธีการ

ทำการสำรวจแมลงและเก็บตัวอย่างแมลงที่พบเข้าทำลายในแปลงขิงและในแหล่งรับซื้อขิงทุก ๒ สัปดาห์ และทำการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกขิง และผู้ประกอบการรับซื้อขิง เก็บอย่างต่อเนื่องติดต่อกันตาม ฤดูกาลการปลูกขิงในพื้นที่ต่างๆ เพื่อตรวจ ชนิด ระยะ ปริมาณ และการเข้าทำลายของแมลงศัตรูพร้อมทั้งเก็บ ตัวอย่างแมลงที่พบมาศึกษาที่ห้องปฏิบัติการ ทำการศึกษาชนิดของศัตรูขิง และหาแนวทางป้องกันกำจัด เพื่อให้ได้วิธีการที่ดีถูกต้องเหมาะสม

- การบันทึกข้อมูล

- บันทึกชนิดแมลงที่พบเข้าทำลายขิง
- บันทึกตัวอย่างแมลงหาชื่อวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง
- บันทึกภาพรูปร่างลักษณะแมลงที่เข้าทำลายและลักษณะการทำลายขิง
- หาวิธีการป้องกันกำจัดที่เหมาะสม

- เวลาและสถานที่

- ตุลาคม ๒๕๕๓ – กันยายน ๒๕๕๖
- สถานที่ทำการทดลอง: แปลงปลูกขิง และแหล่งรับซื้อขิง จังหวัดเลย จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัด เชียงราย จังหวัดเชียงใหม่

๓. ผลการทดลองและวิจารณ์

การสำรวจแมลงในแหล่งปลูกขิง แหล่งรับซื้อ และสัมภาษณ์เกษตรกรและผู้ประกอบการรับซื้อ ในแหล่งปลูกขิงจังหวัดเลย เพชรบูรณ์ เชียงใหม่ และเชียงราย ในเรื่องปัญหาแมลงศัตรูขิง ที่เข้าทำลายใน แปลงขิงนั้น โดยส่วนใหญ่ปัญหาในเรื่องของแมลงในแปลงปลูกจะพบไม่มาก เกษตรกรยังไม่ให้ความสำคัญใน เรื่องของแมลงที่เข้าทำลาย ถ้าไม่พบการเข้าทำลายที่ทำให้ผลผลิตเสียหาย หรือเห็นอย่างเด่นชัด และเกษตรกร มีการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดแมลงในแปลงปลูกน้อยมาก ปัญหาที่เกษตรกรผู้ปลูกขิงส่วนใหญ่พบว่าเป็นปัญหา

ใหญ่ในการปลูกขิง คือปัญหาของโรคเที่ยวชิง ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย *Ralstonia solonacearum* ซึ่งพบทำความเสียหายให้กับเกษตรกรผู้ปลูกขิงเป็นอย่างมาก

แมลงศัตรูที่พบเข้าทำลายขิงที่สำรวจพบในแปลงปลูก พบร่วมกับแมลงที่เข้าทำลายขิง คือ หนอนกระทุ้นผัก (common cutworm; *Spodoptera litura*) เข้าทำลายกัดกินใบขิง หนอนม้วนใบ (skipper butterfly) มีการทำลายโดยนำใบขิงมาบดเป็นกรวยและตัวหนอนกัดกินอยู่ภายในกรวย หนอนเจาะยอดและลำต้น (shoot and stem borer; *Conogethes punctiferalis*) จะเข้าทำลายในส่วนของยอดอ่อน และลำต้นขิง โดยเข้าไปกัดกินยอด และลำต้นทำให้ต้นขิงแห้งตายได้ เพลี้ยไฟ (thrips), เพลี้ยแปঁ (mealy bug), เพลี้ยอ่อน (aphid) และไร (mite) เข้าทำลายดูดกินน้ำเลี้ยงบริเวณใบขิง นอกจากนี้แมลงที่พบรับเข้าทำลายแรงขึ้นที่ผลผันติน คือ เพลี้ยแปঁ และเพลี้ยหอย (scale insect)

นอกจากนี้ในช่วงปลายปี ๒๕๕๖ พบร่วมกับเกษตรกรใน อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรายพบหนอนด้วง (ยังไม่ทราบชนิด) เข้าทำลายกัดกินภายนอกขิง ทำให้ขิงเกิดความเสียหายและด้อยคุณภาพ

ส่วนการสำรวจและสัมภาษณ์ผู้ประกอบการรับซื้อขิง ตามแหล่งรับซื้อขิงในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ เลย และเชียงรายนั้น พบร่วมกับ พบรับซื้อ แมลงที่ติดอยู่บนแรงขิง ซึ่งผู้รับซื้อจะทำการล้างโดยจะใช้การฉีดด้วยเครื่องฉีดน้ำที่มีแรงดันสูงเพื่อล้างดินและแมลงที่ติดอยู่ที่แรงขิง และใช้แรงงานคนในการขัด และตกแต่ง แรงขัดเพื่อเอาแมลงที่ติดตามแรงขิงออกอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ยังพบหนอนแมลงวัน (rhizome fly) เข้าทำลายแรงขิง ทำให้แรงขิงเสียหาย (ตารางที่ ๑)

และการสำรวจที่แหล่งรับซื้อที่จังหวัดเชียงราย พบร่วมกับคุณภาพของขิงที่จะส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ แรงขิง ซึ่งติดมาจากแหล่งปลูกซึ่งเป็นปัญหา กับคุณภาพของขิงที่จะส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ

การใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูขิง พบร่วมกับ การใช้สารพูรดา丹 รองกันหลุมก่อนทำการปลูกขิง เพื่อป้องกันปัญหาแมลงเข้าทำลายหัวพันธุ์ขิงในดิน และแมลงศัตรูขิงหลังจากขิงออก ส่วนผู้รับซื้อในทุกเขตจะปฏิเสธไม่มีการใช้สารกำจัดแมลงและมีการสร้างโดยใช้น้ำฉีดล้างและใช้แรงงานคนในการขัด และตัดแต่งส่วนของแรงขิงที่มีปัญหาอักเสบ ไม่จำเป็นต้องใช้สารกำจัดแมลง

จากการสำรวจแมลงที่พบรับเข้าทำลายขิงในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ เลย และเชียงราย พบร่วมหลายชนิดมีการรายงานว่าเป็นแมลงศัตรูที่สำคัญ (Major pest) ที่พบรับเข้าทำลายขิงในประเทศไทยเดียว คือ หนอนเจาะยอดและเจาะลำต้นขิง *Conogethes punctiferalis*, เพลี้ยหอย (Abdulla et al, ๑๙๗๑ and Azad Thakur et al. , ๒๐๑๒) นอกจากนี้ *C. punctiferalis* ยังมีรายงานว่าเป็นแมลงศัตรูขิงที่สำคัญที่ disbursed ทำความเสียหายในแหล่งปลูกขิงในเขตเอเชีย แอฟริกา อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ และออสเตรเลีย (Devasabaryam and Koya, ๒๐๐๕)

ตารางที่ ๑ รายชื่อแมลงที่พบเข้าทำลายขิงในเขต จังหวัดเพชรบูรณ์ เลย และเชียงราย

ชนิดแมลง	ชื่อสามัญ	การทำลาย
แปลงปลูก		
หนอนกระทู้ผัก	common cutworm	กัดกินใบ
หนอนม้วนใบ	skipper butterfly	ม้วนใบเป็นกรวยกัดกินอยู่ภายใน
หนอนเจ้ายอดและลำต้น	shoot and stem borer	เจ้ายอดและลำต้นกัดกินอยู่ภายใน
เพลี้ยไฟ	thrip	ดูดกินน้ำเลี้ยงบริเวณใบ
เพลี้ยอ่อน	aphid	ดูดกินน้ำเลี้ยงบริเวณใบ
เพลี้ยแป้ง	mealy bug	ดูดกินน้ำเลี้ยงบริเวณใบและ莖
เพลี้ยหอย	rhizome scale	ดูดกินน้ำเลี้ยง莖
หนอนด้วง(ยังไม่ทราบชนิด)	-	เจาะ莖กัดกินอยู่ภายใน莖
แหล่งรับซื้อ		
เพลี้ยแป้ง	mealy bug	ดูดกินน้ำเลี้ยง莖
เพลี้ยหอย	rhizome scale	ดูดกินน้ำเลี้ยง莖
หนอนแมลงวัน	rhizome maggot	กัดกิน莖ทำให้莖เน่า爛

๙. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ

จากการสำรวจแมลงศัตรูขิงที่เข้าทำลายทั้งในแปลงปลูกขิง และในแหล่งรับซื้อ พบแมลงที่ทำลายในแปลงปลูกขิงคือหนอนกระทู้ผัก หนอนม้วนใบ หนอนเจ้ายอดและลำต้น เพลี้ยไฟ เพลี้ยแป้ง เพลี้ยอ่อน เพลี้ยหอย ไส้เดือนฝอย และไร ส่วนในแหล่งรับซื้อพบ เพลี้ยหอย เพลี้ยแป้ง หนอนแมลงวัน และไส้เดือนฝอย



ภาพที่ ๑ ดักแด้ และตัวเต็มวัย หนอนเจ้ายอดและลำต้น *Conogethes punctiferalis*



ภาพที่ ๒ หนอน ลักษณะการทำลาย ดักแด้ และตัวเต็มวัย Skipper butterfly



ภาพที่ ๓ เพลี้ยหอย Rhizome scale



ภาพที่ ๔ เพลี้ยแป้ง (mealy bug)



ภาพที่ ๕ หนอนด้วงทำลายแรงขิง



ภาพที่ ๖ การล้างและตัดแต่งแรงขิงที่จุดรับซื้อ

๑๐. การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

เป็นข้อมูลให้กับนักวิชาการและเกษตรกรผู้ปลูกขิงทราบถึงชนิดของแมลงศัตรูขิงที่มีพบเข้าทำลายในขิง ทั้งในแปลงปลูกและในแหล่งรับซื้อ เพื่อศึกษาและหาแนวทางในการป้องกันกำจัดหากพบมีการระบาดมากยิ่งขึ้น

๑๑. คำขอบคุณ

ขอขอบคุณ คุณจุฑามาศ ณ น่าน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย และนักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ ทุกท่าน ที่ช่วยในการสำรวจ และสัมภาษณ์เกษตรกร และผู้รับซื้อ จนทำให้งานวิจัยสำเร็จได้

๑๒. เอกสารอ้างอิง

Abdulla KoYa, K. M., Devasahayam, S. and Prem Kumar, T.. ๑๙๗๑. Insect Pests of Ginger (*Zingiber officinale* Rosc.) and Turmeric (*Curcuma longa* Linn.) in India. Journal of Plantation Crops ๑๙ (๑) : ๑-๓

Azad Thakur, N. S., Firake, D. M., Behere, G. T., Firake, P. D. and Saikia, K.. ๒๐๑๒. Biodiversity of Agriculturally Important Insects in North Eastern Himalaya: An Overview. Indian Journal of Hill Farming ๒๕(๒): ๓๗-๔๐

Devasabaryam, S. and Koya, K.. 2002. Insect Pests of Ginger. *In* Ginger: The Genus Zingiber.

Ravindran, P and Babu, K (Eds.). Florida, USA: CRC Press. Pp 367-387.