

ศึกษาโรคและแมลงที่สำคัญสำหรับโกโก้สายพันธุ์ต่างๆที่เหมาะสมสำหรับทำของโกอเลต

Survey and Study on Pest and Diseases Cocoa

นางสาวดารารากร เผ่าชู^๑ นางสาวประภาพร ฉันทานุมัติ^๒ นางสาวสุนัดดา เชาวลิตตร^๓ นายไพรัตน์ ช่วยเต็ม^๔

บทคัดย่อ

จากการสำรวจและเก็บตัวอย่างโรคและแมลงศัตรูโกโก้ ในแปลงโกโก้ลูกผสมจำนวน ๕ สายพันธุ์ ภายในศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร จังหวัดชุมพรประกอบด้วยสายพันธุ์ ICS ๖, ICS ๔๐, ICS ๙๕, UF ๖๗๖ และ ชุมพรลูกผสม ๑ (Paot x Naom) ซึ่งขณะนี้ต้นโกโก้อายุประมาณ ๔ ปี โดยทำการสำรวจทุกเดือน โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึง กันยายน ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี พบว่า เกิดโรคผลเน่าดำ (Black Pod Rot) สร้างความเสียหายต่อผลผลิตประมาณ ๕ เปอร์เซ็นต์ ของผลผลิตทั้งหมด เนื่องจากส่วนใหญ่จะเข้าทำลายเมื่อผลมีขนาดใหญ่แล้ว ไม่มีผลกระทบต่อเมล็ดภายใน พบระบาดมากในช่วงเดือนตุลาคม-พฤษจิกายน เนื่องจากแปลงมีสภาพอากาศชื้น จากการสำรวจ พบแมลงศัตรูโกโก้หลากหลายชนิด ได้แก่แมลงใน อันดับ Hemiptera ๑๐ ชนิด อันดับ Coleoptera ๘ ชนิด อันดับ Lepidoptera ๕ ชนิด และอันดับ Orthopthera ๒ ชนิด แต่ละชนิดจะมีลักษณะการเข้าทำลาย และสร้างความเสียหายให้แก่โกโก้แตกต่างกัน แมลงศัตรูโกโก้ที่สำคัญ ได้แก่ มวนยุงโกโก้ (Cocoa mired, Mosquito bug) เป็นแมลงศัตรูโกโก้ที่สำคัญที่สุด จากการสำรวจพบความเสียหายประมาณ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ของผลผลิต อีก ๓๐ เปอร์เซ็นต์ พบการเข้าทำลาย แต่เกิดความเสียหายเฉพาะบริเวณผิวผลเท่านั้น เมล็ดภายในสามารถนำไปหมักได้ พบระบาดมากในเดือนพฤษภาคม -พฤษจิกายน เนื่องจากมีฝนตกชุกสภาพแปลงมีความชื้นสูง ดังกัดกินใบ ที่สำคัญ ๓ ชนิด คือ *Astycus lateralis* Fabricius, *Sepiomus* sp. และ *Platytrachelus paviei* Marshall ทำความเสียหายมากในระยะที่โกโก้กำลังแตกใบอ่อน ระบาดมากในฤดูฝน ช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม พบการเข้าทำลายประมาณ ๔๐ เปอร์เซ็นต์ของใบอ่อนที่แตกใหม่ จากการสำรวจหนอน พบหนอนปลอกมากที่สุด เข้าทำลายโดยการกัดกินใบเป็นรูๆ หากระบาดมากจะพบเป็นรูทั้งใบและจะทำให้ใบร่วงหล่นไป หนอนบุ้ง จะกัดกินใบและยอดอ่อน และหนอนร้านกินใบ แทรกกินแต่ผิวใบ แต่พบในปริมาณน้อย นอกจากนี้ยังมี พวง Hemiptera คือ เพลี้ยกระโดดปีกหุบสีขาว (White moth cicada) เพลี้ยกระโดด (Planthoppers) เพลี้ยอ่อนสีดำ (Black aphid) เพลี้ยแปঁแปঁ เพลี้ยแปঁสำลี (Icerya mealybug) จักจั่นขา (Treehopper) จักจั่นขาสกุล *Tricentrus* และเพลี้ยจักจั่นแดง (Red leafhopper) ดูดกินน้ำเลี้ยงจากส่วนต่างๆ ของโกโก้ แต่พบในปริมาณน้อย ไม่สร้างความเสียหายระดับเศรษฐกิจให้กับโกโก้

^๑ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร

^๒ สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

คำนำ

ปัญหาเรื่องโรคและแมลงศัตรูโกโก้ เป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่ง ในการผลิตโกโก้ให้มีคุณภาพ และได้ปริมาณผลผลิตตามต้องการ หากมีปัจจัยให้โรคและแมลงศัตรูเข้าทำลายถึงขั้นระบาด โดยไม่มีการป้องกันจำกัดได้อย่างทันท่วงที อาจส่งผลกระทบต่อผลผลิต ทำให้ผลผลิตลดลงมากกว่า ๕๐ เปอร์เซ็นต์ ของผลผลิตรวม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความรุนแรงในการระบาดของโรคและแมลงนั้น ๆ โดยเฉพาะสภาพอากาศในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและเป็นไปอย่างรวดเร็ว แต่โรคและแมลงกลับสามารถปรับตัวเพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง

ไปในปัจจุบันนี้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าอาจจะสามารถปรับตัวได้เร็วกว่าพืช ส่งผลให้เกิดการระบาดของโรค และแมลงศัตรูอย่างรวดเร็วและมีความรุนแรงแตกต่างจากในอดีต ดังนั้นจึงได้ทำการสำรวจและศึกษาถึงโรคและแมลงศัตรูโกโก้ เพื่อเฝ้าระวังและสามารถทำการป้องกันกำจัดให้ได้ก่อน เพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับโกโก้ สายพันธุ์ทำซื้อคโกรเล็ต

วิธีดำเนินการ

อุปกรณ์

๑. แปลงโกโก้สายพันธุ์ต่าง ๆ จำนวน ๕ สายพันธุ์ ประกอบด้วยสายพันธุ์ ICS ๖, ICS ๔๐, ICS ๙๕, UF ๖๗/๖ และ ชุมพร ลูกผสม ๑ ($P_{a7} \times N_{a32}$)
๒. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างโรคและแมลง
๓. กล้องถ่ายรูป

วิธีการ

๑. สำรวจและเก็บตัวอย่างโรคและแมลงศัตรูโกโก้ ลูกผสมจำนวน ๕ สายพันธุ์ ประกอบด้วยสายพันธุ์ ICS ๖, ICS ๔๐, ICS ๙๕, UF ๖๗/๖ และ ชุมพร ลูกผสม ๑ ($P_{a7} \times N_{a32}$) ต้นโกโก้อายุประมาณ ๔ ปี โดยทำการสำรวจทุกเดือน และใช้สิวิจัยจับแมลง เพื่อนำไป
๒. ตรวจวินิจฉัยโรคและจำแนกชนิดแมลงศัตรูพืชที่พบ โดยการเก็บตัวอย่างและส่งตัวอย่างไปจำแนกโดยสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร
๓. สำรวจความเสียหายจากการเข้าทำลายจากโรคและแมลงศัตรูพืชที่พบ

เวลาและสถานที่

ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึง กันยายน ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี
ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร จังหวัดชุมพร

ผลการทดลองและวิจารณ์

จากการสำรวจโรคและแมลงศัตรูโกโก้ภายในศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร พบร่องเอ็กซ์เพรส์ดำเนินการต้นเรียกว่า Cherelle wilt ซึ่งเกิดเนื่องจากโกโก้ได้รับน้ำและสารอาหารไม่เพียงพอ ทำให้ผลอ่อนไม่เจริญเติบโต และเปลี่ยนเป็นสีดำแห้งคاتัน พบร่วมกันกับเชื้อรา เช่น Alternaria ที่ต้องมีระบอบวนการต่าง ๆ เพื่อการอยู่รอดของพืชนั้น ๆ โดยการทิ้งผลไปบางส่วนเพื่อรักษาผลผลิตส่วนใหญ่ไว้ จากอาหารที่ไม่พอที่จะเลี้ยงผลทั้งหมดภายในต้น จะพบอาการ Cherelle wilt มากในช่วง ๒-๓ เดือนแรกของการเจริญเติบโตของผล ส่วนสภาพต้นโกโก้สมบูรณ์ดี ใบมีการกัดกินของด้วงกินใบต่าง ๆ ไม่พบรอยแมลงทำลายในส่วนของลำต้นโกโก้ แต่จะพบการเกิดโรคเล็กน้อยในส่วนของผลโกโก้ คือโรคเน่าดำ (Black Pod Rot) และพบการเข้าทำลายของแมลงสัตруโกโก้ที่หลากหลายชนิด ได้แก่แมลงใน อันดับ Hemiptera ๑๐ ชนิด อันดับ Coleoptera ๘ ชนิด อันดับ Lepidoptera ๕ ชนิด และอันดับ Orthoptera ๒ ชนิด ดังนี้

โรคโกโก้

โรคผลเน่า腐 (Black Pod Rot)

การเกิดโรคผลเน่า腐ดำเนินแปลงปลูกของศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร พบร่วมกับการระบาดของโรคเน่า腐ดำเนินช่วงที่สภาพแปลงมีความชื้นสูง ประมาณเดือนตุลาคม-พฤษจิกายน ของทุกปี เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวมีฝนตกสะสมมาหลายนานเดือน จากข้อมูลสภาพอากาศของพื้นที่แปลงปลูกพบว่า ทุกๆปีฝนจะเริ่มตก ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม และจะมีปริมาณน้ำฝนมากขึ้นเรื่อยๆ สูงสุดจะอยู่ในเดือนพฤษจิกายน จนถึงเดือนธันวาคมปริมาณน้ำฝนค่อยๆ น้อยลง ความชื้นสัมพัทธ์ค่อนข้างสูงประมาณ ๘๕ เปอร์เซ็นต์ กรมอุตุนิยมวิทยา (๒๕๔๗) ซึ่งสภาพดังกล่าวเหมาะสมต่อการแพร่ระบาดของโรคผลเน่า腐 จากการสำรวจพบว่าโดยส่วนใหญ่เกิดอาการเน่า腐ที่ผลบริเวณปลายผล สร้างความเสียหายประมาณ ๕ เปอร์เซ็นต์ ของผลผลิตทั้งหมด เนื่องจากส่วนใหญ่จะเกิดอาการเมื่อผลมีขนาดใหญ่แล้ว โรคจึงไม่ได้มีความรุนแรงมากนัก เมล็ดภายในผลยังสามารถนำไปหยอดได้ แต่มีบางส่วนปริมาณไม่มากนักที่ทำให้ผลเน่าต้องเก็บผลทิ้งและนำไปเผาทำลาย จากการสังเกต สาเหตุอีกประการของการเกิดโรคผลเน่า腐เข้าทำลายผลโกโก้ เกิดจากผลโกโก้มีการเข้าทำลายของมวนโกโก้ จนผลเกิดบาดแผล ความเสียหายเกิน ๕๐ เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ผล เมื่อสภาพอากาศเหมาะสมโรคจะเข้าทำลายตาม bard ผลที่เกิดขึ้น จากการศึกษาของยุพิน (๒๕๓๔) โรคผลเน่า腐 เกิดจากเชื้อรา *Phytophthora palmivora* (Bult,Butler) อาการของผลเริ่มจากมีจุดเล็กๆ จากนั้นแผลจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล สีดำและขยายไปอย่างรวดเร็ว อาการของแผลจะพบเกือบทุกส่วนของผล ทั้งข้อผล กลางผล และปลายผล แต่จะพบมากบริเวณปลายผล หากมีอาการรุนแรงจะพบสีดำทั้งผล หากเกิดตอนผลอ่อนผลจะไม่สามารถพัฒนาต่อไปได้ ผลจะเน่าร่วงหล่นในที่สุด แต่หากเกิดโรคในระยะผลมีขนาดใหญ่แล้ว เชื้อเข้าทำลายไม่ถึงเมล็ดภายใน ผลโกโก้จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ แต่หากรุนแรงมากผลโกโก้จะเน่าไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งโรคผลเน่าจากเชื้อรา *Phytophthora palmivora* เป็นเชื้อหลักตัวสำคัญที่สร้างความเสียหายถึง ๕๕ เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ปลูกโกโก้ทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศเหล่านี้ศูนย์กลางการผลิตโกโก้ ICCO (๒๐๑๑)



รูปที่ ๑ ตัวอย่างโรคผลเน่า腐 (Black Pod Rot)

แมลงศัตรูโกโก้

จากการสำรวจแปลงปลูกในศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร พบร่วมกับแมลงศัตรูโกโก้หลากหลายชนิด ซึ่งแมลงศัตรูที่พบแต่ละชนิดจะสร้างความเสียหายต่อโกโก้มากน้อยแตกต่างกัน บางชนิดสำคัญมาก เช่น มวนยุงโกโก้ ด้วงกัดกินใบและหนอนต่างๆ เป็นต้น บางชนิดสำคัญน้อย เช่น เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้งสามี เป็นต้น และหลายชนิดไม่มีความสำคัญเท่าใดนัก ในระดับเศรษฐกิจ เช่น มวนถั่ว เพลี้ยจักจั่นแดง เป็นต้น ซึ่งพบในปริมาณที่น้อย โดยแมลงที่ทำการสำรวจพบมี ดังนี้

๑. Order Hemiptera

แมลงศัตรูโกโก้	ลักษณะการเข้าทำลาย
มวนยุงโกโก้	ดูดน้ำเลี้ยงยอดอ่อน ผลโกโก้ทุกขนาด ทำให้ผลเป็นสีดำ ผลแห้งเสีย
มวนถั่ว	ดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบ ยอดอ่อน และตடอดก
เพลี้ยกระโดด (Planthoppers)	ดูดน้ำเลี้ยง ยอดอ่อน กิ่ง ก้าน และผลโกโก้
จักจั่นเขา (Treehopper)	ดูดน้ำเลี้ยง ยอดอ่อน กิ่ง ก้าน และผลโกโก้
จักจั่นเขาสกุล Tricentrus	ดูดน้ำเลี้ยง ยอดอ่อน กิ่ง ก้าน และผลโกโก้
เพลี้ยกระโดดปีกหุบสีขาว (White moth cicada)	ดูดน้ำเลี้ยง ยอดอ่อน กิ่ง ก้าน และผลโกโก้
เพลี้ยอ่อนสีดำ (Black aphid)	ดูดน้ำเลี้ยง ยอดอ่อน กิ่ง ก้าน และผลโกโก้
เพลี้ยแป้งสามลี (Icerya mealybug)	ดูดน้ำเลี้ยง ยอดอ่อน กิ่ง ก้าน และผลโกโก้
เพลี้ยจักจั่นแดง (Red leafhopper)	ดูดน้ำเลี้ยง ยอดอ่อน กิ่ง ก้าน และผลโกโก้
เพลี้ยแป้ง (Planococcus citri)	ดูดน้ำเลี้ยง ยอดอ่อน กิ่ง ก้าน และผลโกโก้

๒. Order Coleoptera

แมลงศัตรูโกโก้	ลักษณะการเข้าทำลาย
ด้วงกินใบ F.Curculionidae	
<i>Sepiomus</i> sp.	กัดกินใบอ่อน ขอบใบหยักเป็นรูปฟันเลื่อย ใบแห่วง
<i>Astycus lateralis</i>	กัดกินใบอ่อน ขอบใบหยักเว้าแห่วง ใบขาดๆ
<i>Platytrachelus paviei</i>	กัดกินใบอ่อน
<i>Coelophora inaequalis</i>	กัดกินใบพีช
<i>Hypomeces squamosus</i>	กัดกินใบอ่อน ขอบใบหยักเว้าแห่วง ใบขาดๆ
ด้วงกินใบ F. Scarabeidae	
<i>Adoretus</i> sp.	กัดกินใบเป็นรู
ด้วงกินใบ F. Chrysomelidae	
<i>Aulachophora foveicollis</i>	กัดกินใบ พbn้อย
<i>Aulachophora</i> sp.	กัดกินใบ พbn้อย

๓. Order Lepidoptera

แมลงศัตรูโกโก้	ลักษณะการเข้าทำลาย
หนอน <i>Euproctis</i> sp.	กัดกินใบโกโก้
หนอน <i>Dasychira horsfieldii</i>	กัดกินใบโกโก้
หนอนปลอก (<i>Pagodiella hekmeyeri</i>)	กัดกินใบโกโก้ จะมีปลอกของหนอนติดอยู่
หนอนร่านกินใบ (Leaf eating caterpillar)	กัดกินใบโกโก้
หนอน <i>Spodoptera litura</i>	กัดกินใบโกโก้

๔. Order. Orthopthera

แมลงศัตรูโกโก้	ลักษณะการเข้าทำลาย

ตัวแทนหนวดสั้น	กัดกินใบโกโก้ ทำให้มีลักษณะใบแห้งขาด
ตัวแทนหนวยา	กัดกินใบโกโก้ ทำให้มีลักษณะใบแห้งขาด

แมลงศัตรูโกโก้ที่มีความสำคัญ สามารถสร้างความเสียหายในระดับเศรษฐกิจหากเกิดการระบาดหรือเข้าทำลายโกโก้ก็จะมีผลกระทบต่อผลผลิตโกโก้ ดังนี้

๑. มวนยุงโกโก้ (Cocoa mired, Mosquito bug)

Scientific name *Helopeltis theobromae* Miller

Family Miridae

Order Hemiptera

พืชอาศัย โกโก้ ชา อาโวคาโด้ ฝรั่ง ชมพู่ มะม่วง พริกไทย น้อยหน่า เป็นต้น

ศัตรูธรรมชาติ แมลงศัตรูธรรมชาติส่วนใหญ่จะเป็นพวงแมลงตัวห้า เช่น มด แมลงมุม
มวนเพชรมาต จะค่อยตักจับกินตัวอ่อนของมวนโกโก้

เป็นแมลงปากดูดที่มีความสำคัญมาก แม้พบปริมาณไม่มากแต่สามารถสร้างความเสียหายได้มาก จากการสำรวจจะพบระบาดมากในช่วงสภาพอากาศที่มีอากาศชื้นสูง เนื่องจากสภาพแเปลงที่ปลูกเป็นพืชแซมในสวนมะพร้าวและมีฝนตกแบบทุกวันเดือน โดยเฉพาะในฤดูฝน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนพฤษจิกายน มีฝนตกซุก สภาพแเปลงมีความชื้นสูงประมาณ ๘๕-๙๖ เปอร์เซ็นต์ หมายเหตุ การแพร่ระบาดของมวนโกโก้ ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากยอดอ่อนและผล โดยใช้ปากที่มีลักษณะแหลมแทงดูดเข้าไปในเนื้อเยื่อพืช แล้วปล่อยน้ำลายเข้าไปก่อนที่จะดูดกินน้ำเลี้ยงพืช ซึ่งน้ำลายนี้อาจมีพิษต่อพืช ทำให้เกิดรอยบาดแผลเป็นจุดสีดำคล้ายรอยไฟไหม้ ทำให้ผลดำ แห้งติดคต้าน หรือร่วงหล่น บางผลอาจมีผิวขรุขระ หรือมียางเหลืออกมา หากมีผลโกโก้น้อย จะพบการเข้าทำลายที่ยอดอ่อน ผลจะเป็นรูปวงสีดำ แต่ถ้าถูกทำลายมากๆยอดอ่อนจะแห้งเหงี่ยวคล้ายๆอาการขาดน้ำ

การเข้าทำลายของมวนยุงโกโก้ต่อระดับความเสียหายของผลผลิตโกโก้ พบว่า พบรการเข้าทำลายเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นศัตรูอันดับหนึ่งของโกโก้ โดยผลจะแห้งติดคตันและร่วงหล่นไปประมาณ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ของผลผลิตโกโก้ และอีกประมาณ ๓๐ เปอร์เซ็นต์พบการเข้าทำลายเมื่อผลโกโก้มีขนาดใหญ่แล้ว ในส่วนนี้สร้างความเสียหาย ไม่มากนัก เนื่องจากโดยส่วนใหญ่จะพบว่าถูกทำลายเป็นจุดดำ ๆ เนื่องจากเริบวนพิวนออกผลเท่านั้น และมีพื้นที่พิวนผลที่ได้มวนเข้าทำลายไม่มาก โดยส่วนใหญ่น้อยกว่าครึ่งผล เมล็ดข้างในสามารถนำไปหมักได้ (รูปที่ ๑) ซึ่งสอดคล้องกับ การศึกษาของจรัสศรีและคณะ (๒๕๓๒) พบรการเข้าทำลายในระยะที่ผลโกโก้ที่มีขนาดผลยาวประมาณ ๕ - ๗ ซม. ผลโกโก้จะสามารถเจริญเป็นผลสุกได้ ไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิต แต่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตด้านความยาวผลเล็กน้อย และจากการศึกษาความเสียหายของผลโกโก้ในระดับการทำลายต่าง ๆ กันของมวนโกโก้ของจรัสศรีและคณะ (๒๕๓๖) โดยคัดเลือกผลโกโก้ขนาดผลยาว ๕-๑๐ เซนติเมตร แล้วปล่อยให้มวนเข้าทำลายผลระดับต่าง ๆ คือ ๐ (control), ๒๕, ๕๐, ๗๕ และ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ พบรการทำลายของมวนโกโก้ที่ ๒๕ เปอร์เซ็นต์ และกรรมวิธี control ผลโกโก้สามารถเจริญเติบโตไปเป็นผลใหญ่ และสุกได้ทั้งหมดภายใน ๑๗ สัปดาห์ และไม่มีผลเสียซึ่งไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ ส่วนระดับการทำลาย ๕๐ เปอร์เซ็นต์ มีผลสุก ๗๖.๔๗ เปอร์เซ็นต์ ระดับการทำลาย ๗๕ เปอร์เซ็นต์ มีผลสุก ๔๑.๒๐ เปอร์เซ็นต์ ส่วนระดับการทำลาย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ มีผลสุกเพียง ๕.๔๙ เปอร์เซ็นต์



รูปที่ ๒ ลักษณะการเข้าทำลายของมวนยุงโกโก้เฉพาะบริเวณผิวนอกผล



(ก)



(ข)

รูปที่ ๓ มวนยุงโกโก้ (ก) ลักษณะผลโกโก้ที่มวนยุงโกโก้เข้าทำลาย (ข)

๒. ด้วงกัดกินใบโกโก้

จากการสำรวจแปลงปลูกโกโก้ของศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร พบร่วมกับด้วงกัดกินใบโกโก้หลายชนิด ที่มีความสำคัญและพบอยู่เสมอ มี ๓ ชนิด ได้แก่

Scientific name	<i>Astycus lateralis</i> Fabricius
Scientific name	<i>Sepiomus</i> sp.
Scientific name	<i>Platytrachelus paviei</i> Marshall
Family	Curculionidae
Order	Coleoptera
พืชอาศัย	โกโก้ อ้อย ทุเรียน เงาะ ส้มโอ ส้มเขียวหวาน ลำไย หม่อน เป็นต้น



(ก)



(ข)



(ค)

รูปที่ ๔ *Astycus lateralis* Fabricius (ก) *Sepiomus* sp. (ข) และ *Platytrachelus paviei* Marshall (ค)

ด้วงกัดกินใบโกโก้ มีลักษณะการกัดกินใบที่แตกต่างกันออกไปตามชนิดของด้วง แต่จากการสังเกต จะพบขوبใบหยัก ในขาดๆ และเว้าแหว่ง จากการสำรวจ พบว่า โดยส่วนใหญ่ด้วงกัดกินใบทำความเสียหายมากในระยะที่โกโก้กำลังแตกใบอ่อน ระบาดมากช่วงต้นฤดูฝน คือเดือนพฤษภาคม และอีกช่วงคือเดือนสิงหาคม-ตุลาคม ซึ่งมีฝนตกอย่างสม่ำเสมอและมีปริมาณน้ำฝนค่อนข้างสูง โกโก้มีการแตกใบอ่อนจำนวนมาก พบรากเข้าทำลายใบอ่อนโกโก้ประมาณ ๔๐ เปอร์เซ็นต์ของใบอ่อนที่แตกใหม่ และกัดกินใบเรื่อยๆ หากใบอ่อนหมวด หรือเจริญเติบโตมาเป็นใบแก่กว่า ด้วงจะค่อยๆ กัดกินใบที่แก่กว่า ซึ่งสอดคล้องกับ การศึกษาของ จรัสศรีและคณะ (๒๕๓๓) พบว่า ตำแหน่งใบที่ ๑ – ๑๕ ของต้นโกโก้ จะถูกด้วงกินใบทำลายมากที่สุด และมีแนวโน้มลดลงจากใบยอดไปสู่ใบล่าง หรือมีการทำลายที่ใบยอดมากกว่าใบล่าง การเข้าทำลายของด้วงกินใบโกโก้ ทำต้นผลิตใบใหม่ไม่ทัน ต้นจะชะงัก การเจริญเติบโต อ่อนแอและเป็นสาเหตุให้โรคเข้าทำลายได้ หากปล่อยให้พื้นที่ใบถูกทำลายมาก ต้นโกโก้จะได้รับความเสียหายรุนแรง และส่งผลให้ต้นโกรหบผลิตลดลงได้

จากการสำรวจพบมากที่สุด คือ ด้วง *Astycus lateralis* Fabricius ลักษณะตรงส่วนของปากจะเห็นเป็นงวงเล็กๆ เกษตรกรในพื้นที่เรียกว่า ด้วงงวงกุหลาบ ระยะไข่และระยะตัวหนอนจะอาศัยอยู่ในดิน เมื่อตัวหนอนฟักออกจากไข่อาจกินรากพืชเป็นอาหาร ตัวเต็มวัย เป็นด้วงปีกแข็ง มีสีเทาปนน้ำตาลเล็กน้อย เป็นด้วงวงประเภทปากกว้าง งวงสั้น ส่วนหัวยื่นไปข้างหน้า ลักษณะคล้ายวง โดยในเวลากลางวันตัวเต็มวัยมักซ่อนตัวกัดกินใบอย่างสงบนิ่งอยู่ตามใบ ถ้าทำให้ต้นพืชที่ด้วงงวงกุหลาบกำลังเกาะอยู่กระเทือน ด้วงงวงกุหลาบจะทิ้งตัวลงสู่พื้นดิน แต่ตอนคำจะพบด้วงงวงกุหลาบบินออกจากพืชอาศัยเข้ากัดกินใบโกโก้มากขึ้น ลักษณะนี้จะพบในด้วงวงศ์ Curculionidae ซึ่งออกหากินทั้งในกลางวันและกลางคืน ส่วนด้วงวงศ์ Scarabeidae เข้าทำลายพืชในเวลากลางคืน



รูปที่ ๕ ตัวอย่างการเข้าทำลายใบโกโก้ของด้วงกินใบ

หนอนปลอก

Scientific name	<i>Pagodiella hekmeyeri</i>
Family	Psychidae
Order	Lepidoptera
พืชอาศัย	หนอนปลอกมีพืชอาศัยหลายชนิดจัดเป็นพวง polyphagous ได้แก่ ชา กาแฟ พริกไทย โกโก้ มะพร้าว และไม้ผลอื่น ๆ เป็นต้น
สัตว์รบกวนชาติ	มวนเพชฌฆาต แมลงวันกันชน และแทนเบียน (braconid)

จากการสำรวจเฉพาะหนองในแปลงปลูกโกโก้ของศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร พบว่า หนองปลอกมีจำนวนมากที่สุดและพบบ่อยที่สุด ลักษณะการเข้าทำลายใน หนองปลอกจะเข้าทำลายโดยการกัดกินใบเป็นรู และจะสังเกตเห็นว่ามีลักษณะปลอกคล้ายๆเศษไม้ເກາະติดอยู่ตามใบโกโก้ และจะมีตัวหนองอาศัยภายในปลอกนั้น ลักษณะปลอกก็จะมีหลายแบบ เช่น ราย ดอกไม้ เป็นต้น หากหนองปลอกเข้าทำลายใบมากๆ ในโกโก้ก็จะเป็นรูทึ่งใบ พืชสังเคราะห์แสงได้น้อยลง ทำให้ใบร่วงหล่นไป จนต้นโกโก้ชี้งักการเจริญเติบโตได้ ซึ่งจากการสังเกต จะพบหนองปลอกบริเวณใบที่อยู่ปลายกิ่ง ที่ได้รับแสงแดด จะไม่ค่อยพบกับใบข้างใน



รูปที่ ๖ ตัวอย่างหนองปลอกและลักษณะการเข้าทำลายใบโกโก้

๓. หนองบุ้ง

Scientific name	<i>Euproctis</i> sp.
Family	Lymantriidae
Order	Lepidoptera
พืชอาหาร	ชมพูสาแรก กับทิม ชา กาแฟ มะขามเทศ มะม่วง และกุหลาบ
ศัตรูธรรมชาติ	- แมลงวันเป็น Carecelia iridopennis (tachinid) - แตนเป็น Apanteles mendosa (braconid)



(ก)

(ข)

รูปที่ ๗ หนองบุ้ง (ก) ผีเสื้อหนองบุ้ง (ข)

ลักษณะการเข้าทำลาย หนองบุ้งจะกัดกินใบและยอดอ่อนของโกโก้ จากการสำรวจ พบว่า มีหนองบุ้งเข้าทำลายใบโกโก้ในปริมาณไม่มากนัก จะมีปริมาณมากขึ้นในช่วงฤดูฝน ช่วงเดือนพฤษภาคม – พฤษภาคม แต่ก็ยังไม่ได้รับความเสียหายรุนแรง

๔. หนอนร่าวนกินใบ (Leaf eating caterpillar)

Scientific name	Parasa lepida Cramer
Family	Limacodidae
Order	Lepidoptera
พืชอาศัย	มะพร้าว เงาะ ขนุน เป็นต้น
ศัตรูธรรมชาติ	แมลงวันกันชน แมลงวันหลังลาย และแมลงเปลี่ยนพากแต่น (Hymenoptera) คอยทำลายในระยะที่เป็นตัวหนอน



รูปที่ ๔ หนอนร่าวนกินใบโกโก้

จากการสำรวจพบหนอนร่าวนในปริมาณน้อย ตัวหนอนเมื่อฟอกออกจากไข่จะแห้งกินแต่ผิวใบเท่านั้น ทำให้ใบแห้งและร่วง โดยปกติแล้วหนอนชนิดนี้ทำความเสียหายไม่มากนัก แต่ถ้ามีการระบาดในระยะที่จะกำลังออกดอกจะทำให้เงาะเสียหายมาก เพราะต้นที่ถูกทำลายจะติดผลขนาดเล็ก และด้อยคุณภาพ

๕. เพลี้ยกระโดดปีกหุบสีขาว (White moth cicada)

Scientific name	<i>Lawana conspersa</i> (Walker)
Family	Flatidae
อันดับ	Hemiptera
พืชอาหาร	มะม่วง กافafe ทุเรียน ลำไย เป็นต้น
ศัตรูธรรมชาติ	เชื้อรากีฏา Metarhizium anisopliae

เพลี้ยกระโดดปีกหุบสีขาว เป็นเพลี้ยที่ปล่อยไข่สีขาวๆ ไว้ตามใต้ใบ กิ่ง และผลโกโก้จนดูขาวไปทั่ว ทำให้สกปรก และเป็นแหล่งเพาะรำได้ ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากดอก ผล ใน และกิ่งอ่อน ทำให้ดอกและผลร่วง หากเพลี้ยกระโดดวางแผนใช่บริเวณเส้นแกนใบจะทำให้ใบโกโก้บิดงอและหักได้ จากการสำรวจ พบรบัดมากในช่วงเดือนกรกฎาคม-พฤษจิกายน แต่ไม่ได้สร้างความเสียหายจนถึงระดับเศรษฐกิจ



รูปที่ ๙ เพลี้ยกระโดดปีกหุบสีขาว

๖. เพลี้ยกระโดด (Planthoppers)

Scientific name	<i>Pochazia fuscata</i> (Fab.)
Family	Ricaniidae
อันดับ	Hemiptera

เพลี้ยกระโดด วงศ์ Ricaniidae เป็นเพลี้ยกระโดดที่มีขนาดปานกลาง ลำตัวสีน้ำตาลเข้ม เป็นแมลงจำพวกปากรด ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ำเลี้ยงจากต้นพืช จากการสำรวจพบในปริมาณไม่มาก ไม่สร้างความเสียหายต่อผลผลิตโภคภัณฑ์



รูปที่ ๑๐ เพลี้ยกระโดด

๗. เพลี้ยอ่อนสีดำ (Black aphid)

Scientific name	<i>Toxoptera</i> sp.
Family	Aphididae
อันดับ	Hemiptera
พืชอาหาร	โกโก้ น้อยหน่า กาแฟ ส้มโอ ส้มเขียวหวาน เป็นต้น
ศัตรูธรรมชาติ	ด้วงเต่า ทึ้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัย coy ทำลายเพลี้ยอ่อน



รูปที่ ๑๑ อ่อนสีดำ (Black aphid)

ลักษณะการเข้าทำลายโกโก้ของเพลี้ยอ่อนสีดำ โดยรวมกันเป็นกลุ่ม ๆ ดูดกินน้ำเลี้ยงบริเวณยอดอ่อน โดยเฉพาะใต้ใบโกโก้ หากมีการระบาดมากขึ้นจะพบบริเวณติดอก ผลอ่อนของโกโก้ ทำให้ดักและผลอ่อนร่วง และยอดมีอาการเหลืองแห้ง และเป็นแหล่งเพาะเชื้อราดำ พบการเข้าทำลายในแปลงโกโก้ในช่วงฝนทึ่งช่วงแต่พบจำนวนน้อย ไม่ได้สร้างความเสียหายจนถึงระดับเศรษฐกิจได้

๙. เพลี้ยแป้งสำลี (Icerya mealybug)

Scientific name	<i>Rastrococcus iceryoides</i> (Green)
Family	Pseudococcidae
Order	Hemiptera



รูปที่ ๑๒ เพลี้ยแป้งสำลี (Icerya mealybug)

เพลี้ยแป้งสำลี มีพืชอาหารที่กว้างขวางรวมถึงโกโก้ด้วย เพลี้ยแป้งสำลีเป็นแมลงปากดูด พบร่วมกลุ่ม กันดูดกินน้ำเลี้ยงอยู่ตามใต้ใบ ติดอก และยอดอ่อนโกโก้ ทำให้ใบหยิก สร้างความสกปรก และเป็นแหล่งเพาะเชื้อราดำ จากการสำรวจในแปลงปลูกของศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรพบในปริมาณไม่มาก ไม่มีผลกระทบต่อผลผลิต แต่หากมีการระบาดมาก จะสามารถทำให้ต้นโกโก้ทรุดโทรมได้

๑๐. เพลี้ยแป้ง

Scientific name	<i>Planococcus citri</i>
Family	Pseudococcidae
Order	Hemiptera
พืชอาศัย	กาแฟ ชา โกโก้ มะพร้าว เป็นต้น

ศัตtruธรรมชาติ

แมลงซ้างปึกใส ด้วงเต่าหั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัย



รูปที่ ๑๓ กลุ่มเพลี้ยแป้งบ่นกิงโกโก้

จากการสำรวจในแปลงของศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร พบรสึ่ยแป้งในปริมาณไม่มากนัก กระจายเป็นจุดเล็กๆ ทั่วทั้งแปลงป่าลูก แต่ไม่มีผลกระทบเสียหายในระดับเศรษฐกิจ ลักษณะการเข้าทำลาย เพลี้ยแป้งเป็นแมลงพวงปากคู่ดูจะดูดกินน้ำเลี้ยงบริเวณยอดอ่อน ติดอก กิงและผลอ่อน การเข้าทำลายผลโกโก้ ส่วนใหญ่จะพบกลุ่มเพลี้ยแป้งบริเวณข้อผล ทำให้ผลอ่อนเหลวแห้ง เจริญเติบโตไม่เต็มที่ หากเข้าทำลายติดอกจนมีผลกระทบต่อผลผลิตได้

๑๐. จักจั่นขา (Treehopper)

Scientific name *Leptocentrus taurus*

Family Membracidae

อันดับ Hemiptera

พืชอาหาร โกโก้ อ้อย หญ้าลี้ยงสัตว์ กาแฟ ข้าวโพด เป็นต้น

จักจั่นขา ส่วนใหญ่สันหลังออกปล่องแรก (pronotum) มีขนาดใหญ่และมีรูปทรงเปล่งๆขยายไปคลุมส่วนนอกและส่วนห้อง ลำตัวยาวประมาณ ๑๐ มิลลิเมตร ขอบดูดกินน้ำเลี้ยงจากไม้พุ่มและไม้ยืนต้น บางชนิดวางแผนใช้ทำให้เปลือกกิงแทกออกและส่วนปลายกิงแห้งตาย แต่พบในปริมาณไม่มาก

๑๑. จักจั่นขาสกุล Tricentrus

Scientific name *Tricentrus* sp.

Family Membracidae

อันดับ Hemiptera

จักจั่นขาสกุล *Tricentrus* มีลักษณะค่อนข้างเล็ก อกปล่องแรกมีสีน้ำตาลเข้ม สีของปีกมีสีน้ำตาลอ่อน มักพบดูดกินน้ำเลี้ยงยอดอ่อนของพืชและผลอ่อน แต่พบในปริมาณไม่มาก



รูปที่ ๑๔ จักจั่นขาสกุล Tricentrus

๑๒. เพลี้ยจักจั่นแดง (Red leafhopper)

Scientific name	<i>Bothrogonia addita</i> (Walker)
Family	Cicadellidae
อันดับ	Hemiptera

เป็นเพลี้ยจักจั่นสีส้มแดง สามารถดูดกินพืชได้หลายชนิด เช่น กาแฟ แตง อ้อย เป็นต้น สำหรับ
แปลงโกโก้ พปในแปลงปริมาณน้อย



รูปที่ ๑๕ เพลี้ยจักจั่นแดง (Red leafhopper)

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ

จากการสำรวจโรคและแมลงศัตรูโกโก้ พบโรคโกโก้ ๑ ชนิด และแมลงศัตรูโกโก้ ๒๕ ชนิด โรคที่พบ คือ โรคผลenerาดา ถึงแม้ว่าจะเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย แต่อนาคตถ้าจะมีการวางแผนในการป้องกันกำจัดเพื่อไม่ให้เกิดการระบาดในแปลงปลูก จนสร้างความเสียหายต่อผลผลิตได้ แมลงศัตรูโกโก้ที่สำคัญที่สุด คือมวนยุงโกโก้ รองลงมาคือ ด้วงกัดกินใบ และหนอนต่างๆ ซึ่งจากการศึกษาทำให้ทราบชนิดของศัตรูโกโก้ ทราบลักษณะการเข้าทำลาย ช่วงเวลาและสภาพอากาศที่เหมาะสมต่อการเข้าทำลายและการแพร่ระบาดของศัตรูโกโก้ ตลอดจนระดับความเสียหายของศัตรูแต่ละชนิด เกษตรกรสามารถหาวิธีป้องกันกำจัด ได้อย่างถูกต้องและทันเวลา

การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

สามารถถ่ายทอดให้เกษตรกรได้รู้จักกับโรคและแมลงศัตรูโกโก้ ลักษณะการเข้าทำลายโกโก้และความเสียหายต่อผลผลิต ที่เกิดจากโรคและแมลงศัตรูโกโก้ ที่ได้พปในปัจจุบัน

คำขอบคุณ

ขอขอบคุณ สำนักวิจัยพัฒนาการอวรักษាលีด กรมวิชาการเกษตร ในการจำแนกแมลงศัตรูโกโก้

เอกสารอ้างอิง

จักรศรี วงศ์กำแหง, วิชิต ตรีพันธุ์ และอานุภาพ ธีระกุล. ๒๕๓๖. การศึกษาความเสี่ยหายของผลโกโก้ในระดับการทำลายต่าง ๆ กันของมวนโกโก้. หน้า๘๑-๙๖. ใน:รายงานผลงานวิจัยประจำปี ๒๕๓๖. ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร กรมวิชาการเกษตร. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

จักรศรี วงศ์กำแหง, ไพบูล ศุภวงศ์ เสน และอานุภาพ ธีระกุล. ๒๕๓๖. การศึกษาความเสี่ยหายของผลโกโก้เนื่องจาก

การทำลายของมวนโกโก้. หน้า๙๐-๑๐๗. ใน:รายงานผลการค้นคว้าวิจัยประจำปี ๒๕๓๗. ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร กรมวิชาการเกษตร. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

จักรศรี วงศ์กำแหง, สุรพล ศรุยานนท์, ผ่านนิต งานกรณาธิการ และวิทย์ สุวรรณวุธ. ๒๕๓๓. การศึกษาชนิดแมลงปีกแข็งกินใบโกโก้. หน้า ๑๙๔-๒๐๑. ใน:รายงานผลงานวิจัยประจำปี ๒๕๓๓. ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร กรมวิชาการเกษตร. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

ยุพิน กลินกเมฆพงษ์. ๒๕๓๔. โรคผลเน่าดำของโกโก้ (*Theobroma cacao L.*) ซึ่งเกิดจากเชื้อรากไฟฟอฟอร์ร่าในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ยุวลักษณ์ ขบประเสริฐ, ยุพิน กลินกเมฆพงษ์ และจักรศรี วงศ์กำแหง. ๒๕๓๔. ศัทฐ์โกโก้ที่พบในประเทศไทย. หน้า ๑-๕๔. ใน: เอกสารการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการนำร่องขยายการผลิตสินค้าใหม่โกโก้. ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร กรมวิชาการเกษตร. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

สถานีอากาศเกษตรสวี. ๒๕๕๗. รายงานข้อมูลอุตุนิยมวิทยา พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๗. กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร.

ICCO. ๒๐๑๑. ICO Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics, Vol. XXXVII, No. ๔, Cocoa year ๒๐๑๐/๑๑. Published: ๓๐-๑๑-๒๐๑๑. Retrieved from www.icco.org on ๐๕-๐๔-๒๐๑๒.