

# แบบรายงานเรื่องเต็ม ผลการวิจัยที่สินสุด ประจำปีงบประมาณ 2562

## 1.แผนงานวิจัย แผนงานวิจัยและพัฒนาด้านเมล็ดพันธุ์พืช

## 2.โครงการวิจัย การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพันธุ์และมันฝรั่งเพื่อการแปรรูปและบริโภค

กิจกรรม : การใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตในการผลิตมันฝรั่ง

## 3.ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย) ผลของกรด Jasmonic acid ต่อผลผลิตและคุณภาพหัวมันฝรั่ง

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) Effect of Jasmonic acid on yield and quality of potato tubers.

## 4.คณะกรรมการ

หัวหน้าการทดลอง : นายวิศรุต สันม่าแฉ สังกัด สถาบันวิจัยพืชสวน

### ผู้ร่วมงาน

- |                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 1.นางสาวเกษตริน เดชอุป   | สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก |
| 2.นายอำนวย อรรถลังรอง    | สังกัด สถาบันวิจัยพืชสวน             |
| 3.นายสัจจะ ประสงค์ทรัพย์ | สังกัด สถาบันวิจัยพืชสวน             |

## 5.บทคัดย่อ

การศึกษาผลของกรด Jasmonic acid ต่อผลผลิตและคุณภาพหัวมันฝรั่ง ดำเนินการที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2562 โดยทางแผนการทดลองแบบ RCBD จำนวน 5 กรรมวิธี 4 ชั้้า ประกอบด้วย การพ่นกรด Jasmonic acid ที่ความเข้มข้น 5, 10, 15 และ 20 มิลลิโมลาร์เปรียบเทียบกับกรรมวิธีพ่นน้ำเปล่า ในปี 2561 จำนวนหัวมันฝรั่ง พบร่วมกับกรรมวิธีพ่นกรด Jasmonic acid ที่ความเข้มข้น 20 มิลลิโมลาร์ ให้จำนวนหัวมันฝรั่ง เฉลี่ยสูงสุด คือ 76,443 หัวต่อไร่ น้ำหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งขนาดใหญ่ และน้ำหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งรวม เฉลี่ยสูงสุด คือ 2,860 และ 5,252 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลำดับ และยังให้หัวมันฝรั่งขนาดเล็กเฉลี่ยน้อยสุด คือ 770 กิโลกรัมต่อไร่ ด้านคุณภาพน้ำหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งที่ผ่านและไม่ผ่านเกณฑ์โรงงาน พบร่วมกับกรรมวิธีพ่นกรด Jasmonic acid ที่ความเข้มข้น 20 มิลลิโมลาร์ ให้น้ำหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งที่ผ่านเกณฑ์โรงงานเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 4,482 กิโลกรัมต่อไร่ ให้น้ำหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งที่ไม่ผ่านเกณฑ์โรงงานเฉลี่ยน้อยสุด คือ 770 กิโลกรัมต่อไร่ ไม่แตกต่างทางสถิติ เปอร์เซ็นต์เป็น พบร่วมกับกรรมวิธีพ่นกรด Jasmonic acid ที่ความเข้มข้น 5 มิลลิโมลาร์ ให้เปอร์เซ็นต์ แบ่ง เฉลี่ยสูงสุด คือ 20.10 เปอร์เซ็นต์ ความถ่วงจำเพาะ พบร่วมกับกรรมวิธีพ่นกรด Jasmonic acid ที่ความเข้มข้น 5 และ 15 มิลลิโมลาร์ ให้ความถ่วงจำเพาะเฉลี่ยสูงสุด คือ 1.079 ในปี 2562 จำนวนหัวมันฝรั่ง พบร่วมกับกรรมวิธีพ่นกรด Jasmonic acid ที่ความเข้มข้น 20 มิลลิโมลาร์ ให้จำนวนหัวมันฝรั่งเฉลี่ยสูงสุด คือ 53,331 หัวต่อไร่ น้ำหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งขนาดกลาง และน้ำหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งรวม เฉลี่ยสูงสุด คือ 2,436 และ 3,053 กิโลกรัมต่อไร่ นอกจากนั้นยัง พบร่วมกับกรรมวิธีพ่นกรด Jasmonic acid ที่ความเข้มข้น 15 มิลลิโมลาร์ ให้น้ำหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งขนาดใหญ่เฉลี่ยสูงสุด คือ 164 กิโลกรัม และให้หัวมันฝรั่งขนาดเล็กเฉลี่ยน้อยสุด คือ 501 กิโลกรัมต่อไร่ ด้านคุณภาพ พบร่วมกับกรรมวิธีพ่นกรด Jasmonic acid ที่ความเข้มข้น 20 มิลลิโมลาร์ ให้

น้ำหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งที่ผ่านเกณฑ์โรงงานเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 2,436 กิโลกรัมต่อไร่ น้ำหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งที่ไม่ผ่านเกณฑ์โรงงานพบว่า กรรมวิธีพ่นกรดจัสโนนิกที่ความเข้มข้น 15 มิลลิโมลาร์ ให้น้ำหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งที่ไม่ผ่านเกณฑ์โรงงานเฉลี่ยน้อยสุด คือ 501 กิโลกรัมต่อไร่ เปอร์เซ็นต์แป้ง พบว่า กรรมวิธีพ่นกรดจัสโนนิกที่ความเข้มข้น 20 มิลลิโมลาร์ ให้เปอร์เซ็นต์แป้งและความถ่วงจำเพาะเฉลี่ยสูงสุด คือ 17.48 เปอร์เซ็นต์ และ 1.067 ไม่แตกต่างทางสถิติ

## 6. คำนำ

มันฝรั่ง (*Solanum tuberosum L.*) เป็นพืชอาหารที่ปลูกได้เขตตอบอุ่น-หนาว ซึ่งมีความสำคัญอยู่ในอันดับที่สี่ของโลกรองจาก ข้าว ข้าวสาลีและข้าวโพด มันฝรั่งไม่ใช่พืชอาหารหลักของประเทศไทย แต่มีความสำคัญในด้านเป็นพืชอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าห่อย้ายพันล้านบาท จัดเป็นพืชที่ทำรายได้สูงให้กับเกษตรกรในเขตภาคเหนือ คือ มีรายได้ต่อไร่เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 15,000-25,000 บาท จังหวัดที่มีการปลูกมันฝรั่งมากที่สุด คือ จ. เชียงใหม่ รองลงมาได้แก่ จ. ตาก ลำพูน เชียงราย พะเยา ลำปาง เพชรบูรณ์ และบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จ. หนองคาย สกลนคร เลย และนครพนม พื้นที่ปลูกมันฝรั่งรวมในปี 2558 มีพื้นที่เพาะปลูก 48,944 ไร่ ซึ่งมีผลผลิต 125,663 ตัน มันฝรั่งเพื่อการแปรรูปมีพื้นที่ปลูก 44,742 มีผลผลิต 115,141 ตัน ผลผลิตต่อไร่เฉลี่ย 2,573 กิโลกรัม/ไร่ (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2555) เนื่องจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมแปรรูปมันฝรั่งในประเทศไทยโดยเฉพาะมันฝรั่งทอดกรอบ (potato chip) ซึ่งนอกจากผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ และบางส่วนยังส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศ (สนงและคณ, 2551; อรทัย, 2557) โดยประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตมันฝรั่งทอดกรอบอันดับหนึ่งในภูมิภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้เกษตรกร และผู้ประกอบการมีความต้องการมันฝรั่งสดเพื่อส่งโรงงานแปรรูป เป็นมันฝรั่งแผ่นทอดกรอบ (potato chip) ปีละประมาณ 170,000 ตัน ขณะที่เกษตรกรไทยสามารถผลิตได้ประมาณ 129,760 ตันและในปี 2558 บริษัทและผู้ประกอบการขอนำเข้าหัวมันฝรั่งอีก จำนวน 45,000 ตัน เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2555) จะเห็นได้ว่า การเติบโตของธุรกิjmันฝรั่งได้ขยายตัวในประเทศไทยเป็นหลัก แต่การขยายตัวเพื่อรับการเปิดการค้าเสรีในภูมิภาคอาเซียนยังทำได้จำกัด เนื่องจาก การขาดแคลนวัตถุดิบไม่เพียงพอใช้ในโรงงานแปรรูป เหตุนี้จึงทำให้บริษัทผู้ประกอบการได้ขอนำเข้ามันฝรั่งสดจากต่างประเทศเป็นหลัก (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2555) ปัจจุบันมันฝรั่งให้ผลผลิตเฉลี่ย 2,500-2,700 กิโลกรัมต่อไร่ และเปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ย 17-19 เปอร์เซ็นต์ (อภิรักษ์, 2557) ซึ่งพบว่าต่ำกว่าหัวมันฝรั่งที่นำเข้าจากต่างประเทศ นอกจากนั้นหัวพันธุ์มันฝรั่งก็ยังไม่เพียงพอ กับความต้องการของเกษตรกร จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นสมควรให้มีการศึกษาวิธีการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของหัวมันฝรั่ง ซึ่งการผลผลิตและคุณภาพมันฝรั่งจะประกอบด้วยหลายปัจจัยอาทิ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม อุณหภูมิ ช่วงความยาวของวัน สภาพดิน การจัดการดินและปุ๋ย พันธุ์ และอายุการเก็บเกี่ยว (ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่, 2557) นอกจากนั้นยังมีอีกวิธีหนึ่งก็คือ การใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตพืช (Plant Growth Regulators: PGRs) ซึ่งได้มีการศึกษาค้นคว้าและใช้กันอย่างกว้างขวางในการควบคุมลักษณะต่างๆ ให้เป็นไปตามต้องการ รวมถึงการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของพืชหลายชนิด เช่น ข้าวบาร์เลย์ ข้าวโอ๊ต ข้าวสาลี ผลไม้ ผัก (เกรียงศักดิ์, 2533) รวมทั้งในพืชหัวและมันฝรั่ง (ภักดี, 2558, Manjula S. et al., 1995)

บทบาทที่สำคัญของสารคุณการเจริญเติบโตพืชซึ่งเกี่ยวข้องกับการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ ได้แก่

- 1) บทบาทซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์แสง มีรายงานว่าใช้โตไคนิน และจิบเบอเรลลินสามารถกระตุ้นการสังเคราะห์แสง (Carlson *et al.*, 1986) 2) บทบาทเกี่ยวกับการควบคุมการเคลื่อนย้ายสารอาหารในโพลเยอม โดยพบว่า ใช้โตไคนินสามารถเพิ่มการเคลื่อนย้ายน้ำตาลชูโครส (Brenner, 1987) 3) บทบาทในการควบคุมการสะสมสารอาหารในเมล็ด มีรายงานเกี่ยวกับบทบาทของสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชในระหว่างที่เมล็ดกำลังมีการเจริญพัฒนา โดยพบว่า มีปริมาณสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชชนิดต่าง ๆ ในเมล็ด ไม่ว่าจะเป็นกรดจัสมีนิก ใช้โตไคนิน และจิบเบอเรลลิน แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในเมล็ด (Brenner *et al.*, 1986) และสุดท้าย 4) บทบาทต่อการนำไปใช้เครื่องมือตัดอลีชีม โดยพบว่า สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชไม่ว่าจะเป็นในกลุ่ม ของเอทธีน กรดจัสมีนิก จิบเบอเรลลิน และใช้โตไคนิน มีผลต่อ กิจกรรมของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์แป้ง (Sekhon and Singh, 1994; Antognozzi *et al.*, 1996; Yang *et al.*, 1999; Pan *et al.*, 2000) โดยในขั้นตอนการสังเคราะห์แป้ง พบร้า เอโนไซม์ที่มีบทบาท สำคัญคือเอนไซม์ starch branching ซึ่งมีผลต่อลักษณะโครงสร้างของแป้งอันเป็นตัวกำหนดคุณภาพของข้าว (Nakamura *et al.*, 1989; Nakamura and Yuki, 1992) 5) บทบาทในการควบคุมกระบวนการลงหัวให้พืชหัว (Tuberization) เมื่อพืชได้รับกรดจัสมีนิกจะช่วยให้เซลล์บริเวณ Stroage Root มีขนาดใหญ่ขึ้นและมีจำนวนมากขึ้นทำให้พร้อมสะสมแป้งและโปรตีนมากขึ้น อีกทั้งการย้ายโปรตีนและแป้งทำให้ร่ายขึ้น รวมไปถึงการสังเคราะห์แสง (Photosynthesis) ที่ดีและสมบูรณ์จะช่วยให้การลงหัวดีและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น (ภักดี, 2558) ซึ่งถ้านำแนวทางนี้มาเพื่อศึกษาผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช (โดยตั้งสมมติฐานว่า การใช้กรดจัสมีนิกสามารถเพิ่มคุณภาพและผลผลิตหัวมันฝรั่งได้ อันจะนำไปสู่การผลิตมันฝรั่งคุณภาพดีและเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตมันฝรั่งของเกษตรเพื่อส่งโรงงานแปรรูปได้เป็นอย่างดี

ดังนั้นจึงมีความจำเป็นจะต้องศึกษาผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช (PGRs) กรดจัสมีนิกต่อผลผลิต และคุณภาพหัวพันธุ์มันฝรั่งเพื่อเป็นแนวทางให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันฝรั่งในการเพิ่มศักยภาพการผลิตมันฝรั่งต่อไป

## 7. อุปกรณ์และวิธีการ

1. หัวพันธุ์มันฝรั่งพันธุ์แอตแลนติก
2. สารควบคุมการเจริญเติบโตกรดจัสมีนิก
3. ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ,46-0-0 ,13-31-21 และ 0-0-50
4. โดโลไมท์ หรือ ปุนขาว
5. ปุ๋ยคอก
6. สารป้องกันโรคและแมลง
7. สารป้องกันวัชพืช

## วิธีการ

แผนการทดลอง วางแผนการทดลองแบบ RCBD จำนวน 5 กรรมวิธี 4 ชั้้ง ประกอบด้วย

1. พ่นน้ำเปล่า (Control)
2. พ่นกรดจัสมีนิกที่ความเข้มข้น 5 มิลลิโมลลาร์
3. พ่นกรดจัสมีนิกที่ความเข้มข้น 10 มิลลิโมลลาร์

4. พ่นกรดจัลสโนนิกที่ความเข้มข้น 15 มิลลิโนลาร์

5. พ่นกรดจัลสโนนิกที่ความเข้มข้น 20 มิลลิโนลาร์

## วิธีปฏิบัติการทดลอง

### การเตรียมดิน

ก่อนปลูกเก็บตัวอย่างดินไปวิเคราะห์เพื่อทำการปรับปรุงดินให้เหมาะสมต่อการปลูก หลังจากนั้นໄດ້เตรียมดินด้วยผาณ 7 จำนวน 1 รอบ และໄດ້ด้วยໂຣຕາຣີ จำนวน 1 รอบ ໃຫ້ລຶກຍ່າງນ້ອຍ 20 ເຊັນຕີເມຕຣ ມ່ວ່ານປູນຂາວ ອັຕຣາ 200-500 ກກ./ໄຮ້ທີ່ມາຄ່າວິເຄຣະທີ່ດິນ ຕາກດິນໄວ້ 10-15 ວັນ

### การปลูก

ເຕີຣີມແປລັງປຸກນາດແປລັງ  $4 \times 5$  ເມຕຣ ຈຳນວນ 20 ແປລັງ ປຸກມັນຝຣັ້ງແບບແຄວເດືອຍໄມ່ຍກຮ່ວມໃຫ້ຮະບະປຸກ  
20 x 90 ເຊັນຕີເມຕຣ ຈຳນວນ 1 ຫ້ວຕ່ອຫລຸມ ຂຸດຫລຸມລຶກ 15 ເຊັນຕີເມຕຣ ຮອງກັນຫລຸມດ້ວຍປຸ່ຢີເຄມີສູຕຣ  
15-15-15 ອັຕຣາ 12 ກຣັມຕ່ອຫລຸມ (100 ກກ/ໄຮ້ + ປຸ່ຢີເຄມີສູຕຣ 13-13-21 ອັຕຣາ 100 ກກ/ໄຮ້ + ປຸ່ຢີເຄມີສູຕຣ  
0-0-50 ອັຕຣາ 6 ກຣັມຕ່ອຫລຸມ (50 ກກ/ໄຮ້ )

### การใส่ປຸ່ຢີ

ມັນຝຣັ້ງອາຍຸໄດ້ 25-30 ວັນ ແລະ 40-45 ວັນ ໄສ່ປຸ່ຢີເຄມີສູຕຣ 46-0-0 ອັຕຣາ 1.5 ກຣັມຕ່ອຫັນ (12.5 ກິໂລກຣັມຕ່ອໄຮ້)  
ໂດຍໃສ່ໂຮຍເປັນແຄວຂ້າງຕັນພັກມັນຝຣັ້ງອາຍຸ 30 ເຊັນຕີເມຕຣ ແລະ ກຳຈັດວັນພື້ນຖານ

### การพ่นกรดจัลสโนนิก

ພັນกรດຈັດຈັດມັນຝຣັ້ງຕໍ່ມັນຝຣັ້ງຕາມຮັບຄວາມເຂັ້ມຂັ້ນຕາມທີ່ກຳຫັນດີໃນແຕ່ລະກຣມວິຊີ ໂດຍຈະທຳການພັນ  
ກຣດຈັດຈັດມັນຝຣັ້ງຕໍ່ມັນຝຣັ້ງ ຈຳນວນ 2 ຄຽ້ງ ຄຽ້ງທີ່ 1 ເມື່ອຕັນມັນຝຣັ້ງອາຍຸ 4-5 ສັປດາທ໌ ຄຽ້ງທີ່ 2 ເມື່ອຕັນມັນຝຣັ້ງອາຍຸ 6-7  
ສັປດາທ໌

### การເກີບເກີ່ຍ

ກຳຈັດວັນພື້ນທີ່ໃຊ້ສາຣເຄມີພິ່ນປ່ອງກັນກຳຈັດຫຼັກຫຼັກພື້ນຕະຫຼາມຄວາມເໜາະສົມຕາມຄຳແນະນຳຂອງກຣມວິຊາກາຮ່າຕຣແລະ  
ໃໝ່ໜ້າຕາມຄວາມເໜາະສົມ

### ກັບເກີບເກີ່ຍ

ເກີບເກີ່ຍຫ້ວມັນຝຣັ້ງທີ່ຮະບະສຸກແກ່ທາງສີຣະວິທຍາໃນພື້ນທີ່ເກີບເກີ່ຍວັນນາດ  $2.7 \times 4$  ເມຕຣ ເພື່ອບັນທຶກຂໍ້ມູນລ  
ຜລຜົດແລະຕຽບສອບຄຸນວາພ້ວມັນຝຣັ້ງ

### ການເຕີຣີມສາຣລະລາຍກຣດຈັດຈັດມັນຝຣັ້ງ

1.ນຳກຣດຈັດຈັດມັນຝຣັ້ງມາລະລາຍດ້ວຍນ້ັກລົ້ນລົງໃນຂວດກຣດຈັດຈັດມັນຝຣັ້ງ ພາຍໃນຕູ້ດູດກລິ່ນ

2.ເຕີຣີມນໍ້າບປິສູທີ່ ຈຳນວນ 1,000 ມິລລິລິຕຣ ເທັງໃນ volume metric flask ຈຳນວນ 950 ມິລລິລິຕຣ ແລ້ວນໍາ  
ສາຣລະລາຍກຣດຈັດຈັດມັນຝຣັ້ງທີ່ເຕີຣີມໄວ້ມາເທິ່ງໄປໃນ volume metric flask ແລ້ວເຕີມນໍ້າໃຫ້ຮັບປະມາຕຣ 1,000  
ມິລລິລິຕຣ

3.ເຕີຣີມສາຣລະລາຍກຣດຈັດຈັດມັນຝຣັ້ງຈາກສາຣລະລາຍຄວາມເຂັ້ມຂັ້ນ 10 ມິລລິກຣັມຕ່ອລິຕຣ ຈຳນວນ 5 ມິລລິລິຕຣ  
ຕ່ອນໍ້າ 1 ລິຕຣ ຕາມອັຕຣາຄວາມເຂັ້ມຂັ້ນ ດັ່ງນີ້

3.1 ກຣດຈັດຈັດມັນຝຣັ້ງທີ່ຄວາມເຂັ້ມຂັ້ນ 5 ມິລລິນິໂລລາຣ ໄດ້ດູດສາຣລະລາຍທີ່ຄວາມເຂັ້ມຂັ້ນ 10 ມິລລິກຣັມຕ່ອລິຕຣ ຈຳນວນ  
5 ມິລລິລິຕຣ ຜສມນໍ້າ 1 ລິຕຣ ຢ້ອ 100 ມິລລິລິຕຣ ຜສມນໍ້າ 20 ລິຕຣ

- 3.2 กรดจัสมีนิกที่ความเข้มข้น 10 มิลลิโมลาร์ ให้ดูดสารละลายที่ความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อลิตร จำนวน 10 มิลลิลิตรต่อลิตร ผสมน้ำ 1 ลิตร หรือ 200 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 20 ลิตร
- 3.3 กรดจัสมีนิกที่ความเข้มข้น 15 มิลลิโมลาร์ ให้ดูดสารละลายที่ความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อลิตร จำนวน 15 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 1 ลิตร หรือ 300 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 20 ลิตร
- 3.4 กรดจัสมีนิกที่ความเข้มข้น 20 มิลลิโมลาร์ ให้ดูดสารละลายที่ความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อลิตร จำนวน 20 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 1 ลิตร หรือ 400 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 20 ลิตร

#### การบันทึกข้อมูล

1. บันทึกการเจริญเติบโต เช่น ความสูง พื้นที่ใบก่อนและหลังพ่นกรดจัสมีนิก และหัวมันฝรั่ง
2. บันทึกข้อมูลผลผลิตและคุณภาพของหัวมันฝรั่ง ได้แก่ ขนาดของหัว น้ำหนักหัวแต่ละขนาด จำนวนหัวต่อตัน น้ำหนักหัวต่อตัน น้ำหนักหัวรวม น้ำหนักถ่วงจำเพาะ และเปอร์เซ็นต์แบ่ง
3. ข้อมูลอื่น ๆ ข้อมูลผลการวิเคราะห์ดิน และข้อมูลอุตุนิยมวิทยา

## เวลาและสถานที่

เริ่มต้น ตุลาคม 2560 สิ้นสุด กันยายน 2562

ศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตรตาก ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก

### 8.ผลการทดลอง

ปี 2561

การศึกษาผลของการดักจับสัตว์ต่อผลผลิตและคุณภาพหัวมันฝรั่ง เพื่อศึกษาอัตราการใช้ของจัลสโตร์ที่เหมาะสมต่อผลผลิตและคุณภาพของหัวมันฝรั่ง สามารถสรุปผลการทดลองได้ดังนี้

1.จำนวนหัวมันฝรั่งขนาดเล็ก พบว่า กรรมวิธีพ่นกรดจัลสโตร์ที่ความเข้มข้น 20 มิลลิโนลาร์ ให้จำนวนหัวมันฝรั่งขนาดเล็กเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 18,450 หัวต่อไร่ รองลงมา คือ กรรมวิธีพ่นกรดจัลสโตร์ที่ความเข้มข้น 15 มิลลิโนลาร์ ให้จำนวนหัวมันฝรั่งขนาดเล็กเฉลี่ย 20,321 หัวต่อไร่ ไม่แตกต่างทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีพ่นน้ำเปล่าที่ให้จำนวนหัวมันฝรั่งขนาดเล็กเฉลี่ย 21,804 หัวต่อไร่ (ตารางที่ 1)

2.จำนวนหัวมันฝรั่งขนาดกลาง พบว่า กรรมวิธีพ่นกรดจัลสโตร์ที่ความเข้มข้น 20 มิลลิโนลาร์ ให้จำนวนหัวมันฝรั่งขนาดกลางเฉลี่ยสูงสุด คือ 17,776 หัวต่อไร่ รองลงมา คือ กรรมวิธีพ่นกรดจัลสโตร์ที่ความเข้มข้น 15,10 และ 5 มิลลิโนลาร์ ให้จำนวนหัวมันฝรั่งขนาดกลางเฉลี่ย 15,999, 14,444 และ 13,332 หัวต่อไร่ ตามลำดับไม่แตกต่างทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีพ่นน้ำเปล่าที่ให้จำนวนหัวมันฝรั่งขนาดกลางเฉลี่ย 11,655 หัวต่อไร่ (ตารางที่ 1)

3.จำนวนหัวมันฝรั่งขนาดใหญ่ พบว่า กรรมวิธีพ่นน้ำเปล่าให้จำนวนหัวมันฝรั่งขนาดใหญ่เฉลี่ยสูงสุด คือ 41,773 หัวต่อไร่ รองลงมา กรรมวิธีพ่นกรดจัลสโตร์ที่ความเข้มข้น 20,15,10 และ 5 มิลลิโนลาร์ ให้จำนวนหัวมันฝรั่งขนาดใหญ่เฉลี่ย 40,217,39,552 39,1071 และ 32,885 หัวต่อไร่ ตามลำดับ ไม่แตกต่างทางสถิติ (ตารางที่ 1)

4.จำนวนหัวมันฝรั่งทั้งหมด พบว่า กรรมวิธีพ่นกรดจัลสโตร์ที่ความเข้มข้น 20 มิลลิโนลาร์ ให้จำนวนหัวมันฝรั่งเฉลี่ยสูงสุด คือ 76,443 หัวต่อไร่ รองลงมา คือ กรรมวิธีพ่นกรดจัลสโตร์ที่ความเข้มข้น 15 มิลลิโนลาร์ ให้จำนวนหัวมันฝรั่งเฉลี่ย 75,872 หัวต่อไร่ ไม่แตกต่างทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีพ่นน้ำเปล่าที่ให้จำนวนหัวมันฝรั่งเฉลี่ย 75,232 หัวต่อไร่ (ตารางที่ 1)

5.น้ำหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งขนาดเล็ก พบว่า กรรมวิธีพ่นกรดจัลสโตร์ที่ความเข้มข้น 20 มิลลิโนลาร์ ให้น้ำหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งขนาดเล็กเฉลี่ยน้อยสุด คือ 770 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมา คือ กรรมวิธีพ่นกรดจัลสโตร์ที่ความเข้มข้น 10 และ 15 มิลลิโนลาร์ ให้น้ำหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งขนาดเล็กเฉลี่ย 806 และ 807 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลำดับ ไม่แตกต่างทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีพ่นน้ำเปล่าที่ให้จำนวนหัวมันฝรั่งขนาดเล็กเฉลี่ย 849 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางที่ 2)

6.น้ำหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งขนาดกลาง พบว่า กรรมวิธีพ่นกรดจัลสโตร์ที่ความเข้มข้น 15 มิลลิโนลาร์ ให้น้ำหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งขนาดกลางเฉลี่ยสูงสุด คือ 1,911 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมา คือ กรรมวิธีพ่นกรดจัลสโตร์ที่ความเข้มข้น 20 และ 10 มิลลิโนลาร์ ให้น้ำหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งขนาดกลางเฉลี่ย 1,622 และ 1,500 กิโลกรัมต่อไร่

ตามลำดับ ไม่แตกต่างทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีพันน้ำเปล่าที่ให้จำนวนหัวมันฝรั่งขนาดกลางเฉลี่ย 1,384 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางที่ 2)

7. น้ำหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งขนาดใหญ่ พบร้า กรรมวิธีพ่นกรดจัลสโนนิกที่ความเข้มข้น 20 มิลลิโมลาร์ ให้น้ำหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งขนาดใหญ่เฉลี่ยสูงสุด คือ 2,860 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมา คือ กรรมวิธีพ่นกรดจัลสโนนิกที่ความเข้มข้น 10 มิลลิโมลาร์ ให้น้ำหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งขนาดใหญ่เฉลี่ย 2,840 กิโลกรัมต่อไร่ ไม่แตกต่างทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีพ่นน้ำเปล่าที่ให้จำนวนหัวมันฝรั่งขนาดใหญ่เฉลี่ย 2,800 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางที่ 1)

8. น้ำหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งทั้งหมด พบร้า กรรมวิธีพ่นกรดจัลสโนนิกที่ความเข้มข้น 20 มิลลิโมลาร์ ให้น้ำหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งทั้งหมดเฉลี่ยสูงสุด คือ 5,252 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมา คือ กรรมวิธีพ่นกรดจัลสโนนิกที่ความเข้มข้น 15,10 มิลลิโมลาร์ ให้น้ำหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งทั้งหมดเฉลี่ย 5,198 และ 5,146 กิโลกรัมต่อไร่ ไม่แตกต่างทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีพ่นน้ำเปล่าที่ให้จำนวนหัวมันฝรั่งทั้งหมด เฉลี่ย 5,033 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางที่ 2)

9. น้ำหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งที่ผ่านและไม่ผ่านเกณฑ์โรงงาน พบร้า กรรมวิธีพ่นกรดจัลสโนนิกที่ความเข้มข้น 20 มิลลิโมลาร์ ให้น้ำหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งที่ผ่านเกณฑ์โรงงานเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 4,482 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมา คือ กรรมวิธีพ่นกรดจัลสโนนิกที่ความเข้มข้น 15,10 มิลลิโมลาร์ ให้น้ำหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งที่ผ่านเกณฑ์โรงงานเฉลี่ย 4,391 และ 4,340 กิโลกรัมต่อไร่ ไม่แตกต่างทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีพ่นน้ำเปล่าที่ให้จำนวนหัวมันฝรั่งเฉลี่ย 4,184 กิโลกรัมต่อไร่ สำหรับผลผลิตหัวมันฝรั่งที่ไม่ผ่านเกณฑ์โรงงานพบว่า กรรมวิธีพ่นกรดจัลสโนนิกที่ความเข้มข้น 20 มิลลิโมลาร์ ให้น้ำหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งที่ไม่ผ่านเกณฑ์โรงงานเฉลี่ยน้อยสุด คือ 770 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมา คือ กรรมวิธีพ่นกรดจัลสโนนิกที่ความเข้มข้น 10,15 มิลลิโมลาร์ ให้น้ำหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งที่ไม่ผ่านเกณฑ์โรงงานเฉลี่ย 806 และ 807 กิโลกรัมต่อไร่ ไม่แตกต่างทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีพ่นน้ำเปล่าที่ให้จำนวนหัวมันฝรั่งที่ไม่ผ่านเกณฑ์โรงงานเฉลี่ย 849 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางที่ 3)

10. คุณภาพผลผลิต เปอร์เซ็นต์แป้ง พบร้า กรรมวิธีพ่นกรดจัลสโนนิกที่ความเข้มข้น 5 มิลลิโมลาร์ ที่ให้เปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ยสูงสุด คือ 20.10 เปอร์เซ็นต์ รองลงมากับกรรมวิธีพ่นกรดจัลสโนนิกที่ความเข้มข้น 15 มิลลิโมลาร์ ให้เปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ย 20.01 เปอร์เซ็นต์ ไม่แตกต่างทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีพ่นน้ำเปล่าที่ให้เปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ย 19.96 เปอร์เซ็นต์ สำหรับความถ่วงจำเพาะ พบร้า กรรมวิธีพ่นกรดจัลสโนนิกที่ความเข้มข้น 5 และ 15 มิลลิโมลาร์ ให้ความถ่วงจำเพาะเฉลี่ยสูงสุด คือ 1.079 รองลงมากับกรรมวิธีพ่นกรดจัลสโนนิกที่ความเข้มข้น 20 และ 5 มิลลิโมลาร์ ให้ความถ่วงจำเพาะเฉลี่ย 1.078 ไม่แตกต่างทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีพ่นน้ำเปล่าให้ความถ่วงจำเพาะเฉลี่ย 1.078 (ตารางที่ 3)

ปี 2562

การศึกษาผลของการดัดจัลสโนนิกต่อผลผลิตและคุณภาพของหัวมันฝรั่ง เพื่อศึกษาอัตราการใช้กรดจัลสโนนิกที่เหมาะสมต่อผลผลิตและคุณภาพของหัวมันฝรั่ง สามารถสรุปผลการทดลองได้ดังนี้

1. จำนวนหัวมันฝรั่งขนาดเล็ก พบร้า กรรมวิธีพ่นกรดจัลสโนนิกที่ความเข้มข้น 5 มิลลิโมลาร์ ให้จำนวนหัวมันฝรั่งขนาดเล็กเฉลี่ยน้อยสุด คือ 20,986 หัวต่อไร่ รองลงมา คือ กรรมวิธีพ่นกรดจัลสโนนิกที่ความเข้มข้น 10 และ 20 มิลลิโมลาร์ ให้จำนวนหัวมันฝรั่งขนาดเล็กเฉลี่ย 21,462 และ 22,974 หัวต่อไร่ ไม่แตกต่างทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีพ่นน้ำเปล่าที่ให้จำนวนหัวมันฝรั่งขนาดเล็กมากสุดเฉลี่ย 25,826 หัวต่อไร่ (ตารางที่ 1)

2. จำนวนหัวมันฝรั่งขนาดกลาง พบร้า กรรมวิธีพ่นกรดจัลสโนนิกที่ความเข้มข้น 10 มิลลิโมลาร์ ให้จำนวนหัวมันฝรั่งขนาดกลางเฉลี่ยสูงสุด คือ 31,163 หัวต่อไร่ รองลงมา คือ กรรมวิธีพ่นกรดจัลสโนนิกที่ความเข้มข้น 20,5 และ

15 มิลลิเมตร ให้จำนวนหัวมันฝรั่งขนาดกลางเฉลี่ย 30,193,29,298 และ 27,066 หัวต่อไร่ ตามลำดับ  
ไม่แตกต่างทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีพ่นน้ำเปล่าที่ให้จำนวนหัวมันฝรั่งขนาดกลางเฉลี่ย 26,773 หัวต่อไร่  
(ตารางที่ 1)

3.จำนวนหัวมันฝรั่งขนาดใหญ่ พบร่วมกับกรรมวิธีพ่นกรดจัดสโตร์นิกที่ความเข้มข้น 15 มิลลิโนลาร์ ให้จำนวนหัวมันฝรั่งขนาดใหญ่ เฉลี่ยสูงสุด คือ 1,363 หัวต่อไร่ รองลงมา คือ กรรมวิธีพ่นกรดจัดสโตร์นิกที่ความเข้มข้น 5, 10 และ 20 มิลลิโนลาร์ ให้จำนวนหัวมันฝรั่งขนาดขนาดใหญ่ เฉลี่ย 203, 173 และ 164 หัวต่อไร่ ตามลำดับ ไม่แตกต่างทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีพ่นน้ำเปล่าที่ไม่พบร่วมหัวมันฝรั่งขนาดใหญ่ (ตารางที่ 1)

4.จำนวนหัวมันฝรั่งรวม พบว่า กรรมวิธีพ่นกรดจัลสโนนิกที่ความเข้มข้น 20 มิลลิโมลาร์ ให้จำนวนหัวมันฝรั่งรวมเฉลี่ยสูงสุด คือ 53,331 หัวต่อไร่ รองลงมา คือ กรรมวิธีพ่นกรดจัลสโนนิกที่ความเข้มข้น 15 และ 10 มิลลิโมลาร์ ให้จำนวนหัวมันฝรั่งเฉลี่ย 52,937 และ 52,798 หัวต่อไร่ ไม่แตกต่างทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีพ่นน้ำเปล่าที่ให้จำนวนหัวมันฝรั่งเฉลี่ย 52,599 หัวต่อไร่ (ตารางที่ 1)

ให้น้ำหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งขนาดเล็กเฉลี่ยน้อยสุด คือ 501 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมา คือ กรรมวิธีพ่นกรดจัดสมอนิกที่ความเข้มข้น 5, 15 และ 10 มิลลิโนลาร์ ให้น้ำหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งขนาดเล็กเฉลี่ย 531, 587 และ 662 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลำดับ ไม่แตกต่างทางสถิติเมื่อเทียบกับกรรมวิธีพ่นน้ำเปล่าที่ให้จำนวนหัวมันฝรั่งขนาดเล็กเฉลี่ย 664 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางที่ 2)

6.น้ำหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งขนาดกลาง พบว่า กรรมวิธีพ่นกรดจัสโนนิกที่ความเข้มข้น 20 มิลลิโนลาร์ ให้น้ำหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งขนาดกลางเฉลี่ยสูงสุด คือ 2,436 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมา คือ กรรมวิธีพ่นกรดจัสโนนิกที่ความเข้มข้น 15 ,10 และ 5 มิลลิโนลาร์ ให้น้ำหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งขนาดกลางเฉลี่ย 2,331 , 2,255 และ 2,220 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลำดับ ไม่แตกต่างทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีพ่นน้ำเปล่าที่ให้จำนวนหัวมันฝรั่งขนาดกลางเฉลี่ย 2,150 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางที่ 2)

7. น้ำหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งขนาดใหญ่ พบร่วมกับกรรมวิธีพ่นกรดจัลโมนิกที่ความเข้มข้น 15 มิลลิโมลาร์ ให้น้ำหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งขนาดใหญ่เฉลี่ยสูงสุด คือ 164 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมา คือ กรรมวิธีพ่นกรดจัลโมนิกที่ความเข้มข้น 20 และ 5 มิลลิโมลาร์ ให้น้ำหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งขนาดใหญ่เฉลี่ย 30.40 และ 26.40 กิโลกรัมต่อไร่ ไม่แตกต่างทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีพ่นน้ำเปล่าที่ไม่พบร่วมกับหัวมันฝรั่งขนาดใหญ่ (ตารางที่ 2)

8.น้ำหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งทั้งหมด พบว่า กรรมวิธีพ่นกรดจัดสโนนิกที่ความเข้มข้น 20 มิลลิโมลาร์ ให้น้ำหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งทั้งหมดเฉลี่ยสูงสุด คือ 3,053 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมา คือ กรรมวิธีพ่นกรดจัดสโนนิกที่ความเข้มข้น 15,10 มิลลิโมลาร์ ให้น้ำหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งทั้งหมดเฉลี่ย 2,996 และ 2,937 กิโลกรัมต่อไร่ ไม่แตกต่างทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีพ่นน้ำเปล่าที่ให้น้ำหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งทั้งหมด เฉลี่ย 2,814 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางที่ 2)

9.น้ำหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งที่ผ่านและไม่ผ่านเกณฑ์โรงงาน พบร่วมกับกรรมวิธีพ่นกรดจัดสโตร์ที่ความเข้มข้น 20 มิลลิโมลาร์ ให้น้ำหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งที่ผ่านเกณฑ์โรงงานเฉลี่ยสูงสุด คือ 2,436 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมา คือ กรรมวิธีพ่นกรดจัดสโตร์ที่ความเข้มข้น 15,10 และ 5 มิลลิโมลาร์ ให้น้ำหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งที่ผ่านเกณฑ์โรงงานเฉลี่ย 2,331 ,2,255 และ 2,220 กิโลกรัมต่อไร่ ไม่แตกต่างทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีพ่นน้ำเปล่าที่ให้

จำนวนหัวมันฝรั่งที่ผ่านเกณฑ์โรงงานเฉลี่ย 2,150 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลำดับ สำหรับผลผลิตหัวมันฝรั่งที่ไม่ผ่านเกณฑ์ โรงงานพบว่า กรรมวิธีพ่นกรดจัสโนนิกที่ความเข้มข้น 15 มิลลิโมลาร์ ให้น้ำหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งที่ไม่ผ่านเกณฑ์ โรงงานเฉลี่ยน้อยสุด คือ 501 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมา คือ กรรมวิธีพ่นกรดจัสโนนิกที่ความเข้มข้น 5 และ 15 มิลลิโมลาร์ ให้น้ำหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งที่ไม่ผ่านเกณฑ์โรงงานเฉลี่ย 531 และ 587 กิโลกรัมต่อไร่ ไม่แตกต่างทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีพ่นน้ำเปล่าที่ให้จำนวนให้น้ำหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งที่ไม่ผ่านเกณฑ์โรงงานเฉลี่ย 664 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางที่ 3)

10. คุณภาพผลผลิต เปอร์เซ็นต์แป้ง พบว่า พบว่า กรรมวิธีพ่นกรดจัสโนนิกที่ความเข้มข้น 20 มิลลิโมลาร์ ที่ให้เปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ยสูงสุด คือ 17.48 เปอร์เซ็นต์ รองลงมากรรมวิธีพ่นกรดจัสโนนิกที่ความเข้มข้น 5, 10 และ 15 มิลลิโมลาร์ ให้เปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ย 17.27 เปอร์เซ็นต์ เท่ากันทั้ง 3 ความเข้มข้น และไม่แตกต่างทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีพ่นน้ำเปล่าที่ให้เปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ย 16.85 เปอร์เซ็นต์ สำหรับความถ่วงจำเพาะ พบว่า กรรมวิธีพ่นกรดจัสโนนิกที่ความเข้มข้น 20 มิลลิโมลาร์ ให้ความถ่วงจำเพาะเฉลี่ยสูงสุด คือ 1.067 รองลงมากรรมวิธีพ่นกรดจัสโนนิกที่ความเข้มข้น 5, 10 และ 15 มิลลิโมลาร์ ให้ความถ่วงจำเพาะเฉลี่ย 1.066 เท่ากันทั้ง 3 ความเข้มข้น ไม่แตกต่างทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีพ่นน้ำเปล่าให้ความถ่วงจำเพาะเฉลี่ย 1.064 (ตารางที่ 3)

## 9. วิจารณ์ผลการทดลอง

การศึกษาผลของกรดจัสโนนิกต่อผลผลิตและคุณภาพหัวมันฝรั่ง ดำเนินการพ่นกรดจัสโนนิกที่ความเข้มข้น 5, 10, 15 และ 20 มิลลิโมลาร์เปรียบเทียบกับกรรมวิธีพ่นน้ำเปล่า ในปี 2561 จำนวนหัวมันฝรั่ง พบว่ากรรมวิธีพ่นกรดจัสโนนิกที่ความเข้มข้น 20 มิลลิโมลาร์ ให้จำนวนหัวมันฝรั่งเฉลี่ยสูงสุด คือ 76,443 หัวต่อไร่ น้ำหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งขนาดใหญ่ และ น้ำหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งรวม เฉลี่ยสูงสุด คือ 2,860 และ 5,252 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลำดับ และยังให้หัวมันฝรั่งขนาดเล็กเฉลี่ยน้อยสุด คือ 770 กิโลกรัมต่อไร่ ด้านคุณภาพน้ำหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งที่ผ่านและไม่ผ่านเกณฑ์โรงงาน พบว่า กรรมวิธีพ่นกรดจัสโนนิกที่ความเข้มข้น 20 มิลลิโมลาร์ ให้น้ำหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งที่ผ่านเกณฑ์โรงงานเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 4,482 กิโลกรัมต่อไร่ให้น้ำหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งที่ไม่ผ่านเกณฑ์โรงงานเฉลี่ยน้อยสุด คือ 770 กิโลกรัมต่อไร่ไม่แตกต่างทางสถิติ เปอร์เซ็นต์แป้ง พบว่า กรรมวิธีพ่นกรดจัสโนนิกที่ความเข้มข้น 5 มิลลิโมลาร์ ให้เปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ยสูงสุด คือ 20.10 เปอร์เซ็นต์ ความถ่วงจำเพาะ พบว่า กรรมวิธีพ่นกรดจัสโนนิกที่ความเข้มข้น 5 และ 15 มิลลิโมลาร์ ให้ความถ่วงจำเพาะเฉลี่ยสูงสุด คือ 1.079 ไม่แตกต่างทางสถิติ ในปี 2562 จำนวนหัวมันฝรั่ง พบว่ากรรมวิธีพ่นกรดจัสโนนิกที่ความเข้มข้น 20 มิลลิโมลาร์ ให้จำนวนหัวมันฝรั่งเฉลี่ยสูงสุด คือ 53,331 หัวต่อไร่ น้ำหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งขนาดกลาง และน้ำหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งรวม เฉลี่ยสูงสุด คือ 2,436 และ 3,053 กิโลกรัมต่อไร่ นอกจากนั้นยัง พบว่า กรรมวิธีพ่นกรดจัสโนนิกที่ความเข้มข้น 15 มิลลิโมลาร์ ให้น้ำหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งขนาดใหญ่เฉลี่ยสูงสุด คือ 164 กิโลกรัม และให้หัวมันฝรั่งขนาดเล็กเฉลี่ยน้อยสุด คือ 501 กิโลกรัมต่อไร่ ด้านคุณภาพ พบว่า กรรมวิธีพ่นกรดจัสโนนิกที่ความเข้มข้น 20 มิลลิโมลาร์ ให้น้ำหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งที่ผ่านเกณฑ์โรงงานเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 2,436 กิโลกรัมต่อไร่ น้ำหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งที่ไม่ผ่านเกณฑ์โรงงานพบว่า กรรมวิธีพ่นกรดจัสโนนิกที่ความเข้มข้น 15 มิลลิโมลาร์ ให้น้ำหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งที่ไม่ผ่านเกณฑ์โรงงานเฉลี่ยน้อยสุด คือ 501 กิโลกรัมต่อไร่ เปอร์เซ็นต์แป้ง พบว่า กรรมวิธีพ่นกรดจัสโนนิกที่ความเข้มข้น 20 มิลลิโมลาร์ ให้เปอร์เซ็นต์แป้งและความถ่วงจำเพาะเฉลี่ยสูงสุด คือ 17.48 เปอร์เซ็นต์ และ 1.067 ไม่แตกต่างทางสถิติ

อย่างไรก็ตามการพ่นกรดจัสมินิกที่ความเข้มข้น ตั้งแต่ 10 ,15 และ 20 มิลลิโมลาร์ โดยเฉพาะการพ่นกรดจัสมินิกที่ความเข้มข้น 20 มิลลิโมลาร์ ทำให้มีจำนวนหัวมันฝรั่งต่อไร่ น้ำหนักผลผลิตผลิตต่อไร่ ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และกลางใหญ่ และน้ำหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งที่ผ่านและไม่ผ่านเกณฑ์งานต่อไร่และคุณภาพผลผลิตสูงสุด และมากกว่ากรรมวิธีพ่นด้วยน้ำเปล่า ซึ่งในปี 2561 พบว่าอุณหภูมิในกลางวันสำหรับการปลูกมันฝรั่งตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2561 มีอุณหภูมิเฉลี่ย 25.98 องศาเซลเซียส ซึ่งหมายความว่าการเจริญเติบโตของมันฝรั่งและ ส่งผลต่อการให้ผลผลิตและคุณภาพของหัวมันฝรั่งสูงกว่าในปี 2562 ซึ่ง พบว่าอุณหภูมิในการปลูกมันฝรั่งตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2562 มีอุณหภูมิเฉลี่ย 32.88 องศาเซลเซียส ทำให้ผลผลิตจำนวนหัวมันฝรั่งต่อไร่ น้ำหนัก ผลผลิตผลิตต่อไร่ ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และกลางใหญ่ และน้ำหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งที่ผ่านและไม่ผ่านเกณฑ์ โรงงานต่อไร่และคุณภาพผลผลิตหัวมันฝรั่งน้อยกว่าปี 2561 ประมาณ 40 - 45 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งในปี 2562 พบว่าเมื่อ อุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าส่งผลต่อผลิตตั้งปริมาณและคุณภาพของหัวมันฝรั่งจะเห็นได้ชัดเจนมากถ้าหากไม่มีการพ่นกรดจัสมินิก ซึ่งสอดคล้องผลการศึกษาของ อภิรักษ์ (2557) รายงานว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมในการปลูกมันฝรั่งโดยเฉลี่ยประมาณ 16-20 องศาเซลเซียส จะเหมาะสมในการสร้างหัวอุณหภูมิในเวลากลางวันไม่ควรเกิน 28 องศาเซลเซียส และในเวลา กลางคืนไม่ควรเกิน 18 องศาเซลเซียส นอกจากนั้นการพ่นกรดจัสมินิกยังช่วยเพิ่มปริมาณคลอโรฟิลล์ในมันฝรั่งอีกด้วยซึ่งสอดคล้องกับ ภัคภณ (2558) รายงานว่าการใช้กรดจัสมินิก ( Jasmonic Acid ) ในพืชตระกูลหัวทุกชนิด อาทิ มันสำปะหลัง, มันฝรั่ง มันเทศ, หอม, กระเทียม และ เมือก สามารถส่งเสริมและกระตุ้นกระบวนการลงหัวให้พืช (Tuberization) รวมไปถึงการสังเคราะห์แสง (Photosynthesis) ที่ดีและสมบูรณ์จะช่วยให้การลงหัวดีและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น Manjula S. et al (1994) รายงานว่าผลการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตต่อผลผลิตและ หัวมันฝรั่ง สามารถให้ผลผลิต จำนวนหัวมันฝรั่งรวมและจำนวนหัวมันฝรั่งต่อตันได้สูงสุด เมื่อใช้แพกโคลบิวทรอล อัตรา 300 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถให้ผลผลิตหัวมันฝรั่งรวมเพิ่มขึ้น 18-24 เปอร์เซ็นต์ และจำนวนหัวมันฝรั่งต่อตัน เพิ่มขึ้น 29-36 เปอร์เซ็นต์ สำหรับการใช้เมทิลจัสมโนเนต อัตรา 10 มิลลิโมลาร์ ให้ผลผลิตหัวมันฝรั่งรวมเพิ่มขึ้น 6-16 เปอร์เซ็นต์ และจำนวนหัวมันฝรั่งต่อตันเพิ่มขึ้น 5-40 เปอร์เซ็นต์ รวมเป็นจังหวัดที่มีคุณภาพหัวมันฝรั่ง

## 10. สรุปผลการทดลองและคำแนะนำ

การศึกษาผลของกรดจัสมินิกต่อผลผลิตและคุณภาพหัวมันฝรั่ง ที่มีการพ่นกรดจัสมินิกที่ความเข้มข้น 5 ,10,15 และ 20 มิลลิโมลาร์เปรียบเทียบกับกรรมวิธีพ่นน้ำเปล่า ผลการทดลอง พบว่าทั้ง 2 ปี ให้ผลการทดลองไปใน ทำงานของเดียวกัน คือ กรรมวิธีพ่นกรดจัสมินิกที่ความเข้มข้น 20 มิลลิโมลาร์ ให้จำนวนหัวมันฝรั่ง น้ำหนักผลผลิต หัวมันฝรั่งขนาดใหญ่ และ น้ำหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งรวมต่อไร่เฉลี่ยสูงสุด และให้น้ำหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งที่ผ่านเกณฑ์ โรงงานเฉลี่ยต่อไร่สูงสุด รวมทั้งเพิ่มคุณภาพของหัวมันฝรั่งในด้านเบอร์เซ็นต์แบ่งและความถ่วงจำเพาะ อัตราที่แนะนำ ให้ใช้พ่นกรดจัสมินิกที่ความเข้มข้นตั้งแต่ 10 มิลลิโมลาร์ ขึ้นไปเนื่องจากสามารถช่วยเพิ่มผลผลิตและคุณภาพหัว พันธุ์มันฝรั่งได้ และสามารถนำไปปรับใช้ในการผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่งได้และในการใช้กรดจัสมินิกพ่นให้กับมันฝรั่งควร จะมีการใส่ปุ๋ยเพิ่มมากขึ้นด้วยร่วมกับการใช้อาร์มอนต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพื่อให้เกิดความสมดุลของธาตุ อาหารให้กับมันฝรั่งที่จะถูกนำมาใช้และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

## เอกสารอ้างอิง

เกรียงศักดิ์ ไพรวรณ. 2533. ผลของเอทีฟอน เอสดีเอช เมพิคอทคลอไรด์ และบุญไนโตรเจนต่อการสะสม

น้ำหนักแห้ง ปริมาณคลอโรฟิลล์ ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตของข้าวอินดิกา. วิทยานิพนธ์  
ปริญญาโท. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

ภัคภณ ศรีคล้าย .2558. นวัตกรรมเกษตร สืบคันเมื่อ 25 เมษายน 2559 จาก <http://www.organellelife.com>

สนอง จรินทร, วิวัฒน์ ภาณุอุ่นไพ, สมพงษ์ คุตระกูล และมานพ หาญเทวี. 2551. การทดสอบพันธุ์มันฝรั่งแบบรูปใน  
การปลูกดูเ่น. หน้า 272-285. ในรายงานผลงานวิจัยประจำปี 2543-2550 ศูนย์วิจัยเกษตรกรหลวงเชียงใหม่  
กรมวิชาการเกษตร. 300 น.

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2555. รายงานพื้นที่เพาะปลูก ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่�ันฝรั่ง ปี 2550-2554.

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. เข้าถึงได้จาก เว็บไซต์: [http://www.oae.go.th/oae\\_report/export\\_import/export.php](http://www.oae.go.th/oae_report/export_import/export.php). วันที่ 7 ธันวาคม 2555.


อรทัย วงศ์เมра. 2557. ยกร่างแผนยุทธศาสตร์งานวิจัยและพัฒนามันฝรั่ง ปี 2559-2563. ศูนย์วิจัยเกษตรหลวง  
เชียงใหม่ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร .17 หน้า

อภิรักษ์ หลักชัยกุล จิราภา จอมไธสง สมบัติ ห.เพียรเจริญ ฉริยา คันธा และอรทัย วงศ์เมра 2557 การปลูกมันฝรั่ง  
กรมส่งเสริมการเกษตร กรุงเทพฯ 252 หน้า

- Brenner, M.L. 1987. The role of hormones in photosynthate partitioning and seed filling, pp. 474-493. In P.J. Davies, ed. Plant Hormones and Their Role in Plant Growth and Development. Martinus Nijhoff Publishers, New York.
- Carlson, D.R., D.J. Dver and C.D. Cotterman. 1986. The physiological basis for cytokinin induced increases in pod set in IX 93-100 soybean. *Plant Physiol.* 80: 493-499
- Manjula S. Bandara, Karen K. Tanino and Doug R. and Waterer 1995. Effect of Plant Growth Regulators on seed tuber yield in potatoes Dept. of Horticulture Science, University of Saskatchewan, Saskatoon, Saskatchewan, S7N 5A8, Canada. สืบค้นเมื่อ 4 มิถุนายน 2559, จาก [www.google.co.th/](http://www.google.co.th/) regulators increase yield of atlanticpotato
- Pan, X., M. Li, W. Xiong and L. Cao. 2000. Effect of sucrose, glutamine and plant hormones in the culture medium on starch accumulation of detached rice panicles. *Acta Agr. Univ. Jiangxiensis.* 22(1):1-5.
- Seknon, N.K. and G. Singh. 1994. Effect of growth regulators and date of sowing on grain development in wheat. *Indian J. Plant Physiol.* 37: 1-4.
- Nakamura and K. Yuki. 1992. Changes in enzyme activities associated with carbohydrate metabolism during the development of rice endosperm. *Plant Sci.* 82: 15-20.

## ภาคผนวก

ภาพที่ 1 ผลผลิตหัวมันฝรั่งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่รวมในแต่ละกรรมวิธี



ตารางที่ 1 จำนวนหัวมันฝรั่งขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่และจำนวนหัวต่อไร่ ปี 2561

กรรมวิธี	จำนวนหัวขนาดเล็ก ต่อไร่ (หัว)	จำนวนหัวขนาด กลางต่อไร่ (หัว)	จำนวนหัวขนาด ใหญ่ต่อไร่ (หัว)	จำนวนหัวต่อไร่ (หัว)
1.พ่นน้ำเปล่า (Control)	21,804	11,655	41,773	75,232
2.พ่นกรดจัลโนนิก 5 มล.โมลาร์	24,538	13,332	32,885	70,755
3.พ่นกรดจัลโนนิก 10 มล.โมลาร์	21,935	14,443	39,107	75,485
4.พ่นกรดจัลโนนิก 15 มล.โมลาร์	20,321	15,999	39,552	69,688
5.พ่นกรดจัลโนนิก 20 มล.โมลาร์	18,450	17,776	40,217	76,443
CV (%)	11.10	10.40	14.40	10.40
	ns	ns	ns	ns


ตารางที่ 2 น้ำหนักผลผลิตหัวมันฝรั่ง ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่และผลผลิตต่อไร่ ปี 2561

กรรมวิธี	น้ำหนักผลผลิตขนาด เล็กต่อไร่ (กก.)	น้ำหนักผลผลิต ขนาดกลางต่อไร่ (กก.)	น้ำหนักผลผลิตขนาด ใหญ่ต่อไร่ (กก.)	ผลผลิตต่อไร่ (กก.)
1.พ่นน้ำเปล่า (Control)	849	1,384	2,800	5,033
2.พ่นกรดจัลโนนิก 5 มล.โมลาร์	938	1,376	2,239	4,553
3.พ่นกรดจัลโนนิก 10 มล.โมลาร์	806	1,500	2,840	5,146
4.พ่นกรดจัลโนนิก 15 มล.โมลาร์	807	1,911	2,480	5,198
5.พ่นกรดจัลโนนิก 20 มล.โมลาร์	770	1,622	2,860	5,252
CV (%)	28.20	26.50	28.20	14.50
	ns	ns	ns	ns


ตารางที่ 3 น้ำหนักผลผลิตหัวมันฝรั่ง ที่ผ่านและไม่ผ่านเกณฑ์โรงงานต่อไร่ และคุณภาพผลผลิต ปี 2561

กรรมวิธี	ผลผลิตที่ไม่ผ่านเกณฑ์ โรงงานต่อไร่ Ø น้อยกว่า 4.5 ซม. (กก.)	ผลผลิตที่ผ่านเกณฑ์ โรงงานต่อไร่ Øมากกว่า 4.5 ซม. (กก.)	คุณภาพผลผลิต	
			เปอร์เซ็นต์ แป้ง (%)	ความ ถ่วงจำเพาะ
1.พ่นน้ำเปล่า (Control)	849	4,184	19.96	1.078
2.พ่นกรดจัลโนนิก 5 มล.โมลาร์	938	3,615	20.10	1.079
3.พ่นกรดจัลโนนิก 10 มล.โมลาร์	806	4,340	19.91	1.078
4.พ่นกรดจัลโนนิก 15 มล.โมลาร์	807	4,391	20.01	1.079
5.พ่นกรดจัลโนนิก 20 มล.โมลาร์	770	4,482	19.80	1.078
CV (%)	28.20	13.40	1.70	
	ns	ns	ns	


กราฟที่ 1 แสดงจำนวนหัวมันฝรั่งขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่และจำนวนหัวต่อไร่ ปี 2561




กราฟที่ 2 แสดงน้ำหนักผลผลิตหัวมันฝรั่ง ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่และผลผลิตต่อไร่ ปี 2561



กราฟที่ 3 แสดงน้ำหนักผลผลิตหัวมันฝรั่ง ที่ผ่านและไม่ผ่านเกณฑ์โรงงานต่อไป ปี 2561



กราฟที่ 4 แสดงคุณภาพผลผลิต ปี 2561



ภาพที่ 2 ผลิตผลิตมันฝรั่งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ในแต่ละกรรมวิธี



ตารางที่ 4 จำนวนหัวมันฝรั่งขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และจำนวนหัวต่อไร่ ปี 2562

กรรมวิธี	จำนวนหัวขนาดเล็ก ต่อไร่ (หัว)	จำนวนหัวขนาด กลางต่อไร่ (หัว)	จำนวนหัวขนาด ใหญ่ต่อไร่ (หัว)	จำนวนหัวต่อไร่ (หัว)
1.พ่นน้ำเปล่า (Control)	25,826	26,773	00.00	52,599
2.พ่นกรดจัสมินิก 5 มล.โอมลาร์	20,986	29,298	203	50,487
3.พ่นกรดจัสมินิก 10 มล.โอมลาร์	21,462	31,163	173	52,798
4.พ่นกรดจัสมินิก 15 มล.โอมลาร์	24,508	27,066	1,363	52,937
5.พ่นกรดจัสมินิก 20 มล.โอมลาร์	22,974	30,193	164	53,331
CV (%)	11.10	10.40	14.40	11.97
	ns	ns	ns	ns


ตารางที่ 5 น้ำหนักผลผลิตหัวมันฝรั่ง ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และผลผลิตต่อไร่ ปี 2562

กรรมวิธี	น้ำหนักผลผลิตขนาดเล็ก ต่อไร่ (กก.)	น้ำหนักผลผลิต ขนาดกลางต่อไร่ (กก.)	น้ำหนักผลผลิตขนาด ใหญ่ต่อไร่ (กก.)	ผลผลิตต่อไร่ (กก.)
1.พ่นน้ำเปล่า (Control)	664	2,150	00.00	2,814
2.พ่นกรดจัสมินิก 5 มล.โอมลาร์	531	2,220	26.40	2,777
3.พ่นกรดจัสมินิก 10 มล.โอมลาร์	662	2,255	20.00	2,937
4.พ่นกรดจัสมินิก 15 มล.โอมลาร์	501	2,331	164	2,996
5.พ่นกรดจัสมินิก 20 มล.โอมลาร์	587	2,436	30.40	3,053
CV (%)	33.00	14.40	171.50	10.90
	ns	ns	ns	ns


ตารางที่ 6 น้ำหนักผลผลิตหัวมันฝรั่ง ที่ผ่านและไม่ผ่านเกณฑ์โรงงานต่อไร่และคุณภาพผลผลิต ปี 2562

กรรมวิธี	ผลผลิตที่ไม่ผ่านเกณฑ์โรงงาน ต่อไร่ Ø น้อยกว่า 4.5 ซม. (กก.)	ผลผลิตที่ผ่านเกณฑ์โรงงาน ต่อไร่ Øมากกว่า 4.5 ซม. (กก.)	คุณภาพผลผลิต	
			เปอร์เซ็นต์ แบ่ง (%)	ความ ถ่วงจำเพาะ
1.พ่นน้ำเปล่า (Control)	664	2,150	16.85	1.064
2.พ่นกรดจัสมินิก 5 มล.โอมลาร์	531	2,220	17.27	1.066
3.พ่นกรดจัสมินิก 10 มล.โอมลาร์	662	2,255	17.27	1.066
4.พ่นกรดจัสมินิก 15 มล.โอมลาร์	501	2,331	17.27	1.066
5.พ่นกรดจัสมินิก 20 มล.โอมลาร์	587	2,436	17.48	1.067
CV (%)	33.00	14.40	1.70	1.70
	ns	ns	ns	ns


กราฟที่ 5 จำนวนหัวมันฝรั่งขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่และจำนวนหัวต่อไร่ ปี 2562



กราฟที่ 5 แสดงจำนวนหัวมันฝรั่งขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่และจำนวนหัวต่อไร่ ปี 2562



กราฟที่ 7 แสดงน้ำหนักผลผลิตหัวมันฝรั่ง ที่ผ่านและไม่ผ่านเกณฑ์โรงงานต่อไร่ ปี 2562



กราฟที่ 8 แสดงคุณภาพผลผลิต ปี 2562

