

รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองที่สิ้นสุด

ชุดโครงการวิจัย	วิจัยและพัฒนาสับปะรด
โครงการวิจัย	การปรับปรุงพันธุ์สับปะรด
กิจกรรมที่ 1	การปรับปรุงพันธุ์สับปะรดที่เหมาะสมสำหรับการบริโภคผลสด
กิจกรรมย่อยที่ 2.2	การปรับปรุงพันธุ์สับปะรดสำหรับการบริโภคผลสดชุดที่ 2 (ดำเนินการต่อเนื่องปี 2548-2553)
ชื่อการทดลองที่ 2.2.2	การเปรียบเทียบสายต้นกลุ่มควีนที่ทนทานต่อการเกิดอาการไส้สีน้ำตาล Comparison group Queen Pineapple that was resistant to browning when refrigerated transport.

คณะผู้ดำเนินงาน

นายพฤกษ์ คงสวัสดิ์¹

เอื้องฟ้า หอมสุวรรณ¹ นิตยา คงสวัสดิ์¹ ธวัชชัย นิมกิงรัตน์¹ ทวีศักดิ์ แสงอุดม²

บทคัดย่อ (ภาษาไทย)

สับปะรด (*Ananas comosus* L. Merr) เป็นผลไม้ส่งออกที่สำคัญของประเทศไทยแต่ทั้งหมดเป็นสับปะรดพันธุ์สำหรับอุตสาหกรรม ปัจจุบันสับปะรดบริโภคผลสดเป็นสินค้าที่ตลาดต้องการสูงเพื่อให้ประเทศไทยยังสามารถแข่งขันในตลาดโลก ทำให้กรมวิชาการเกษตรได้เร่งพัฒนาพันธุ์สับปะรดบริโภคผลสด พบว่า มี 6 สายต้นที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นพันธุ์การค้า คือ สวี 6 สวี 18 ตราดสีทอง 4 ตราดสีทอง 20 ภูเก็ต 3 และภูเก็ต 20 จึงได้ทำการขยายปริมาณเพื่อการทดลอง พร้อมกับศึกษาเทคนิคในการขยายสับปะรดพันธุ์ MD2 สำหรับเป็นพันธุ์สับปะรดรับประทานผลสดในเชิงการค้าของประเทศไทยในอนาคต

ผลการศึกษา พบว่า

1. การขยายปริมาณสับปะรดพันธุ์คัดเลือก พบว่า สามารถขยายพันธุ์สับปะรดพันธุ์คัดเลือกได้เพียง 5 พันธุ์ คือ สวี 6 สวี 18 ตราดสีทอง 20 ภูเก็ต 3 และภูเก็ต 20 โดยพันธุ์ที่ยังไม่สามารถขยายได้ คือ ตราดสีทอง 4 ได้ขยายพันธุ์สำรองไว้อีก 3 เบอร์ คือ สวี 2 ตราดสีทอง 3 และตราดสีทอง 8

2. ศึกษาเทคนิคในการขยายสับปะรดพันธุ์ MD2

2.1 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสับปรดพันธุ์ MD2 พบว่า อาหารสูตร Murashige and Skoog 1962 (MS) เพิ่ม 6-benzylaminopurine (BA) ระดับ 8 มิลลิกรัมต่อลิตร เหมาะสมกับระบบอาหารแข็ง. อาหารสูตร MS เพิ่ม BA ระดับ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร เหมาะสมกับระบบอาหารเหลว. และอาหารสูตร MS เพิ่ม BA ระดับ 7 มิลลิกรัมต่อลิตร เหมาะสมกับระบบอาหารเหลวแบบจมชั่วคราว (TIB).

2.2 การนำต้นเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อออกปลูก พบว่า ทวาย เป็นวัสดุปลูกที่เหมาะสมที่สุดในฤดูร้อน และฤดูฝนมีเส้นผ่านศูนย์กลางมากที่สุด 12.95 และ 13.95 เซนติเมตร ตามลำดับ. วัสดุปลูกที่เหมาะสม รองลงมา คือ ในฤดูร้อน ใช้ทวายผสมขุยมะพร้าวอัตราส่วน 1:1 และฤดูฝน ใช้พีทมอส โดยแตกต่างอย่าง มีนัยสำคัญกับกรรมวิธีอื่น ๆ .

2.3 การจัดการต้นสับปรดในโรงเรือนเพาะชำ พบว่า การให้ปุ๋ยอัตราส่วนของธาตุอาหาร N P K ที่ 3:1:5 ที่ระดับความเข้มข้น 200 ppm จะมีเส้นผ่านศูนย์กลางมากที่สุด 22.10 เซนติเมตร ใน 12 สัปดาห์ แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญกับกรรมวิธีอื่น ๆ

¹ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ² สถาบันวิจัยพืชสวน

Abstract

Pineapple (*Ananas comosus* L. Merr) be the fruit exports that important of Thailand. But, all pineapple breed for the industry. Now the pineapple fresh consumes breed is goods that the market wants tall. For, Thailand still can compete in the world market. The Department of Agriculture has hurried to develop pineapple breed consumes fresh, meet that, have 6 Clone, there is the latency in the development is business breed, be, Sve 6 sve 18 Golden Tran 4 Golden Tran 20 Puket 3 and Puket 20, then get do propagation for the experiment. And study the technique in 'MD2' pineapple population, for pineapple breed will eat fresh in commercial of Thailand in the future.

The education, meet that.

1. Pineapple selective breed propagation. , meet that, Can propagated to Sve 6 sve 18 Golden Tran 20 Puket 3 and Puket 20. , Can't propagated Golden Tran 4. Get breed reserve keep again 3 number. , be Sve 2 Golden Tran 3 and Golden Tran 8

2. Study the technique in 'MD2' pineapple propagation. ,

2.1 Tissue culture in 'MD2' pineapple. , meet that, Formula food, Murashige and Skoog 1962 (MS) add 6 - benzylaminopurine (BA) 8 mg. / liter, be appropriate food hard system. Formula food MS add BA, 5 mg. / liter, be appropriate food liquid system. , and Formula food MS add BA 7 mg. / liter, be appropriate food liquid system by temporary (TIB).

2.2 lead the tissue Culture go out to grow. , Sand, be the planting material that is appropriate most in the summer and the rainy season has a diameter most 12.95 and 13.95 centimeter , respectively. , the inventory grows that is appropriate next, be, in the summer, use the sand mixes coconut ratio 1:1 and the rainy season, use Peas moss. , by significant difference with other treatments.

2.3 The Management pineapple in the nursery. , meet that, the fertilizer nutrients N P K ratio of 3:1:5 to 200 ppm level, the intensity of competition is 22.10 centimeters in diameter on 12 week. , the most significant difference with other treatments.

¹ Sisaket Horticultural Research Center ² Institute of Horticulture .

คำนำ

สับปะรด (*Ananas comosus* L. Merr) เป็นผลไม้ส่งออกที่สำคัญของไทยสร้างรายได้ปีละไม่ต่ำกว่า 15,000 ล้านบาท แต่ทั้งหมดเป็นสับปะรดสำหรับอุตสาหกรรม ปัจจุบันสับปะรดบริโภคผลสดเป็นสินค้าที่ตลาดต้องการสูงมาก ในประเทศมาเลเซียกำลังเร่งนำเข้าหน่อสับปะรดบริโภคผลสดพันธุ์ MD2 หรือมาเลเซียเรียกว่า Sweet Gold MD2 เฉพาะปี 2554 มาเลเซียเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสับปะรดพันธุ์ MD2 มากถึง 2 ล้านต้น (เสลา ,2554.) เพื่อให้สับปะรดของไทยสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ จำเป็นต้องเร่งพัฒนาพันธุ์สับปะรดบริโภคผลสด แต่พันธุ์สับปะรดของไทยไม่สามารถส่งออกเป็นผลสดได้เนื่องจากเกิดอาการไส้สีน้ำตาลเมื่อเก็บที่อุณหภูมิต่ำ ในปี 2549- 2553 กรมวิชาการเกษตรปรับปรุงพันธุ์สับปะรดทานสดโดยการคัดเลือกสายต้นสับปะรดกลุ่มควีนที่ทนทานต่อการเกิดอาการไส้สีน้ำตาล และเปรียบเทียบในปี 2554 -2558 ได้สายต้นดีเด่น 57 สายต้น นำมาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได้เพียง 26 สายต้น ได้แก่ 1. พันธุ์ สวี 11 สายต้น ได้แก่ สวี 2 สวี 3 สวี 5 สวี 6 สวี 7 สวี 9 สวี 10 สวี 11 สวี 15 สวี 16 และ สวี 18 2. พันธุ์ ทรายสีทอง 7 สายต้น ได้แก่ ทราย 3 ทราย 4 ทราย 9 ทราย 12 ทราย 13 ทราย 18 และ ทราย 20 และ 3. พันธุ์ภูเก็ต 7 สายต้น ได้แก่ ภูเก็ต 3 ภูเก็ต 11 ภูเก็ต 12 ภูเก็ต 14 ภูเก็ต 16 ภูเก็ต 19 และภูเก็ต 20 (พฤษ,2556) ในปี 2556 นำต้นสับปะรดที่ได้ปลูกเปรียบเทียบที่ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี และศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ พบว่า มีสับปะรด 6 สายต้นที่ดีเด่นสามารถทนทานต่อการเกิดอาการไส้สีน้ำตาลได้ดี ได้แก่ สวี 6 สวี 18 ทรายสีทอง 4 ทรายสีทอง 20 ภูเก็ต 3 และภูเก็ต 20 จึงนำสายต้นดังกล่าวขยายพันธุ์เพื่อปลูกทดสอบในปี 2559-2562 ต่อไป พร้อมกับศึกษาเทคนิคในการขยายสับปะรดพันธุ์ MD2 หรือ หอมสุวรรณ ซึ่งเป็นสับปะรดพันธุ์รับประทานสดหลักของโลกปลูกแพร่หลายในหลายประเทศ เช่น มาเลเซีย อัลซาวดอร์ ปานามา กัวเตมาลา ฮังดูรัส และโคสตาริกา (unknowwn , 2556) สับปะรดพันธุ์นี้พัฒนาพันธุ์ตั้งแต่ปี 2512 โดย Pineapple Research Institute (PRI) รัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา เดิมเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทเดลมอนต์จำกัดแต่ในปี 2551 ลิขสิทธิ์คุ้มครอง

สายพันธุ์ MD2 ได้หมดลงทำให้หลาย ๆ ประเทศได้เร่งขยายปริมาณอย่างเร่งด่วน ในมาเลเซีย รัฐบาลมาเลเซียกำลังเร่งนำเข้าหน่อพันธุ์ MD2 ให้ได้ 2 ล้านต้น (เกษตรแผ่นดินทอง, ว 16/09/2554) มีลักษณะเด่น เนื้อเหลืองสม่ำเสมอ หนามน้อย ให้ผลผลิตเร็ว วิตามินซีสูงกว่าพันธุ์ทั่วไป 4 เท่า อายุการเก็บรักษาดี (ทวีศักดิ์, 2555) จุดเด่นอีกประการหนึ่ง คือ สามารถขนส่งทางเรือได้ในห้องเย็นที่อุณหภูมิต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส นาน 10 วัน โดยไม่มีอาการไส้สีน้ำตาลทำให้เป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก ปัจจุบันประเทศไทยเริ่มปลูกสับปะรดพันธุ์นี้ไม่มากนักแต่มีการขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีความต้องการของภาคเอกชนที่ต้องการต้องให้กรมวิชาการเกษตรทำการขยายปริมาณเพิ่มต้นพันธุ์ MD2 จำนวน 1 ล้านต้น (จากการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสับปะรดแห่งชาติ, 2555) แต่ในขณะนั้นกรมวิชาการเกษตรยังไม่มีเทคโนโลยีการขยายพัฒนาสับปะรดพันธุ์ MD2 อย่างครบถ้วน จึงต้องศึกษาขั้นตอนการเพาะเลี้ยงตลอดจนเทคนิคการออกปลูกสับปะรดพันธุ์ MD2 เพิ่มเติม

วิธีดำเนินการ :

- อุปกรณ์

1. พันธุ์สับปะรดกลุ่มควีนพันธุ์คัดเลือกกว่าหนานต่อการเกิดอาการไส้สีน้ำตาล และสับปะรดบริเวณสศ พันธุ์ MD2 จากโรงเรือนควบคุมโรค และแปลงเกษตรกรโดยตรง
2. ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
3. โรงเรือนอนุบาล และโรงเรือนเพาะชำ
4. ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี
5. ถาดเพาะขนาด 107 ช่อง กระถาง และถุงพลาสติกขนาด 12 x
6. ยานพาหนะ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์กล้องถ่ายภาพ
7. อุปกรณ์บันทึกข้อมูล และบันทึกภาพ

- วิธีการ

วิธีปฏิบัติการทดลอง

แบ่งการทดลองออกเป็น 2 ส่วนคือ

1. ศึกษาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเบื้องต้นกับสับปะรดพันธุ์คัดเลือกของกรมวิชาการเกษตร
2. ศึกษาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเบื้องต้นกับสับปะรดพันธุ์ MD2 และขั้นตอนการออกปลูกต้นสับปะรดที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในโรงเรือนอนุบาล มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

1. ศึกษาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเบื้องต้นกับสับปะรดพันธุ์คัดเลือกของกรมวิชาการเกษตร

แบบและวิธีการทดลอง

ไม่มีแผนการทดลอง ขยายปริมาณสับปะรดพันธุ์คัดเลือกของกรมวิชาการเกษตร 6 พันธุ์ ได้แก่ สวี 6 สวี 18 ทรายทอง 4 ทรายทอง 20 ภูเก็ต 3 และภูเก็ต 20

ขั้นตอนการ

1.1 การฟอกหน่อและจุกสับประรดพันธุ์คัดเลือกของกรมวิชาการเกษตร

1.1.1 นำต้นสับประรดพันธุ์คัดเลือกของกรมวิชาการเกษตรปลูกในโรงเรือนกันฝน และฉีดพ่นด้วยสารเคมีป้องกันและกำจัดโรคและแมลงอย่างน้อย 2 เดือน และนำหน่อและตะเกียงจากแปลงปลูกโดยตรง

1.1.1 นำหน่อข้างและจุกสับประรดพันธุ์คัดเลือกของกรมวิชาการเกษตร ฟอกในฟอกฆ่าเชื้อโดยใช้สารคลอรีนความเข้มข้น 15 และ 10 % ตามลำดับ แล้วนำไปเพาะเลี้ยงในอาหารแข็งสูตร Murashige and Skoog, 1962 (MS) ทิ้งไว้ 2 สัปดาห์ จึงเริ่มสับขยายปริมาณ

1.2 การเพิ่มปริมาณต้นสับประรดพันธุ์คัดเลือกของกรมวิชาการเกษตร

1.2.1 นำต้นสับประรดที่ฟอกฆ่าเชื้อและเลี้ยงในอาหารแข็งสูตร MS มาสับเปลี่ยนอาหารเป็น MS เต็ม สารควบคุมการเจริญเติบโตพืช 6-benzylaminopurine (BA) 1-2 มิลลิกรัมต่อลิตร (มล./ลิตร) สับขยายทุก 14-21 วัน จนได้ปริมาณ 10,000 ต้นต่อพันธุ์

1.2.2 หลังขยายสับขยายได้ 20 – 30 วัน นำต้นสับประรดสับต้นเพื่อเปลี่ยนอาหารสำหรับการเร่งราก ได้แก่ MS เต็มสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช 1-Naphthaleneacetic acid (NAA) 1-2 มล./ลิตร นำต้นสับประรดขนาด 2-3 นิ้วนำออกปลูกในโรงเรือนอนุบาลกันฝนโดยใช้ขุยมะพร้าวเป็นวัสดุปลูก

1.2.3 หลังปลูก 1 เดือน ย้ายปลูกในถุงพลาสติกดำขนาด 6x 8 นิ้ว หลังปลูก 3 เดือนต้นสับประรดมีขนาด 8-10 นิ้ว พร้อมออกปลูกในแปลงทดสอบในปี 2559 ต่อไป

2. ศึกษาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเบื้องต้นกับสับประรดพันธุ์ MD2 และขั้นตอนการออกปลูกต้นสับประรดที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในโรงเรือนอนุบาล

2.1 การศึกษาสูตรอาหารเบื้องต้นสำหรับสับประรดพันธุ์ MD2

เนื่องจากสับประรดพันธุ์ MD2 เป็นสับประรดพันธุ์ใหม่ที่ยังไม่เคยศึกษาวิธีการขยายพันธุ์ในอาหารแต่ละสูตรศึกษาในระบบอาหารแข็ง ระบบอาหารเหลว และระบบอาหารเหลวแบบจมชั่วคราว (temporary immersion Bioreactor (TIB)) โดยนำต้นสับประรดพันธุ์ MD2 จากแปลงเกษตรกรปลูกในโรงเรือนกันฝน และฉีดพ่นด้วยสารเคมีป้องกันและกำจัดโรคและแมลงอย่างน้อย 2 เดือน และนำหน่อและตะเกียงจากแปลงปลูกโดยตรง นำหน่อข้างและจุกพันธุ์สับประรดพันธุ์ MD2 ฟอกในฟอกฆ่าเชื้อโดยใช้สารคลอรีนที่ระดับความเข้มข้น 15 และ 10 % ตามลำดับ แล้วนำไปเพาะเลี้ยงในอาหารแข็งสูตร MS ทิ้งไว้ 2 สัปดาห์ จึงเริ่มสับขยายปริมาณ

2.1.1 การศึกษาสูตรอาหารเบื้องต้นสำหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสับประรดพันธุ์ MD2

2.1.1.1 ศึกษาการเพาะเลี้ยงในระบบอาหารแข็ง โดยใช้อาหารสูตร MS เพิ่ม BA ที่ระดับ 2.0 มล./ลิตร เป็นชุดควบคุม (Control) ตามผลการศึกษาของ Kiss (2538) วางแผนแบบ CRD จำนวน 4 กรรมวิธี 10 ซ้ำ ๆ ละ 4 ต้น กรรมวิธี คือ อาหารสูตร MS เต็มสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช BA ที่ระดับ 2 4 6 และ 8 มล./ลิตร ติดตามการพัฒนาในสัปดาห์ที่ 4 5 และ 6 สัปดาห์

2.1.1.2 ศึกษาการเพาะเลี้ยงในระบบอาหารเหลว โดยใช้อาหารสูตร MS เพิ่ม BA ที่ระดับ 5.0 มล./ลิตร เป็นชุดควบคุม (Control) ตามผลการศึกษาของ Danso (2551) ศึกษาเบื้องต้นโดยใช้อาหารสูตร MS เต็มสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช BA ที่ระดับ 1 3 5 และ 7 มล./ลิตร ติดตามการพัฒนาในสัปดาห์ที่ 4 สัปดาห์

2.1.1.3 ศึกษาการเพาะเลี้ยงในระบบอาหารเหลวแบบจมชั่วคราว (temporary immersion Bioreactor (TIB)) โดยใช้อาหารสูตร MS เพิ่ม BA ที่ระดับ 5.0 มล./ลิตร เป็นชุดควบคุม (Control) ตามผลการศึกษาของ Danso (2551) ศึกษาเบื้องต้นโดยใช้อาหารสูตร MS ที่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช BA ที่ระดับ 1 3 5 และ 7 มล./ลิตร ติดตามการพัฒนาในสัปดาห์ที่ 4 สัปดาห์

2.2 การจัดการอนุบาลต้นพันธุ์สับปะรดที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ประกอบด้วย 2 การทดลองย่อย คือ

2.2.1 ศึกษาวัสดุปลูกที่เหมาะสมในการออกปลูกต้นกล้าสับปะรดพันธุ์ MD2 วางแผนการทดลองแบบ CRD จำนวน 6 กรรมวิธี 4 ซ้ำๆ 49 ต้น กรรมวิธี คือ วัสดุปลูก 5 ชนิด เปรียบเทียบกับวัสดุปลูกที่นิยม ดังนี้ 1. ททราย 2. ขุยมะพร้าว 3.เส้นใยมะพร้าว 4.พีทมอส 5.ทรายผสมพีทมอสอัตราส่วน 1:1 และ 6. ทรายผสมขุยมะพร้าวอัตราส่วน 1:1 (Control) ทดลอง 3 ช่วง คือ ฤดูหนาว ฤดูร้อน และฤดูฝน

ขั้นตอนและวิธีการ

2.2.1 เตรียมต้นสับปะรดพันธุ์ MD2 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางพุ่ม 3-5 ซม.จำนวน 1,200 ต้นต่อช่วงฤดู

2.2.2 ปลูกในถาดเพาะขนาด 72 ช่อง (8 x 9 ช่อง) โดยวัสดุปลูก ตามกรรมวิธี วางบนชั้นวางในโรงเรือนเพาะชำแบบมีหลังคาควบคุมความชื้นในอากาศ และวัสดุปลูกให้สม่ำเสมอ

2.2.3 เก็บข้อมูลการรอดตายของต้นสับปะรด การเจริญเติบโตเช่น เส้นผ่านศูนย์กลางต้น จำนวนและความยาวราก ระยะเวลาอนุบาลจนสามารถออกปลูกในแปลงอนุบาล

2.2.4 ทำการทดลอง 3 ครั้งในช่วงฤดูหนาว ฤดูร้อนและฤดูฝน และนำข้อมูลที่วิเคราะห์ทางสถิติ หาวัสดุปลูกที่เหมาะสมในแต่ละฤดู

2.2.2 ศึกษาผลของธาตุอาหารที่มีต่อการเจริญเติบโตและความแข็งแรงของต้นกล้าสับปะรดพันธุ์ MD2 ในโรงเรือนอนุบาล วางแผนการทดลองแบบ RCB 6 กรรมวิธี 4 ซ้ำๆ ละ 40 ต้น กรรมวิธีที่ 1- 2 คือใช้ปุ๋ยทางใบสัดส่วน 4:2:5 ที่ระดับความเข้มข้น 100 และ 200 ppm.กรรมวิธีที่ 3-4 ใช้ปุ๋ยทางใบสัดส่วน .3:1:5 ที่ระดับความเข้มข้น 100 และ 200 ppm. กรรมวิธีที่ 5 ใช้ปุ๋ยทางใบสัดส่วน 1:1:1 ระดับความเข้มข้น 200 ppm. และกรรมวิธีที่ 6 ไม่มีการพ่นปุ๋ยทางใบ (Control) ทดลองในช่วงฤดูร้อน

ขั้นตอนและวิธีการ

2.2.2.1 ย้ายปลูกต้นสับปะรดที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหลังอนุบาลได้ 1 เดือน หรือขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางพุ่ม 10 ซม. ลงในแปลงปลูกขนาด 1.2 x 10 เมตร ใช้ระยะปลูก 12 x12 ซม.ปลูกเป็น 6 ช่วง ๆ ละ 1.5 เมตร

2.2.2.2 หลังปลูก 2 สัปดาห์ ฉีดพ่นปุ๋ยทางใบตามกรรมวิธีสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนครบ 3 เดือน

2.2.2.3 เก็บข้อมูลการเจริญเจริญเติบโต เส้นผ่านศูนย์กลางต้น ทุกสัปดาห์ และวัดความยาวรากเมื่อครบ 3 เดือน

2.2.2.4 นำข้อมูลที่วิเคราะห์ทางสถิติ หาอัตราปุ๋ยที่เหมาะสมในการอนุบาลก่อนออกปลูกต้นกล้าสับปะรดที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

การบันทึกข้อมูล

- เวลาและสถานที่

เริ่มต้น ตุลาคม 2557 สิ้นสุดกันยายน 2558

สถานที่ทำการทดลอง

ศูนย์วิจัยวิจัยพืชสวนศรีสะเกษ

ผลการทดลองและวิจารณ์

1. ศึกษาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเบื้องต้นกับสับปะรดพันธุ์คัดเลือกของกรมวิชาการเกษตร

1.1 ขั้นตอนการฟอกหน่อและจุกสับปะรด จากการฟอกหน่อ และจุกสับปะรดพันธุ์ สวี 6 สวี 18 ตราดสีทอง 4 ตราดสีทอง 20 ภูเก็ต 3 และ ภูเก็ต 20 จากแปลงควบคุมโรค และจากหน่อจากแปลงเปรียบเทียบ พบว่า สามารถขยายพันธุ์สับปะรดพันธุ์คัดเลือกได้เพียง 5 พันธุ์ คือ สวี 6 สวี 18 ตราดสีทอง 20 ภูเก็ต 3 และภูเก็ต 20

โดยพันธุ์ที่ยังไม่สามารถขยายได้ คือ ตราดสีทอง 4 แต่ได้ขยายพันธุ์สำรองไว้อีก 3 เบอร์ คือ สวี 2 ตราดสีทอง 3 และตราดสีทอง 8

1.2 ศึกษาความสามารถในการขยายปริมาณ พบว่า ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ สายต้น สวี 18 มีความสามารถในการขยายปริมาณ มากที่สุด รองลงมาคือ ตราดสีทอง 20 และภูเก็ต 20 (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ปริมาณต้นสับปะรดที่ขยายปริมาณโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในห้องปฏิบัติการ

สายต้น	แบ่งจำนวนตามขั้นตอนการเพาะเลี้ยง				หมายเหตุ
	ใน Lab เพาะเลี้ยง	ในโรงเรือน อนุบาล	ในโรงเรือน เพาะชำ	รวม	
1.1 สวี 6	2,200	2,000	500	4,700	ขยายจากหน่อใหม่
1.2 สวี 18	6,800	2,000	3,000	11,800	ขนาดจากต้นแม่ จำนวน 2 ขวด ยัง
1.3 ตราดสีทอง 4	-	-	-	-	ไม่ได้สามารถฟอกได้
1.4 ตราดสีทอง 20	4,700	500	2,000	7,200	ขนาดจากต้นแม่ จำนวน 2 ขวด
1.5 ภูเก็ต 3	2,700	500	1,000	4,100	ขยายจากหน่อใหม่
1.6 ภูเก็ต 20	2,700	1,000	2,000	5,700	ขนาดจากต้นแม่ จำนวน 2 ขวด
<u>พันธุ์ สำรอง</u>					
1.7 สวี 2	1,900	200	200	2,300	เริ่มขยายแทน ตราดสีทอง 4
1.8 ตราดสีทอง 3	170	-	-	170	เริ่มฟอกใหม่
1.9 ตราดสีทอง 8	150	-	-	170	เริ่มฟอกใหม่
	21,320	6,200	8,500	36,020	

* หมายเหตุ ข้อมูลปริมาณ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2558

2. ศึกษาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเบื้องต้นกับสับปรดพันธุ์ MD2 และขั้นตอนการออกปลูกต้นสับปรดที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในโรงเรือนอนุบาล

2.1 การศึกษาสูตรอาหารเบื้องต้นสำหรับสับปรดพันธุ์ MD2

พอกหน่อ และจุกสับปรดพันธุ์ MD2 จากแปลงเกษตรกรโดยตรง ไม่สามารถพอกชำเชื้อได้ (ภาพที่ 1) แต่หน่อและจุกสับปรดพันธุ์ MD2 ที่นำมาปลูกควบคุมโรคและแมลงในปี 2557 (จำนวน 50 ต้น) สามารถพอกหน่อได้ร้อยละ 80-90 ต่อการพอกแต่ละครั้ง (ภาพที่ 2)

สรุปได้ว่า ควรเตรียมพืชในสภาพควบคุมโรคและแมลงก่อนนำขึ้นส่วนมาพอกไม่น้อยกว่า 7 เดือน และพบว่า การพอกจุกสับปรดจะประสบผลสำเร็จมากกว่าหน่อข้างสับปรดร้อยละ 10-20

ภาพที่ 1 การพอกจากหน่อ/จุกของเกษตรกรโดยตรง



ภาพที่ 2 หน่อและจุกสับปรดพันธุ์ MD2 ที่นำมาปลูกควบคุมโรคและแมลงในปี 2557



2.1.1 ศึกษาการเพาะเลี้ยงในระบบอาหารแข็ง พบว่า ในอาหารสูตร MS ที่เพิ่ม BA ระดับ ๆ ให้ผลมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 99 % ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 4- 6 โดยอาหารสูตร MS เติม BA ที่

ระดับ 8 มก./ลิตร มีจำนวนหน่อใหม่เฉลี่ยสูงสุด 3.8 4.6 และ 5.4 หน่อ ตามลำดับ แตกต่างกับ BA ที่ระดับ 6 2 และ 4 มก./ลิตร ตามลำดับ (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 จำนวนหน่อสับประรดพันธุ์ MD2 ในอาหารสูตรต่าง ๆ ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 0 4 5 และ 6

กรรมวิธี	ระยะที่เพาะเลี้ยง (สัปดาห์)			
	0 สัปดาห์	4 สัปดาห์	5 สัปดาห์	6 สัปดาห์
MS + 2BA	1.0	2.0 b	2.0 b	2.0 b
MS + 4BA	1.0	1.6 b	1.8 b	1.8 b
MS + 6BA	1.0	2.4 b	2.4 b	2.8 b
MS + 8BA	1.0	3.8 a	4.6 b	5.4 a
F-test	ns	**	**	**
Cv	0	18.25	16.56	18.26

ซึ่งพบว่า ในสับประรดพันธุ์ MD2 จะต้องใช้ BA ในระดับที่สูงถึง 6- 8 มก./ลิตร แตกต่างกับสับประรดพันธุ์ปัตตาเวียนที่ใช้ BA ในระดับ 1-2 มก./ลิตร เท่านั้น แต่จากการสังเกต พบว่า สูตรอาหาร MS เพิ่ม BA ที่ระดับ 8 มก./ลิตร เมื่อการสับขยายต่อไปในครั้งที่ 5-6 จะเริ่มชะงักการเจริญเติบโต เมื่อปรับลด BA มาเป็น 2 มก./ลิตร จะทำให้ต้นสับประรดกลับมาเกิดการแตกหน่อใหม่อีกครั้ง และเมื่อสับขยายต่อไปได้แก่ 2 – 3 ครั้งจะเริ่มหยุดแตกหน่อต้องกระตุ้นโดย เปลี่ยนเป็นอาหารสูตร MS เติม BA ในระดับ 8 มก./ลิตร อีกครั้ง

2.1.2 ศึกษาการเพาะเลี้ยงในระบบอาหารเหลว พบว่า ใช้สูตรอาหาร MS ดัดแปลงเพิ่ม BA ที่ระดับ 5 กรัมต่อลิตรมีการแตกหน่อได้ดีที่สุด แต่เกิดการปนเปื้อนไม่สามารถเก็บข้อมูลได้

2.1.3 ศึกษาการเพาะเลี้ยง ในระบบอาหารเหลวแบบจุ่มชั่วคราว (temporary immersion Bioreactor (TIB)) พบว่า สูตรอาหาร MS ดัดแปลงเพิ่ม BA ที่ระดับ 7 มก.ต่อลิตร โดยต้นมีการแตกหน่อจำนวนมาก แต่หลังปลูก 1 สัปดาห์ต้นสับประรดมีอาหารบวมน้ำ (ต้นสับประรดจะมีขนาดใหญ่ สีอ่อนลง จะดูสีต้นใส ฉ่ำ) ได้ปรับลด BA เป็นสูตรอาหาร MS เพิ่ม BA ที่ระดับ 5 มก./ลิตร พบว่า ต้นสับประรดกลับมาแตกหน่อดี แต่หลังปลูกอีก 1 สัปดาห์เริ่มมีอาหารบวมน้ำ (เช่นเดียวกับที่ระดับ BA ที่ 7 มล./ลิตร) จึงได้ปรับลด BA เป็นสูตรอาหาร MS เพิ่ม BA ที่ระดับ 2 มก./ลิตร ต้นจะโตได้ปกติและพบว่าต้นสับประรดมีขนาดต้นใกล้เคียงกันทั้งหมด (ภาพที่ 3)

ภาพที่ 3 การขยายสับประรดพันธุ์ MD 2 ในระบบอาหารอาหารเหลวแบบจุ่มชั่วคราว (temporary immersion Bioreactor (TIB))




นอกจากเป็นการดำเนินงานเพียง 1 ปี จึงไม่สามารถได้ข้อมูลทั้งหมด แต่มีข้อสังเกตว่า


1. การเพิ่มปริมาณของต้นสับปะรดเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มฟอกหน่อ จะมีแตกต่างกันไปตามรุ่นที่สับขยายโดยต้นสับปะรดที่สับขยายในรุ่นที่ 1 จะมีขนาดต้นใหญ่ประมาณ 10-15 เซนติเมตร หน่อที่ได้จะเติบโตช้า (ใช้เวลา 30 วัน) มีจำนวนหน่อเพียง 1-2 หน่อ ในการสับขยายครั้งที่ 2 - 5 มีขนาดต้นเล็กลง ใช้เวลาสับขยายน้อยลง (ใช้เวลา 20-30 วัน) และมีการแตกหน่อเพิ่ม 3-4 หน่อ ในการสับขยายครั้งที่ 6 จะมีขนาดต้นเพียง 5-8 เซนติเมตร ใช้เวลาสับขยายน้อย (ใช้เวลา 20 วัน) การแตกหน่อจำนวนมาก (ตารางที่ 3 และภาพที่ 4) ทำให้ขั้นตอนการขยายแม่พันธุ์เป็นขั้นตอนที่ใช้เวลานานที่สุดอย่างน้อยตั้งสับขยายให้ได้รุ่นที่ 3 ขึ้นไป (5-6 เดือน) จึงจะพร้อมขั้นตอนการผลิตต้นเพื่อเพิ่มปริมาณในเชิงพาณิชย์

ตารางที่ 3 ขนาด จำนวนหน่อที่แตกใหม่ และระยะเวลาในการสับขยายในแต่ละรุ่น

สับขยายครั้งที่	1	2	3	4	5	6
ขนาดหน่อที่ได้ (ซม.)	10-15	10-12	10-12	8-10	8-10	5-8
จำนวนหน่อที่ได้	1-2	1-2	2-3	2-3	2-3	3-4
ระยะเวลา(วัน)	30	25-30	20-25	20-25	20-25	20

ภาพที่ 4 ขนาดต้น และจำนวนหน่อสับปะรดพันธุ์ MD2 ที่ได้ในการสับขยายครั้งที่ 2 3 และ 4 และ ครั้งที่ 6-10





2. พบว่าการสับขยายต้นสับปรดในระบบการเพาะเลี้ยง 3 ระบบ คือ 1. ระบบอาหารแข็ง 2. ระบบอาหารเหลว และ 3. ระบบอาหารเหลวแบบจมชั่วคราว (TIB) มีทั้งข้อดีและข้อเสียของแต่ละระบบ เนื่องจากงานวิจัยนี้มีเวลาสั้นเพียง 1 ปี ทำให้ไม่ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ทั้ง 3 ระบบ แต่มีแนวโน้มว่าระบบอาหารเหลวแบบจมชั่วคราว (TIB) จะช่วยลดเวลาการผลิต และต้นทุนการผลิตได้ในเชิงพาณิชย์ (ตารางที่ 4) เช่นเดียวกันในกล้วยไม้

ตารางที่ 4 ระบบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ อัตราขยาย และระยะเวลาที่จะสับขยายสับปรดพันธุ์ MD2

ระบบที่เพาะเลี้ยง	อัตราขยาย	ระยะเวลา	หมายเหตุ
1. ระบบอาหารแข็ง	4-10 หน่อ	20 วัน	-ขั้นตอนไม่ซับซ้อน -ขั้นตอนการออกรากต้องใช้อาหารเหลว
2. ระบบอาหารเหลว	10-20 หน่อ	20 วัน	-ขั้นตอนซับซ้อนขึ้น -ต้องใช้เครื่องเขย่าใช้ค่าไฟสูงขึ้น 20-30 %
3. ระบบอาหารเหลวแบบจมชั่วคราว (temporary immersion Bioreactor (TIB))	20-100 หน่อ	30 วัน	-ขั้นตอนซับซ้อนมาก -ต้องควบคุมความสะอาดมาก -อุปกรณ์แพงมาก

3. ต้นทุนการผลิตสับปรดพันธุ์ MD 2 (บาทต่อต้น (คำนวณที่ปริมาณผลิต 10,000 ต้น))

พบว่า ระบบอาหารแข็งเป็นระบบที่ใช้ต้นทุนสูง (11.57 บาท/ต้น) และใช้เวลานานที่สุด (180 วัน) รองลงมาคือ ระบบอาหารเหลว (ต้นทุน 9.3 บาท/ต้น และใช้เวลา 150 วัน) และระบบที่ต้นทุนต่อหน่วยน้อยที่สุดคือระบบ Bioreactor มีต้นทุน 3.53 บาท/ต้น และใช้เวลา 90 วัน แต่ระบบอาหารเหลวแบบจมชั่วคราว (TIB) แต่ยังคงพัฒนาให้ราคาถูกลง และประยุกต์ใช้อุปกรณ์ประกอบที่หาในประเทศได้ง่าย เพื่อที่จะสามารถใช้ในระบบอุตสาหกรรมในอนาคต

ตารางที่ 5 ต้นทุนการผลิตสับปรดพันธุ์ MD2 ในระบบอาหารแข็ง อาหารเหลว และ ระบบอาหารเหลวแบบจมชั่วคราว (TIB)

ต้นทุนแต่ละขั้นตอน	ระบบอาหาร			หมายเหตุ
	แข็ง	เหลว	Bioreactor	
ระยะเวลาการผลิตทั้งหมด(วัน)	150-180	120-150	60-90	
จำนวนอุปกรณ์ (ชุด)	1,000	1,000	20	
แรงงานในการขยายต้น (บาท)	7,800	7,800	4,200	ค่าแรงงานวันละ 300 บาท วันละ 8 ชม.
- การสับขยาย	3,675	3,675	75	ค่าแรงชม.ละ 37.5 บาท

- การเพาะเลี้ยง	3,675	3,675	3,675	
- ออกปลูก	450	450	450	
แรงงานทำความสะอาดห้องปฏิบัติการ และ เครื่องแก้ว (บาท)	900	900	600	ค่าแรงงาน วันละ 300 บาท วันละ 8 ชม. ค่าแรงชม.ละ 37.5 บาท
- ในช่วงการสับขยาย (2 วัน)	1,200	1,200	1,200	
- ออกขวดปลูก (1 วัน)	900	900	900	
แรงงานอนุบาล (บาท)	15,000	15,000	15,000	
- ปลูกอนุบาล (3-6 เดือน)	15,000	15,000	15,000	
ค่าอุปกรณ์ เครื่องแก้วและอื่น ๆ (บาท)	48,000	48,000	4,000	- อาหารเหลว ชุดละ 24 บาท ใช้ได้ 20 ครั้ง - Bioreactor ชุดละ 50,000 บาท ใช้ได้ 100 ครั้ง + อุปกรณ์ ครั้งละ 500 บาท ใช้ได้ 5 ครั้ง
- การสับขยาย	24,000	24,000	4,000	
- การเพาะเลี้ยง	24,000	24,000	-	
ต้นทุนอาหาร / 1000 ต้น	14,000	10,500	8,400	- อาหารสังเคราะห์ ลิตร ๆ ละ 630 บาท - อาหาร 1 ลิตร ได้ 200 ขวดๆ ละ 10 ต้น - Bioreactor ใช้ ครั้งละ 1 ลิตร
- การสับขยาย	7,000	3,500	1,400	
- การเพาะเลี้ยง	7,000	7,000	7,000	
ค่าไฟฟ้า (บาท)	30,000	10,800	3,600	
- การสับขยาย	15,000	7,200	5,000	ค่าไฟ เดือนละ 5,000 บาท วันละ 120 บาท (เพาะเลี้ยงเต็มที่ 50,000 ต้น)
- การเพาะเลี้ยง	15,000	15,000	-	
รวมค่าใช้จ่ายต่อ 10,000 ต้น	115,700	93,000	35,800	
ต้นทุนการผลิตต่อต้น (บาท)	11.57	9.3	3.58	

หมายเหตุ หากคำนวณจากปริมาณที่น้อยกว่า 10,000 ต้น ต้นทุนจะสูงขึ้นกว่านี้

2.2 การจัดการอนุบาลต้นพันธุ์สับประรดที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

2.2.1 ศึกษาวัสดุปลูกที่เหมาะสมในการออกปลูกต้นกล้าสับประรดพันธุ์ MD2

พบว่า การออกปลูกสับประรดพันธุ์ MD2 ทำได้ยากกว่าสับประรดพันธุ์ปัตตาเวีย โดยพบว่า

2.2.1.1 การออกปลูกในชุดฤดูหนาว (เดือนมกราคม 2558) พบว่า ต้นทั้งหมดตายทั้งหมด เกิดจากการต้นสับประรดพันธุ์ MD2 อ่อนแอต่อโรคน้ำเน่ามากมาก ได้นำประสบการณ์ในชุดนี้ได้ใช้ในการออกปลูกในชุดอื่น ๆ

2.2.1.2 การออกปลูกในชุดฤดูร้อน (เดือนเมษายน 2558) ได้เพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมโรคทั้งวัสดุปลูก โรงเรือนเพิ่มขึ้น พร้อมเพิ่มระบบฟ่นละอองน้ำในโรงเรือน พบว่า ต้นสับประรดชุดที่ 2 ต้นตายลดลงเหลือเพียงร้อยละ 4.2-16.7 โดยวัสดุปลูกตามกรรมวิธีมีผลต่อการรอดตาย โดยขุยมะพร้าว เป็นวัสดุที่มีการตาย

มากที่สุดร้อยละ 16.7 รองลงมา คือ เส้นใยมะพร้าว และทรายผสมพีทมอสอัตราส่วน 1:1 มีอัตราการตายร้อยละ 4.2 ส่วนกรรมวิธีอื่น ๆ ไม่มีการตาย (ตารางที่ 5)

ในข้อมูลการเจริญเติบโต

เส้นผ่านศูนย์กลางต้นเฉลี่ย (เซนติเมตร) พบว่า ทราย เป็นวัสดุปลูกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางต้นเฉลี่ยมากที่สุด 12.95 เซนติเมตร ใกล้เคียงกับทรายผสมขุยมะพร้าวอัตราส่วน 1:1 ความเส้นผ่านศูนย์กลางต้นเฉลี่ย 12.61 เซนติเมตร แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % กับพีทมอส เส้นใยมะพร้าว ทรายผสมพีทมอสอัตราส่วน 1:1 และขุยมะพร้าว ตามลำดับ โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางต้นเฉลี่ย 11.90 11.23 10.76 และ 10.00 เซนติเมตร ตามลำดับ (ตารางที่ 5)

จำนวนรากเฉลี่ย (ราก) พบว่า ทราย เป็นวัสดุปลูกที่มีจำนวนรากเฉลี่ยมากที่สุด คือ 15.08 เส้น แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % กับพีทมอส ทรายผสมขุยมะพร้าวอัตราส่วน 1:1 เส้นใยมะพร้าว ขุยมะพร้าว และทรายผสมพีทมอสอัตราส่วน 1:1 ตามลำดับ โดยมีจำนวนราก 12.71 11.83 11.31 10.90 และ 10.58 ราก ตามลำดับ (ตารางที่ 6)

ความยาวรากเฉลี่ย (เซนติเมตร) พบว่า พีทมอส เป็นวัสดุปลูกที่มีความยาวรากเฉลี่ยมากที่สุด คือ 4.65 เซนติเมตร แตกไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญกับกรรมวิธีอื่น ๆ คาดว่า เกิดจากรากสับปะรดได้เจริญจนเต็มสภาพเพาะชำแล้ว

เนื่องจากต้นสับปะรดที่ได้ในรุ่นนี้มีขนาดในช่วงเริ่มต้นแตกต่างกันทำให้มีผลต่อข้อมูลที่ได้หลังการทดลองมาก จึงได้นำข้อมูลก่อนการทดลองมาหาผลต่างจากก่อนทดลองและหลังทดลอง พบว่า เส้นใยมะพร้าว มีผลต่างเส้นผ่านศูนย์กลางต้นเฉลี่ยก่อนและหลังการทดลองมากที่สุด (ตารางที่ 6) วัสดุปลูก ทราย มีผลต่างจำนวนรากเฉลี่ยก่อนและหลังการทดลองมากที่สุด (ตารางที่ 7) และ วัสดุปลูก พีทมอส มีผลต่างความยาวรากเฉลี่ยก่อนและหลังการทดลองมากที่สุด (ตารางที่ 7) ดังนั้นจะเห็นได้ว่า วัสดุปลูก ทราย จึงเป็นกรรมวิธีที่ดีที่สุดในช่วงฤดูร้อน รองลงมาคือ ทรายผสมขุยมะพร้าวอัตราส่วน 1:1

ตารางที่ 6 เส้นผ่านศูนย์กลางต้นเฉลี่ย และร้อยละต้นที่ตายของสับปะรดพันธุ์ MD2 เมื่อก่อปลูกและหลังปลูก 4 สัปดาห์ในวัสดุปลูกต่าง ๆ กัน 6 ชนิด ในช่วงฤดูร้อน

กรรมวิธี	เส้นผ่านศูนย์กลางต้นเฉลี่ย			ร้อยละต้นตาย
	0 สัปดาห์	4 สัปดาห์	ผลต่าง	
1 ทราย	10.05	12.95 a	2.92	-
2 ขุยมะพร้าว	8.81	11.23 b	1.65	16.7
3 เส้นใยมะพร้าว	9.65	12.61 a	3.05	4.2
4 พีทมอส	9.57	11.90 ab	2.30	-
5 ทรายผสมพีทมอสอัตราส่วน 1:1	8.25	10.00 c	1.92	4.2
6 ทรายผสมขุยมะพร้าวอัตราส่วน 1:1	8.02	10.76 bc	2.75	-
CV	10.46	6.59		
F-test	ns	*		

ตารางที่ 7 จำนวนรากเฉลี่ย และความยาวรากเฉลี่ยของสับปะรดพันธุ์ MD2 เมื่อออกปลูกและหลังปลูก 4 สัปดาห์ ในวัสดุปลูก ต่าง ๆ กัน 6 ชนิด ในช่วงฤดูร้อน

กรรมวิธี	จำนวนรากเฉลี่ย			ความยาวรากเฉลี่ย		
	0 สัปดาห์	4 สัปดาห์	ผลต่าง	0 สัปดาห์	4 สัปดาห์	ผลต่าง
1 ทราย	11.71	15.08 a	3.37	1.87	4.33	2.47
2 ขุยมะพร้าว	11.83	10.90 b	-1.27	2.20	3.43	1.23
3 เส้นใยมะพร้าว	10.79	11.31 b	0.31	2.13	4.61	2.47
4 พีทมอส	12.50	12.71 ab	0.13	2.12	4.65	2.54
5 ทรายผสมพีทมอสอัตราส่วน 1:1	10.79	10.58 b	-0.10	1.62	4.17	2.55
6 ทรายผสมขุยมะพร้าวอัตราส่วน 1:1	11.17	11.83 b	0.67	1.94	3.91	1.98
CV	18.45	16.96		20.89	17.67	
F-test	ns	*		ns	ns	

2.2.1.3 การทอดออกปลูกในชุดฤดูฝน (มิถุนายน 2558) พบว่า ไม่มีต้นสับปะรดตายในทุกกรรมวิธี ในข้อมูลการเจริญเติบโต

ความเส้นผ่านศูนย์กลางต้นเฉลี่ย (เซนติเมตร) พบว่า ทราย เป็นวัสดุปลูกที่มีเส้นต้นเฉลี่ยมากที่สุด 13.75 เซนติเมตร แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระดับความเชื่อมั่น 99 % กับ เส้นใยมะพร้าว พีทมอส ขุยมะพร้าว ทรายผสมพีทมอสอัตราส่วน 1:1 และทรายผสมขุยมะพร้าวอัตราส่วน 1:1 และ ตามลำดับ โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางต้น 13.10 12.50 11.52 11.30 และ 10.52 เซนติเมตร ตามลำดับ (ตารางที่ 8)

จำนวนรากเฉลี่ย (ราก) พบว่า ทราย เป็นวัสดุปลูกที่มีจำนวนรากเฉลี่ยมากที่สุด คือ 14.87 เส้น แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระดับความเชื่อมั่น 99 % กับเส้น พีทมอส ใยมะพร้าว ทรายผสมขุยมะพร้าวอัตราส่วน 1:1 ขุยมะพร้าว และทรายผสมพีทมอสอัตราส่วน 1:1 ตามลำดับ โดยมีจำนวนราก 12.94 11.56 11.31 11.06 และ 9.81 ราก ตามลำดับ (ตารางที่ 9)

ความยาวรากเฉลี่ย (เซนติเมตร) พบว่า เส้นใยมะพร้าว เป็นวัสดุปลูกที่มีความยาวรากเฉลี่ยมากที่สุด คือ 4.65 เซนติเมตร มีแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญกับพีทมอส ทราย ทรายผสมพีทมอสอัตราส่วน 1:1 และขุยมะพร้าว ทรายผสมขุยมะพร้าวอัตราส่วน 1:1 มีความยาวรากเฉลี่ย 5.15 4.78 4.72 4.32 และ 3.67 เซนติเมตร ตามลำดับ (ตารางที่ 9)

เนื่องจากต้นสับปะรดที่ได้ในรุ่นนี้มีขนาดใกล้เคียงกัน จึงได้นำข้อมูลก่อนการทดลองมาหาผลต่างจากก่อนทดลองและหลังทดลอง พบว่า ทราย มีผลต่างเส้นผ่านศูนย์กลางต้นเฉลี่ย จำนวนรากเฉลี่ยก่อนและหลังการทดลองมากที่สุด (ตารางที่ 8 และ 9) และพีทมอส มีผลต่างความยาวรากเฉลี่ยก่อนและหลังการทดลองมากที่สุด (ตารางที่ 6) ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ทราย จึงเป็นกรรมวิธีที่ดีที่สุดในช่วงฤดูฝน รองลงมา คือ พีทมอส แต่ต้องระวังการรดน้ำให้พอเหมาะสมด้วย

ตารางที่ 8 เส้นผ่านศูนย์กลางต้นเฉลี่ย และร้อยละต้นที่ตายของสับปรดพันธุ์ MD2 เมื่อออกปลูกและหลังปลูก 4 สัปดาห์ในวัสดุปลูกต่าง ๆ กัน 6 ชนิด ในช่วงฤดูฝน

กรรมวิธี	เส้นผ่านศูนย์กลางต้นเฉลี่ย			% ต้นตาย
	0 สัปดาห์	4 สัปดาห์	ผลต่าง	
1 ทราย	9.32	13.75 a	4.41	0
2 ขุยมะพร้าว	9.02	11.52 b	2.49	0
3 เส้นใยมะพร้าว	9.46	13.10 ab	3.60	0
4 พีทมอส	9.60	12.50 ab	2.90	0
5 ทรายผสมพีทมอสอัตราส่วน 1:1	8.22	11.30 bc	2.29	0
6 ทรายผสมขุยมะพร้าวอัตราส่วน 1:1	8.23	10.52 c	3.04	0
CV	7.48	6.93		
F-test	ns	**		

ตารางที่ 8 จำนวนรากเฉลี่ย และความยาวรากเฉลี่ยของสับปรดพันธุ์ MD2 เมื่อออกปลูกและหลังปลูก 4 สัปดาห์ในวัสดุปลูกต่าง ๆ กัน 6 ชนิด ในช่วงฤดูฝน

กรรมวิธี	จำนวนรากเฉลี่ย			ความยาวรากเฉลี่ย		
	0 สัปดาห์	4 สัปดาห์	ผลต่าง	0 สัปดาห์	4 สัปดาห์	ผลต่าง
1 ทราย	10.52	14.87 a	4.36	2.16	4.78 ab	2.63
2 ขุยมะพร้าว	11.17	11.06 ab	-0.10	1.95	3.67 b	1.72
3 เส้นใยมะพร้าว	10.88	11.56 ab	0.69	2.22	5.20 a	2.94
4 พีทมอส	11.97	12.94 ab	0.97	1.91	5.15 ab	3.24
5 ทรายผสมพีทมอสอัตราส่วน 1:1	11.80	9.81 b	-1.99	1.67	4.72 ab	3.05
6 ทรายผสมขุยมะพร้าวอัตราส่วน 1:1	11.42	11.31 ab	-0.10	1.71	4.32 ab	2.61
CV	12.23	14.26		16.52	17.53	
F-test	ns	**		ns	*	

2.2.2 ศึกษาผลของธาตุอาหารที่มีต่อการเจริญเติบโตและความแข็งแรงของต้นกล้าสับปรดพันธุ์ MD2 ในโรงเรือนอนุบาล

ความเส้นผ่านศูนย์กลางต้นเฉลี่ย (เซนติเมตร) พบว่า อัตราส่วนของธาตุอาหาร N P K กับความเข้มข้นของธาตุอาหาร ในแต่ละกรรมวิธีมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95 % หลังจากสัปดาห์ที่ 9 โดยการให้ปุ๋ยอัตราส่วนของธาตุอาหาร N P K ที่ 3:1:5 ที่ระดับความเข้มข้น 200 ppm มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางต้นเฉลี่ยมากที่สุด คือ 25.67 เซนติเมตร ใกล้เคียงกับการให้ปุ๋ยอัตราส่วนของธาตุอาหาร N P K ที่ 4:2:5 ที่ระดับความเข้มข้น 200 ppm. การให้ปุ๋ยอัตราส่วนของธาตุอาหาร N P K ที่ 1:1:1 ที่ระดับความเข้มข้น 200 ppm และ การให้ปุ๋ยอัตราส่วนของธาตุอาหาร N P K ที่ 3:1:5 ที่ระดับความเข้มข้น 100 ppm. มีเส้นผ่าน

ศูนย์กลางต้นเฉลี่ย 24.71 23.93 และ 23.91 เซนติเมตร ตามลำดับ โดยแตกต่างกับกรรมวิธีเปรียบเทียบ(น้ำเปล่า) และ การให้ปุ๋ยอัตราส่วนของธาตุอาหาร N P K ที่ 4:2:5 ที่ระดับความเข้มข้น 100 ppm. มีเส้นผ่านศูนย์กลางต้นเฉลี่ย 23.12 และ 22.76 เซนติเมตร ตามลำดับ (ตารางที่ 9)

ตารางที่ 9 ผลของการให้ปุ๋ยอัตราส่วนของธาตุอาหาร N P K ที่อัตรา และ ระดับต่าง ๆ ในสัปดาห์ที่ 1-12 ที่มีต่อ เส้นผ่านศูนย์กลางต้นเฉลี่ยของสับปะรดพันธุ์ MD2 ในโรงเรียนอนุบาล

กรรมวิธี	เดือนที่											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4:2:5 - 100 ppm	12.5	14.13	15.58	17.15	18.23	18.99	17.15	20.64	20.23 ab	20.73 b	20.73 b	22.76 b
4:2:5 - 200 ppm	12.60	14.11	16.52	17.94	19.21	20.04	17.94	21.65	21.21 ab	23.21 ab	23.21 ab	24.71 ab
3:1:5 - 100 ppm	12.99	14.10	15.70	17.23	18.42	19.24	17.23	20.69	20.42 ab	22.42 ab	22.41 ab	23.91 ab
3:1:5 - 200 ppm	13.74	14.70	16.42	18.08	19.56	20.10	18.08	21.74	21.81 a	24.26 a	24.26 a	25.67 a
1:1:1 - 200 ppm	13.55	14.60	15.72	17.15	18.43	19.12	17.15	20.96	20.43 ab	22.43 ab	22.41 ab	23.93 ab
Control (น้ำเปล่า)	13.58	15.27	16.76	18.73	19.65	20.36	18.73	22.08	19.65 b	21.65 ab	21.85 ab	23.12 b
F-test	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	*	*	*	*
CV	6.03	5.44	5.18	7.16	7.05	6.88	7.16	6.13	6.22	5.67	4.58	4.09

และในสัปดาห์ที่ 12 ได้นับจำนวนรากและวัดความยาวราก พบว่า

จำนวนรากเฉลี่ย (ราก) พบว่า อัตราส่วนของธาตุอาหาร N P K มีผลต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยการไม่ให้ปุ๋ยมีจำนวนรากมากที่สุด 11.25 ราก ใกล้เคียงกับการให้ปุ๋ยอัตราส่วนของธาตุอาหาร N P K ที่ 3:1:5 ที่ระดับความเข้มข้น 200 ppm. การให้ปุ๋ยอัตราส่วนของธาตุอาหาร N P K ที่ 3:1:5 ที่ระดับความเข้มข้น 100 ppm. การให้ปุ๋ยอัตราส่วนของธาตุอาหาร N P K ที่ 1:1:1 ที่ระดับความเข้มข้น 200 ppm และการให้ปุ๋ยอัตราส่วนของธาตุอาหาร N P K ที่ 4:2:5 ที่ระดับความเข้มข้น 200 ppm ตามลำดับ มีจำนวนรากเฉลี่ย 10.14 10.05 9.29 และ 9.18 ราก แตกต่างกับการให้ปุ๋ยอัตราส่วนของธาตุอาหาร N P K ที่ 4:2:5 ที่ระดับความเข้มข้น 100 ppm มีจำนวนรากเฉลี่ย 8.64 ราก ตามลำดับ (ตารางที่ 10) ซึ่งสอดคล้องกับขนาดผ่านศูนย์กลางต้น (ตารางที่ 9)

ความยาวรากเฉลี่ย (เซนติเมตร) พบว่า อัตราส่วนของธาตุอาหาร N P K ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ โดยการไม่ให้ปุ๋ยมีความยาวรากมากที่สุด 14.96 เซนติเมตร ไม่แตกต่างกับกรรมวิธีอื่น (ตารางที่ 10)

ตารางที่ 10 ผลของการให้ปุ๋ยอัตราส่วนของธาตุอาหาร N P K ที่อัตรา และ ระดับต่าง ๆ ในสัปดาห์ที่ 12 ที่มีต่อ จำนวนรากเฉลี่ย และความยาวรากเฉลี่ยของสับปะรดพันธุ์ MD2 ในโรงเรียนอนุบาล

กรรมวิธี	จำนวนรากเฉลี่ย (เส้น)	ความยาวรากเฉลี่ย (ซม.)
T1 - 4:2:5 100 ppm	8.64 b	11.69
T2 - 4:2:5 200 ppm	9.18 ab	11.89
T3- 3:1:5 100 ppm	10.05 ab	11.97

T4- 3:1:5 200 ppm	10.14 ab	14.93
T5- 1:1:1 200 ppm	9.29 ab	13.44
T6- Control (น้ำเปล่า)	11.25 a	14.96
F-test	*	ns
CV	13.15	11.31

ผลจากการทดลอง พบว่า การให้ปุ๋ยที่มีอัตราส่วนไนโตรเจนสูงกับสับปะรดที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม่สามารถช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตของต้นสับปะรดพันธุ์ MD2 ได้ และยังพบว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ 1-5 การให้ปุ๋ยที่มีอัตราส่วนของธาตุอาหาร N P K และระดับความเข้มข้นต่าง ๆ ไม่มีความต่างกันทางสถิติ แต่ในสัปดาห์ที่ 9-12 สัปดาห์ พบว่า อัตราส่วนของธาตุอาหาร N P K และระดับความเข้มข้น เริ่มมีผลต่อการเพิ่มของเส้นผ่านศูนย์กลางต้นเฉลี่ยอย่างแตกต่างกันทางสถิติ โดยการให้ปุ๋ยอัตราส่วนของธาตุอาหาร N P K ที่ 3:1:5 ที่ระดับความเข้มข้น 200 ppm. มีการเจริญเติบโตที่เร็วที่สุด แต่ใกล้เคียงกับการให้ปุ๋ยอัตราส่วนของธาตุอาหาร N P K ที่ 1:1:1 ที่ระดับความเข้มข้น 200 ppm. แต่ช่วงสัปดาห์ที่ 11 -12 มีการเจริญเติบโตที่ คาดว่าปริมาณธาตุอาหารที่ได้รับในการทดลอง(ความเข้มข้น)ไม่เพียงพอแล้ว ซึ่งแตกต่างจากผลการทดลองของนันทรัตน์ (2551) ที่ใช้กล้วยไม้สกุลออนซีเดียมในระยะให้ผลผลิตแล้วที่พบว่า การพ่นปุ๋ยทางใบสัดส่วน 4:2:5 และ 3:1:5 ระดับความเข้มข้น 3,000 ppm. จะทำให้กล้วยไม้สกุล ออนซีเดียมมีการเจริญเติบโตและออกดอกดีกว่าการพ่นปุ๋ยสัดส่วน 1:1:1 หรือปุ๋ยสูตร 20-20-20 และการพ่นปุ๋ยทางใบสัดส่วน 4:2:5 ที่ระดับความเข้มข้น 3,000 ppm. หรืออย่างน้อย 1,500 ppm. ทำให้กล้วยไม้เจริญเติบโตและให้ผลผลิตรวมทั้งคุณภาพของดอกดี แต่ผลการทดลองกลับสอดคล้องกับ Duane (2002) ที่รายงานว่า ในสับปะรดที่ปลูกช่วง 5 เดือนแรกต้องการธาตุอาหารน้อย โดยจะต้องการธาตุอาหารโพแทสเซียมและเหล็กค่อนข้างสูง แต่ต้องการธาตุอาหารฟอสฟอรัสและแคลเซียมค่อนข้างต่ำ ในช่วง 2-4 เดือนก่อนที่จะออกดอกจะมีความต้องการธาตุอาหารเพิ่มมากที่สุด โดยเฉพาะธาตุอาหารฟอสฟอรัส และแคลเซียมจึงควรมีการพ่นทางใบ หรือให้ผ่านระบบน้ำหยด จากการวางแผนการทดลองที่เลือกใช้ระดับธาตุอาหารที่สูงสุด 200 ppm. เนื่องจากพืชในกลุ่มสับปะรดมักจะมีอาการใบไหม้เมื่อใช้ปุ๋ยที่ความเข้มข้นสูงโดยมักจะพบมากในกลุ่มสับปะรดสี (Bromeliads) Conover (1993) ได้ศึกษาผลของปุ๋ยไนโตรเจน 4 ระดับและปุ๋ยโปรเตสเซียม 2 ระดับที่มีผลต่อคุณภาพของสับปะรดสี *Aechmea 'Friederike'*. ในระหว่างการขนส่ง โดยให้ปุ๋ยไนโตรเจนที่ระดับ 200 300 400 หรือ 500 มิลลิกรัม ต่อน้ำ 150 มิลลิกรัมและปุ๋ยโปรเตสเซียมระดับ 14 และ 56 มิลลิกรัม ต่อ 150 มล. พ่นปุ๋ยสัปดาห์ละครั้ง พบว่า ปุ๋ยไนโตรเจนที่ระดับต่ำ 200 มิลลิกรัม ต่อน้ำ 150 มิลลิกรัม มีการเจริญเติบโต และคุณภาพต้นดีที่สุด และมีผลการศึกษาดูการปฏิกริยาของการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนกับพบว่า ปุ๋ยไนโตรเจนที่ระดับต่ำ 200 มิลลิกรัม ร่วมกับโปรเตสเซียมระดับ 14 ต่อน้ำ 150 มิลลิกรัม มีการเจริญเติบโตและคุณภาพดีที่สุด สอดคล้องกับผลการทดลองนี้ที่ว่า ปุ๋ยไนโตรเจนที่ระดับสูง ๆ ให้ผลการเจริญเติบโตน้อยกว่าปุ๋ยไนโตรเจนที่ระดับต่ำ แต่ถ้ามีปุ๋ยโปรเตสเซียมจะทำให้สามารถใช้เป็นไนโตรเจนได้เพิ่มขึ้น แต่เป็นระดับที่ไม่สูงเกินไป

เมื่อสุ่มต้นในแต่ละระยะ คือ เริ่มออกปลูก หลังออกปลูก 60 วัน และหลังปลูก 120 วัน พบว่า ขนาดของต้นสับปะรดพันธุ์ MD2 ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ จะมีขนาดเพิ่มขึ้น จาก 1.1 กรัม เป็น 3.9 กรัม และ 22.1 กรัม ตามลำดับ หรือเพิ่มจาก 1 เท่า เป็น 3.6 เท่า และ 20 เท่าตามลำดับ (ตารางที่ 11)

ตารางที่ 11 การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักหลังออกปลูกเริ่มออกปลูก หลังออกปลูก 60 วัน และหลังปลูก 120 วัน

การเปลี่ยนแปลงน้ำหนัก หลังออกปลูก	ต้นเมื่อออกขวด (0 วัน)	ออกปลูกได้ถาด (60 วัน)	ปลูกในแปลงอนุบาล (120 วัน)
น้ำหนัก (กรัม)	1.107	3.955	22.097
น้ำหนักที่เพิ่มขึ้น (เท่า)	1	3.57	19.96

* สุ่มชั่งน้ำหนักแต่ละระยะๆ ละ 40 ต้น

สรุปผลการทดลอง และข้อเสนอแนะ

1. การขยายปริมาณสับปะรดพันธุ์คัดเลือก พบว่า สามารถขยายพันธุ์สับปะรดพันธุ์คัดเลือกได้เพียง 5 พันธุ์ คือ สวี 6 สวี 18 ทรายทอง 20 ภูเก็ต 3 และภูเก็ต 20 โดยพันธุ์ที่ยังไม่สามารถขยายได้ คือ ทรายทอง 4 ได้ขยายพันธุ์สำรองไว้อีก 3 เบอร์ คือ สวี 2 ทรายทอง 3 และทรายทอง 8

2. ศึกษาเทคนิคในการขยายสับปะรดพันธุ์ MD2

2.1 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสับปะรดพันธุ์ MD2 พบว่า

- อาหารสูตร MS เพิ่ม BA ระดับ 8 มิลลิกรัมต่อลิตร เหมาะสมกับระบบอาหารแข็ง
- อาหารสูตร MS เพิ่ม BA ระดับ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร เหมาะสมกับระบบอาหารเหลว
- อาหารสูตร MS เพิ่ม BA ระดับ 7 มิลลิกรัมต่อลิตร เหมาะสมกับระบบอาหารเหลวแบบจมชั่วคราว (TIB).

2.2 การนำต้นเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อออกปลูกในฤดูร้อน และฤดูฝน ควรปลูกในวัสดุปลูก คือ ทราย และวัสดุปลูกที่เหมาะสมรองลงมา คือ ในฤดูร้อน ใช้ทรายผสมขุยมะพร้าวอัตราส่วน 1:1 และ ฤดูฝน ใช้พีทมอส

2.3 การให้ปุ๋ยอัตราส่วนของธาตุอาหาร N P K ที่ 3:1:5 ที่ระดับความเข้มข้น 200 ppm จะทำให้ต้นกล้าสับปะรดเติบโตได้ดีที่สุดในเวลา 12 สัปดาห์

ข้อเสนอแนะ เนื่องจากการทดลองมีเวลาน้อย ควรมีการศึกษาเพิ่มอีกในภายหลัง

การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

จากการทดลองนี้ได้ศึกษาเพียงขั้นตอนเบื้องต้นในการขยายพันธุ์สับปะรดได้ระดับหนึ่ง สามารถนำผลการศึกษาไปพัฒนาขั้นตอนการผลิต และความคุ้มค่าเพื่อนำไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ในอนาคต

เอกสารอ้างอิง

นันทรัตน์ ศุภกานิต นายไฉ อินตะแก้ว , 2551. การจัดการปุ๋ยสำหรับกล้วยไม้สกุลออนซีเดียม

<http://www.doa.go.th/hrc/chiangrai/index.php/news/44--2553/96-2011-05-23-07-01-49>

เสลา ,2554. เรื่องของสับประรด เกษตรแผ่นดินทอง 16/09/2554 หน้า 5.

<http://www.arunsawat.com/board/index.php?topic=4583.20;wap2>

C.A. Conover, Ph.D., R.T. Poole, Ph.D. and K. Steinkamp. 1993. Effects of Production Fertilization on Damage During Simulated Shipping of *Aechmea* 'Friederike'. University of Florida/IFAS. Central Florida Research and Education Center . CFREC-Apopka Research Report RH-94-5.

Duane P. Bartholomew, Kenneth G. Rohrbach, and Dale O. Evans , 2002. Pineapple Cultivation in Hawaii. Fruits and Nuts. Oct. 2002. F&N-7 CTAHR — Oct. 2002 หน้า 7.

E. Kiss, J. Kiss, G. Gyulai, and L.E. Heszky. 1995. A Novel Method for Rapid Micropropagation of Pineapple. HORTSCIENCE 30(1):127–129. 1995.

K.E. Danso, K.O. Ayeh, V. Oduro, S. Amiteye and H.M. Amoatey. 2008. Effect of 6-Benzylaminopurine and -Naphthalene Acetic Acid on *in vitro* Production of MD2 Pineapple Planting Materials. World Applied Sciences Journal 3 (4): 614-619, 2008

Acta Horticulturae 425. II International Pineapple Symposium. 1 December 1997.

unknown. 2556 The history of MD2 pineapple. Chestnut Hill Farms

http://www.chfusa.com/pineapples_home.htm