

รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองที่สื้นสุด

1. ชุดโครงการวิจัย : วิจัยและพัฒนาพืชไร่น้ำมน้ำอื่นๆ (ฯ ทานตะวัน สบู่ดำ)
2. โครงการวิจัย กิจกรรม : วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการเพิ่มมูลค่าผลผลิตฯ
- กิจกรรมย่อย : การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการผลิตงานในพื้นที่ที่มีศักยภาพ
3. ข้อการทดลอง (ภาษาไทย) : การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตงานในสภาพนาอินทรีย์
3. ข้อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) : Testing of Green Manure Utilization Technology for Sesame Grown in Organic Paddy Field

4. คณะผู้ดำเนินงาน

- หัวหน้าการทดลอง : บุญเหลือ ศรีมุงคุณ^{1/}
- ผู้ร่วมงาน : มัตติกา ทองรส^{2/} อรอนงค์ วรรณวงศ์^{1/}
- ลักษณา ร่มเย็น^{1/} สมพงษ์ ชุมภูนภูรัตน์^{1/}

5. บทคัดย่อ : ดำเนินการในสภาพนาอินทรีย์จังหวัดอุบลราชธานี ไม่มีแผนการทดลอง 4 กรรมวิธี คือ 1. ปลูกถั่วฟูมอัตรา 10 กก./ไร่ 2. ปลูกถั่วพร้าอัตรา 15 กก./ไร่ 3. ปลูกปอเทืองอัตรา 5 กก./ไร่ 4. ไม่ใช่ปุ๋ยพืชสดก่อนปลูกงาน ทำการไถกลบปุ๋ยพืชสดหลังปลูก 45 วัน ไถกลบทั้งไว้ 15 วันก่อนปลูกงาน ปี 2556 พบร่วมก่อนปลูกดินมีค่าความเป็นกรด-ด่างอยู่ระหว่าง 5.12-5.38 อินทรีย์วัตถุ 0.41-0.88% พอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ได้ในดิน 2.16-6.72 มก./กก. โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ในดิน 12.50 - 29.50 มก./กก. หลังเก็บเกี่ยวในกรรมวิธีที่ปลูกถั่วฟูมเป็นปุ๋ยพืชสดมีค่าความเป็นกรด-ด่างลดลง อินทรีย์วัตถุลดลงทุกกรรมวิธี พอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ได้ในดิน โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ในดิน และธาตุอาหารรองมีค่าเพิ่มขึ้นทุกกรรมวิธี สำหรับผลผลิตฯ การปลูกปอเทืองเป็นปุ๋ยพืชสดให้ผลผลิตสูงสุด 73.45 กก./ไร่ และการไม่ใช่ปุ๋ยพืชสดงานให้ผลผลิตต่ำที่สุด 43.40 กก./ไร่ ในขณะที่การใช้ถั่วฟูมและถั่วพร้าเป็นปุ๋ยพืชสดงานให้ผลผลิตใกล้เคียงกัน คือ 55.22 และ 50.87 กก./ไร่ ตามลำดับ ทางด้านการเจริญเติบโตวัดจากความสูงเมื่อเก็บเกี่ยว พบร่วมกัน การใช่ปอเทืองมีความสูงมากที่สุด 116.4 เซนติเมตร และการไม่ใช่ปุ๋ยพืชสดงานมีความสูงน้อยที่สุด 96.6 เซนติเมตร ปี 2557 ทำการทดสอบ 2 สถานที่ คือ นาอินทรีย์ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดสุรินทร์ ที่จังหวัดอุบลราชธานี พบร่วมกัน การใช้ถั่วพร้าเป็นปุ๋ยพืชสด งานให้ผลผลิตสูงสุด 69.20 กก./ไร่ รองลงมา ได้แก่ การใช่ปอเทืองเป็นปุ๋ยพืชสด ให้ผลผลิต 58.04 กก./ไร่ ในขณะที่การใช้ถั่วฟูมเป็นปุ๋ยพืชสด ให้ผลผลิตใกล้เคียงกับการไม่ใช่ปุ๋ยพืชสด คือ 49.90 และ 43.32 กก./ไร่ ตามลำดับ ทางด้านองค์ประกอบผลผลิต ทุกกรรมวิธีให้ค่าใกล้เคียงกัน สำหรับการเจริญเติบโตวัดจากความสูงเมื่อเก็บเกี่ยว พบร่วมกัน การใช่ปุ๋ยพืชสด งานมีแนวโน้มที่จะมีความสูงมากกว่าการไม่ใช่ปุ๋ยพืชสด คือ การใช่ปุ๋ยพืชสดมีความสูงอยู่ระหว่าง 106.9-117.9 เซนติเมตร ในขณะที่การไม่ใช่ปุ๋ยพืชสดมีความสูง 97.55 เซนติเมตร ทางด้านคุณสมบัติทางเคมีของดิน การใช่ปุ๋ยพืชสดหลังเก็บเกี่ยว มีอินทรีย์วัตถุเพิ่มขึ้นมากกว่าการไม่ใช่ปุ๋ยพืชสด ที่จังหวัดสุรินทร์ ก่อนปลูกงาน ดินมีค่าความ

เป็นกรด-ด่าง 4.74 อินทรีย์วัตถุ 1.01% พอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ได้ในดิน 2.95 มก./กг. และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ในดิน 13 มก./กг. สำหรับผลผลิตทางไกลเคลียงกันทุกกรรมวิธี คือ อยู่ระหว่าง 85.33-113.58 กก./ไร่ ในกรรมวิธีที่ไม่ปลูกปุ๋ยพืชสมีจำนวนต้นเก็บเกี่ยวน้อยที่สุด ทำให้มีความสูงเมื่อเก็บเกี่ยวสูงที่สุด คือ 90.70 เซนติเมตร

^{1/} ศูนย์วิจัยพืชไร่ อุบลราชธานี ตู้ ปณ. 69 อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

^{2/} ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดสุรินทร์ ต.คอดโคน อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

6. คำนำ : การปลูกข้าวอินทรีย์มีพื้นที่เพิ่มขึ้นทุกปี เนื่องจากมีการขยายตัวของตลาดเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น ซึ่งหลังจากถูกการดำเนินทรีย์เกษตรจะมีการปรับปรุงบำรุงดิน ซึ่งมีทั้งการปลูกปุ๋ยพืชสด และการใส่ปุ๋ยอินทรีย์อีกครั้ง ถ้าหากในสภาพพื้นที่นาอินทรีย์ที่สามารถให้น้ำเสริมได้ตลอดฤดูปลูก การปลูกจะเพื่อเสริมรายได้ร่วมกับการบำรุงดินเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง จากการศึกษาของอรอนงค์ และคณะ (2551) รายงานว่า การปรับปรุงดินเพื่อปลูกข้าวอินทรีย์ในสภาพไร่ใช้ได้ทั้งถั่วพุ่ม ถั่วพร้า ซึ่งงาให้ผลผลิตเฉลี่ย 113 และ 114 กก./ไร่ ตามลำดับ และให้ผลกำไรสูทธิสูงกว่าการใช้ปุ๋ยหมักอินทรีย์ นอกจากนี้คุณสมบัติของดินได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น ทั้งความเป็นกรด-ด่างของดิน และอินทรีย์วัตถุในดินเพิ่มขึ้น และในสภาพนาอินทรีย์ จากการศึกษา 3 ปี พบว่า ทำให้คุณสมบัติทางเคมีของดินจากการใช้ปุ๋ยพืชสด หรือปุ๋ยอินทรีย์ปรับปรุงดิน มีค่าอินทรีย์วัตถุเพิ่มขึ้นมากกว่าการไม่ใส่ปุ๋ย (บุญเหลือ และคณะ, 2551) สำหรับพืชที่นิยมนิยมนำมาใช้เป็นปุ๋ยพืชสด ส่วนใหญ่เป็นพืชตระกูลถั่ว เพราะเป็นพืชที่สามารถตรึงก๊าซไนโตรเจนจากอากาศ ให้มาอยู่ในรูปขององค์ประกอบของไนโตรเจนที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชได้ รวมทั้งเป็นพืชที่มีการถ่ายตัวได้เร็วเมื่อไถกลบลงดิน (ศูนย์วิจัยพืชไร่ อุบลราชธานี, 2541) และจากการศึกษาของบุญเหลือ และคณะ (2555) พบว่า การใช้ถั่วพร้าเป็นปุ๋ยพืชสดให้ค่าอินทรีย์วัตถุเพิ่มขึ้น สำหรับถั่วพุ่มและปอเทืองมีการเปลี่ยนแปลงน้อย แต่ถั่วพุ่มและปอเทืองให้น้ำหนักสูงต่อไร่มากกว่าถั่วพร้า ดังนั้น จึงได้นำเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยพืชสดที่เหมาะสม นำไปทดสอบในสภาพนาอินทรีย์ของเกษตรกรที่สามารถให้น้ำเสริมได้ตลอดฤดูปลูก

7. วิธีดำเนินการ :

- อุปกรณ์

- เมล็ดพันธุ์งาดำพันธุ์อุบลราชธานี 3
- วัสดุสำหรับทำปุ๋ยหมัก ได้แก่ มนต์สัตว์ แกลบดิบ รำลสเอียด กาภน้ำตาล เชื้อจุลินทรีย์
- เมล็ดพันธุ์ปุ๋ยพืชสด
- วัสดุในการทำน้ำหมักสมุนไพร ได้แก่ ข้าว ใบสะเดา ใบบูชา คลิปตั๊ส และบอระเพ็ด
- วัสดุอุปกรณ์ในการวิเคราะห์ดิน และปุ๋ยอินทรีย์
- วัสดุอุปกรณ์ในการให้น้ำ

- วิธีการ

ไม่มีแผนการทดลอง ทำการทดสอบในพื้นที่ 1 ไร่ 4 กรรมวิธีฯ ละ 400 ตารางเมตร ได้แก่ 1. ถั่วพุ่ม อัตรา 10 กก./ไร่ ไถกลบก่อนปลูก 15 วัน 2. ถั่วพร้า อัตรา 15 กก./ไร่ ไถกลบก่อนปลูก 15 วัน 3. ปอเทือง อัตรา 5 กก./ไร่ ไถกลบก่อนปลูก 15 วัน 4. ไม่ใช้ปุ๋ยพืชสดก่อนปลูก

วิธีปฏิบัติการทดลอง ดังนี้

1. เตรียมปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ (ใบกาฉิ)

วัสดุที่ใช้

มูลสัตว์	1	ส่วน
แกลบดิบ	1	ส่วน
รำลาเอียด	1	ส่วน
จุลินทรีย์ EM	10-20	مل. (1-2 ช้อนโต๊ะ)
กากรน้ำตาล	10-20	مل. (1-2 ช้อนโต๊ะ)
น้ำสะอาด	10	ลิตร

วิธีทำ

นำรำลาเอียดผสมกับมูลสัตว์ให้เข้ากัน ผสมจุลินทรีย์ EM กับกากรน้ำตาลและน้ำ 10 ลิตร ที่เตรียมไว้ นำแกลบดิบจุ่มน้ำที่ผสมจุลินทรีย์แล้วสลัดพอหมวดๆ นำมาคลุกเคล้ากับรำและมูลสัตว์ นำไปใส่กระสอบป่านแล้วเก็บไว้ 5 วัน อย่าให้ถูกความร้อนและความชื้น หลังจากนั้นสามารถนำไปใช้ได้เลย

2. วิธีการเตรียมน้ำหมักสมุนไพร ขึ้นไปเล่เมลง

วัสดุที่ใช้

ใบสะเดา (หั่นไปและก้าน)	20	กก.
ใบยูคาลิปตัส	2	กก.
ข่าแก่	2	กก.
เครื่องอบอะเพ็ด	2	กก.
จุลินทรีย์ EM	240	مل.
กากรน้ำตาล	240	مل.

วิธีทำ

- นำสะเดาใส่ปืน เติมน้ำให้เต็ม ต้มให้น้ำเหลือครึ่งปืน
- นำข่าแก่ และเครื่องอบอะเพ็ดมาทบให้พอดแตก และใบยูคาลิปตัส ต้มให้น้ำเหลือครึ่งปืน
- นำวัสดุทั้งสองปืนมารวมกันในภาชนะ (โถ่น้ำ) ปิดฝาให้สนิท ทิ้งไว้ 1 คืน
- นำจุลินทรีย์ EM และกากรน้ำตาล เทใส่โถ เติมน้ำให้เต็ม แล้วหมักทิ้งไว้อีก 1 คืน
- การใช้ปุ๋ยหมักจุลินทรีย์อัตรา 150 กก./ไร่/ไก่กลบก่อนปลูกงาน 15 วัน
- ปลูกปุ๋ยพืชสดตามกรรมวิธี ไก่กลบเมื่ออายุ 45 วัน ก่อนปลูกงาน 15 วัน
- ปลูกงาดำเนินธัญอุบราชานี 3 แบบแداول ระยะปลูก 50x10 เซนติเมตร ถอนแยกเมื่ออายุประมาณ 10-15 วันหลังออก กำจัดรากพืชด้วยแรงงานคนเมื่ออายุ 15-20 วัน

6. สูมเก็บตัวอย่างดินก่อนปลูก และหลังเก็บเกี่ยวเพื่อวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของดิน และเก็บตัวอย่างปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ เพื่อวิเคราะห์คุณภาพตามมาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์

- การบันทึกข้อมูล

1. วันปฏิบัติการต่างๆ

2. คุณสมบัติทางเคมีของดินก่อนปลูก และหลังเก็บเกี่ยว วิเคราะห์ค่าต่างๆ ดังนี้ pH EC (Electrical Conductivity) % OM Available P Exchangeable K Ca Mg Fe Cu Zn Mn

3. คุณสมบัติของปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ วิเคราะห์ตามค่ามาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์

4. ผลผลิตเม็ดและองค์ประกอบของผลผลิตได้แก่

- จำนวนต้นเก็บเกี่ยว

- จำนวนฝักต่อต้น (สูม 10 ต้นต่อแปลงย่อย)

- น้ำหนักเม็ดต่อ 1,000 เม็ด (นับ 3 ตัวอย่าง ละ 1,000 เม็ด)

5. ลักษณะอื่นๆ ได้แก่ ความสูงของต้น จำนวนกิ่งต่อต้น (สูม 10 ต้นต่อแปลงย่อย)

6. โรคและแมลงศัตรูที่พบ

7. ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของงาน

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ :

ผลการทดลองปี 2556 จ.อุบลราชธานี

คุณสมบัติของดิน

จากการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของดินก่อนการปลูกงา พบร้า ดินมีค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ระหว่าง 5.12-5.38 มีอินทรีย์ต่ำ 0.41-0.88 ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ได้ในดิน 2.16-6.72 มก./กก. โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ 12.50-29.50 มก./กก. (ตารางที่ 1) หลังเก็บเกี่ยวฯ พบร้า การใช้ถั่วพมเป็นปุ๋ยพืชสด ดินมีค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ลดลงจากก่อนปลูกงา สำหรับค่าอินทรีย์ต่ำลดลงทุกกรรมวิธี ในขณะที่ค่าฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ได้ในดินเพิ่มขึ้นเป็น 30.53-54.25 มก./กก. และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้เพิ่มขึ้นเป็น 28.50-42.00 มก./กก. (ตารางที่ 2) ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของประพิศ และสุรศิทธิ์ (2551) ที่พบร้า การจัดการดินด้วยวัสดุอินทรีย์อย่างต่อเนื่องระยะยาว จะมีผลทำให้ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมในดินเพิ่มขึ้น

ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิต

การใช้ปอเทือง อัตรา 5 กก./ไร่ นำไปให้ผลผลิตสูงสุด คือ 73.45 กก./ไร่ สำหรับการใช้ถั่วพม อัตรา 10 กก./ไร่ และถั่วพร้า อัตรา 15 กก./ไร่ นำไปให้ผลผลิตใกล้เคียงกัน คือ 55.22 และ 50.87 กก./ไร่ ในขณะที่การไม่ใช้ปุ๋ยพืชสด นำไปให้ผลผลิตต่ำที่สุด คือ 43.40 กก./ไร่ ซึ่งน้ำหนักของปุ๋ยพืชสดจากพืชสดทั้ง 3 ชนิด มีน้ำหนักใกล้เคียงกัน คือ อยู่ระหว่าง 106.9-117.9 กก./ไร่ ทางด้านองค์ประกอบผลผลิต พบร้า งามน้ำหนัก 1,000 เม็ด อยู่ระหว่าง

3.12-3.33 gramm จำนวนตันเก็บเกี่ยว อยู่ระหว่าง 39,387-65,533 ตันต่อไร่ การใช้ปุ๋ยพืชสดมีจำนวนฝักต่อตันสูงกว่าการไม่ใช้ปุ๋ยพืชสด คือ อยู่ระหว่าง 25.13-31.27 ฝักต่อตัน ในขณะที่การไม่ใช้ปุ๋ยพืชสด มีจำนวนฝักต่อตันเพียง 19.53 ฝักต่อตัน (ตารางที่ 3)

การเจริญเติบโต

การเจริญเติบโตของงา วัดจากความสูงเมื่อเก็บเกี่ยว พบร้า การใช้ปอเทือง อัตรา 5 กก./ไร่ ามีความสูงมากที่สุด คือ 116.4 เซนติเมตร รองลงมา คือ การใช้ถั่วพร้า อัตรา 15 กก./ไร่ มีความสูง 108.7 เซนติเมตร การใช้ถั่วพู่ม อัตรา 10 กก./ไร่ มีความสูง 101.6 เซนติเมตร และการไม่ใช้ปุ๋ยพืชสด ามีการเจริญเติบโตทางด้านความสูงน้อยที่สุด คือ 96.6 เซนติเมตร (ตารางที่ 3)

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ

ต้นทุนการผลิตงาที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับชนิดของปุ๋ยพืชสด ซึ่งการใช้ถั่วพร้า อัตรา 15 กก./ไร่ มีต้นทุนสูงที่สุด คือ 3,819 บาทต่อไร่ และการไม่ใช้ปุ๋ยพืชสดมีต้นทุนการผลิตต่ำที่สุด คือ 3,519 บาทต่อไร่ (ตารางที่ 4) ซึ่ง การใช้ปอเทือง อัตรา 5 กก./ไร่ ให้รายได้สูงสุด 4,407 บาทต่อไร่ และให้กำไรสุทธิสูงสุด 788 บาทต่อไร่ ในขณะที่การไม่ใช้ปุ๋ยพืชสด ทำให้ขาดทุนสูงสุด 915 บาทต่อไร่ การใช้ถั่วพร้า อัตรา 15 กก./ไร่ ขาดทุน 767 บาทต่อไร่ และการใช้ถั่วพู่ม อัตรา 10 กก./ไร่ ขาดทุน 451 บาทต่อไร่ (ตารางที่ 5)

ผลการทดลองปี 2557 จ.อุบลราชธานี

คุณสมบัติของดิน

ก่อนการปลูกงา ดินมีค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) อยู่ระหว่าง 4.47-4.75 ซึ่งเป็นดินที่ไม่เหมาะสมสำหรับการปลูกงา เพราะดินที่เหมาะสมต่อการปลูกงา ควรมีค่าความเป็นกรด-ด่าง ของดินอยู่ระหว่าง 5.5-7.0 (ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี, 2556) มีอินทรีย้วัตถุ 0.75-1.10% พอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ได้ในดิน 10.53-17.53 มก./กก. และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ 25.50-40.50 มก./กก. (ตารางที่ 6) หลังเก็บเกี่ยวฯ ดินมีค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ระหว่าง 4.39-5.27 สำหรับอินทรีย้วัตถุการใช้ปุ๋ยพืชสดมีค่าอินทรีย้วัตถุเพิ่มขึ้น และมีค่าสูงกว่าการไม่ใช้ปุ๋ยพืชสด ทางด้านพอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ได้ในดิน และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ลดลง (ตารางที่ 7)

ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิต

การใช้ปุ๋ยพืชสด ามีแนวโน้มที่จะให้ผลผลิตสูงกว่าการไม่ใช้ปุ๋ยพืชสด คือ ให้ผลผลิตอยู่ระหว่าง 49.90-69.20 กก./ไร่ และการไม่ใช้ปุ๋ยพืชสดให้ผลผลิต 43.32 กก./ไร่ ซึ่งสอดคล้องกับผลการทดลองปี 2556 สำหรับองค์ประกอบผลผลิต จำนวนน้ำหนัก 1,000 เม็ดต อยู่ระหว่าง 3.23-3.37 gramm จำนวนตันเก็บเกี่ยว อยู่ระหว่าง 42,920-56,200 ตันต่อไร่ มีจำนวนฝักต่อตัน อยู่ระหว่าง 14.28-16.95 ฝักต่อตัน และมีน้ำหนักพืชสดต่อไร่ อยู่ระหว่าง 240-320 กก./ไร่ (ตารางที่ 8)

การเจริญเติบโต

การเจริญเติบโต วัดจากความสูงเมื่อเก็บเกี่ยว พบร้า การใช้ปอเทือง อัตรา 5 กก./ไร่ ามีความสูงมากที่สุด 117.9 เซนติเมตร รองลงมา คือ การใช้ถั่วพร้า อัตรา 15 กก./ไร่ มีความสูง 112.9 เซนติเมตร และการใช้

ถั่วพู่ม อัตรา 10 กก./ไร่ มีความสูง 106.9 เซนติเมตร ในขณะที่การไม่ใช้ปุ๋ยพืชสด นำมีความสูงน้อยที่สุด คือ 97.55 เซนติเมตร (ตารางที่ 8) ซึ่งสอดคล้องกับผลการทดลองปี 2556

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ

การใช้ถั่วพืช อัตรา 15 กก./ไร่ นำไปรายได้สูงสุด 4,152 บาทต่อไร่ และให้กำไรสุทธิ 333 บาทต่อไร่ ในขณะที่การไม่ใช้ปุ๋ยพืชสดขาดทุนสูงสุด 920 บาทต่อไร่ สำหรับการใช้ถั่วพู่ม อัตรา 10 กก./ไร่ ขาดทุน 775 บาทต่อไร่ และการใช้ปอเทือง อัตรา 5 กก./ไร่ ขาดทุน 137 บาทต่อไร่ (ตารางที่ 9)

จ.สุรินทร์

คุณสมบัติของดิน

จากการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของดินก่อนการปลูกงา พบร้า ดินมีค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 4.74 อินทรีย์วัตถุ 1.01% พอฟอรัสที่เป็นประโยชน์ได้ 2.95 มก./กก. และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ 13 มก./กก. (ตารางที่ 10)

ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิต

การไม่ใช้ปุ๋ยพืชสด นำไปผลผลิตสูงสุด 113.58 กก./ไร่ รองลงมา คือ การใช้ปอเทืองเป็นปุ๋ยพืชสด 101.54 กก./ไร่ การใช้ถั่วพู่มเป็นปุ๋ยพืชสด 96.36 กก./ไร่ และการใช้ถั่วพืช เป็นปุ๋ยพืชสด 85.33 กก./ไร่ มีน้ำหนักพืชสด อยู่ระหว่าง 90-220 กก./ไร่ ทางด้านองค์ประกอบผลผลิต พบร้า มีน้ำหนัก 1,000 เมล็ด อยู่ระหว่าง 2.82-3.07 กรัม จำนวนตันเก็บเกี่ยว อยู่ระหว่าง 28,148-46,507 ตันต่อไร่ มีจำนวนฝักต่อตัน 13.93-18.07 ฝักต่อตัน (ตารางที่ 11)

การเจริญเติบโต

การไม่ใช้ปุ๋ยพืชสด นำมีความสูงเมื่อเก็บเกี่ยวมากที่สุด คือ 90.70 เซนติเมตร เนื่องจากมีจำนวนตันเก็บเกี่ยวน้อยกว่ากรรมวิธีอื่นๆ ทำให้มีการแข่งขันน้อยกว่าการใช้ปุ๋ยพืชสดที่มีจำนวนตันเก็บเกี่ยวมากกว่า ซึ่งการใช้ปอเทืองเป็นปุ๋ยพืชสด นำมีความสูง 86.80 เซนติเมตร การใช้ถั่วพืช เป็นปุ๋ยพืชสดมีความสูง 81.37 เซนติเมตร และการใช้ถั่วพู่มเป็นปุ๋ยพืชสด นำมีความสูงน้อยที่สุด 77.83 เซนติเมตร (ตารางที่ 11)

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ

การไม่ใช้ปุ๋ยพืชสด นำไปรายได้สูงสุด 6,814 บาทต่อไร่ รองลงมา คือ การใช้ปอเทืองเป็นปุ๋ยพืชสด 6,092 บาทต่อไร่ การใช้ถั่วพู่มเป็นปุ๋ยพืชสด 5,783 บาทต่อไร่ และการใช้ถั่วพืช เป็นปุ๋ยพืชสด 5,119 บาทต่อไร่ และให้กำไรสุทธิ 3,295 2,473 2,014 และ 1,300 บาทต่อไร่ ตามลำดับ (ตารางที่ 12)

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ :

จังหวัดอุบลราชธานี การใช้ปุ๋ยพืชสด ทำให้ดินมีค่าอินทรีย์วัตถุสูงกว่าการไม่ใช้ปุ๋ยพืชสด ทางด้านการเจริญเติบโต การใช้ปุ๋ยพืชสดทำให้มีความสูงเมื่อเก็บเกี่ยวมากกว่าการไม่ใช้ปุ๋ยพืชสด สำหรับผลผลิตงา พบร้า การใช้ปอเทือง อัตรา 5 กก./ไร่ และการใช้ถั่วพืช อัตรา 15 กก./ไร่ นำไปผลผลิตสูงกว่าการใช้ถั่วพู่ม อัตรา 10

กก./ໄຮ ซึ่งการไม่ใช้ปุ๋ยพืชสด งานให้ผลผลิตน้อยกว่าการใช้ปุ๋ยพืชสด สำหรับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ การใช้ปอเทือง อัตรา 5 กก./ໄຮ และถั่วพร้า อัตรา 15 กก./ໄຮ เป็นปุ๋ยพืชสด งานให้ผลตอบแทนสูงกว่าการใช้ถั่วพม อัตรา 10 กก./ໄຮ และการไม่ใช้ปุ๋ยพืชสด

จังหวัดสุรินทร์ การใช้ปุ๋ยพืชสด งานให้ผลผลิตและความสูงเมื่อเก็บเกี่ยวต่ำกว่าการไม่ใช้ปุ๋ยพืชสด เนื่องจากปุ๋ยพืชสดมีการเจริญเติบโตไม่ดี สำหรับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ การไม่ใช้ปุ๋ยพืชสดงานให้ผลตอบแทนสูงสุด 3,295 บาทต่อไร่ รองลงมา คือ การใช้ปอเทือง อัตรา 5 กก./ໄຮ ให้ผลตอบแทน 2,473 บาทต่อไร่

10. เอกสารอ้างอิง :

บุญเหลือ ศรีมุงคุณ พรพรรณ สุทธิແย້ນ อรอนงค์ วรรณวงศ์ และนาตามา จันทร์ส่อง. 2551. การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปรับปรุงดินก่อนปลูกเพื่อผลิตงานในสภาพนาระบบอินทรีย์และระบบเคมี. หน้า 97-124. ใน รายงานผลงานวิจัย ปี 2551 ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

บุญเหลือ ศรีมุงคุณ อรอนงค์ วรรณวงศ์ และสมพงษ์ ชมภูนกุลรัตน์. 2555. การศึกษาการใช้ปุ๋ยพืชสดที่เหมาะสมต่อการปลูกงานในสภาพนาอินทรีย์. หน้า 172-181. ใน รายงานผลงานวิจัย ปี 2555 ศูนย์วิจัยพืชไร่ อุบลราชธานี สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดลองพลังงาน กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. ประพิศ แสงทอง และสุรัสิทธิ์ อรรถจาธุสิทธิ์. 2551. ผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีต่อคุณภาพดินและสภาพแวดล้อม. หน้า 126-158. ใน เอกสารประกอบการฝึกอบรม หลักสูตร เทคโนโลยีการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ วันที่ 5-6 มิถุนายน 2551. กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา สำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางเกษตร. กรมวิชาการเกษตร.

ศูนย์วิจัยพืชไร่ อุบลราชธานี. 2541. การปลูกพืชตระกูลถั่วบำรุงดิน. สถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 20 หน้า.

ศูนย์วิจัยพืชไร่ อุบลราชธานี. 2556. เกษตรดีที่เหมาะสมสำหรับงาน. สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดลองพลังงาน กรมวิชาการเกษตร. 31 หน้า.

อรอนงค์ วรรณวงศ์ พรพรรณ สุทธิແย້ນ บุญเหลือ ศรีมุงคุณ และนาตามา จันทร์ส่อง. 2551. การใช้ปุ๋ยพืชสดและปุ๋ยหมักปรับปรุงดินก่อนปลูกร่วมกับวิธีการปลูกงานในสภาพไร่อินทรีย์. หน้า 222-246. ใน รายงานผลงานวิจัย ปี 2551 ศูนย์วิจัยพืชไร่ อุบลราชธานี สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

ตารางที่ 1 ผลวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของดินก่อนการปลูกงา จากแปลงทดลองเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยพืชสดที่เหมาะสมต่อการปลูกงาในสภาพนาอินทรีย์ ปี 2556 ไร่เกษตรกร จ.อุบลราชธานี

กรรมวิธี	pH	OM	Avai.P	Exch.K	Ca	Mg	Fe	Zn	Cu	Mn
		%	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg
ถั่วพู่ม 10 กก./ไร่	5.12	0.88	3.12	12.50	79.25	11.63	76.93	0.22	0.09	2.10
ถั่วพร้า 15 กก./ไร่	5.34	0.41	6.72	19.00	88.63	12.13	64.73	0.41	0.07	1.18
ปอเทือง 5 กก./ไร่	5.38	0.66	5.52	29.50	142.75	15.50	81.25	0.36	0.09	3.00
ไม่ใช้ปุ๋ยพืชสด	5.26	0.41	2.16	13.00	49.00	14.88	55.38	0.18	0.04	1.30

ตารางที่ 2 ผลวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของดินหลังเก็บเกี่ยว จากแปลงทดลองเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยพืชสดที่เหมาะสมต่อการปลูกงาในสภาพนาอินทรีย์ ปี 2556 ไร่เกษตรกร จ.อุบลราชธานี

กรรมวิธี	pH	OM	Avai.P	Exch.K	Ca	Mg	Fe	Zn	Cu	Mn
		%	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg
ถั่วพู่ม 10 กก./ไร่	4.74	0.48	42.85	28.50	147.25	27.50	99.45	0.52	0.13	3.83
ถั่วพร้า 15 กก./ไร่	5.27	0.26	54.25	28.50	138.63	26.50	77.50	0.36	0.12	2.78
ปอเทือง 5 กก./ไร่	5.14	0.32	53.70	42.00	152.63	33.00	83.78	0.42	0.13	3.50
ไม่ใช้ปุ๋ยพืชสด	5.27	0.36	30.53	31.00	110.00	31.25	87.40	0.43	0.11	2.50

ตารางที่ 3 ผลผลิตต่อไร่ น้ำหนัก 1,000 เมล็ด จำนวนตันเก็บเกี่ยวต่อไร่ จำนวนผักต่อตัน ความสูงเก็บเกี่ยว และน้ำหนักพืชสดต่อไร่ จากแปลงทดลองเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยพืชสดที่เหมาะสมต่อการปลูกงาในสภาพนาอินทรีย์ ปี 2556 ไร่เกษตรกร จ.อุบลราชธานี

กรรมวิธี	ผลผลิต/ไร่	น้ำหนัก	จำนวนตัน	จำนวน	ความสูง	นน.พืชสด/ไร่
		(กก.)	1,000 เมล็ด	เก็บเกี่ยว/ไร่	ผัก/ตัน	(ซม.)

ถั่วพู่ม 10 กก./รร'	55.22	3.12	39,387	31.27	101.6	106.9
ถั่วพร้า 15 กก./รร'	50.87	3.33	47,360	25.13	108.7	112.9
ปอเทือง 5 กก./รร'	73.45	3.27	48,240	25.47	116.4	117.9
ไม้ใช้ปุ๋ยพืชสด	43.40	3.31	65,533	19.53	96.6	0

ตารางที่ 4 ต้นทุนการผลิตงาต่อไร่ จากแปลงทดสอบเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยพืชสดที่เหมาะสมต่อการปลูกงาในสภาพนา

อินทรีย์ ปี 2556 ไร่เกษตรกร จ.อุบลราชธานี

ต้นทุนการผลิต	ถั่วพู่ม (บาท/ไร่)	ถั่วพร้า (บาท/ไร่)	ปอเทือง (บาท/ไร่)	ไม้ใช้ปุ๋ยพืชสด (บาท/ไร่)
ไก่ลูกปุ๋ยพืชสด	300	300	300	300
ไก่กลบปุ๋ยพืชสด	300	300	300	300
ไก่พรวนปลูก	300	300	300	300
ค่าเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยพืชสด	250	300	150	0
ค่าเมล็ดพันธุ์งา	50	50	50	50
ค่าจ้างปลูก	400	400	400	400
ค่าปุ๋ยอินทรีย์	569	569	569	569
ค่ากำจัดวัชพืช	600	600	600	600
ค่าเก็บเกี่ยว	600	600	600	600
ค่ากลางเทาะ	400	400	400	400
รวม	3,769	3,819	3,619	3,519

ค่าปุ๋ยหมัก 3.79 บาทต่อกิโลกรัม

ค่าเมล็ดพันธุ์ถั่วพู่ม 25 บาทต่อกิโลกรัม (10 กก./ไร่)

ค่าเมล็ดพันธุ์ถั่วพร้า 20 บาทต่อกิโลกรัม (15 กก./ไร่)

ค่าเมล็ดพันธุ์ปอเทือง 30 บาทต่อกิโลกรัม (5 กก./ไร่)

ตารางที่ 5 ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจฯ จากแปลงทดสอบเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยพืชสดที่เหมาะสมต่อการปลูกงา

ในสภาพนาอินทรีย์ ปี 2556 ไร่เกษตรกร จ.อุบลราชธานี

กรรมวิธี	ต้นทุน (บาท/ไร่)	ผลผลิต (กก./ไร่)	รายได้ (บาท/ไร่)	กำไรสุทธิ (บาท/ไร่)	ผลผลิตคุ้มทุน (กก./ไร่)	ระดับราคาคุ้มทุน (บาท/กก.)
----------	---------------------	---------------------	---------------------	------------------------	----------------------------	-------------------------------

ถั่วพู่ม 10 กก./ไร่	3,769	55.22	3,313.20	-450.80	62.82	68.25
ถั่วพร้า 15 กก./ไร่	3,819	50.87	3,052.20	-766.80	63.65	75.07
ปอเทือง 5 กก./ไร่	3,619	73.45	4,407.00	788.00	60.32	49.27
ไม่ใช้ปุ๋ยพืชสด	3,519	43.40	2,604.00	-915.00	58.65	81.08

ราคาขาย 60 บาทต่อ กิโลกรัม

ระดับผลผลิตคุ้มทุน = ต้นทุนการผลิตต่อไร่ ÷ ราคาผลผลิต

ระดับราคาคุ้มทุน = ต้นทุนการผลิตต่อไร่ ÷ ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่

ตารางที่ 6 คุณสมบัติทางเคมีของดินก่อนปลูกงา จากแปลงทดสอบเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยพืชสดที่เหมาะสมต่อการปลูกงาในสภาพนาอินทรีย์ ปี 2557 ไร่เกษตรกร จ.อุบลราชธานี

กรรมวิธี	pH	OM (%)	Avai.P	Exch.K
			(mg/kg)	(mg/kg)
ถั่วพู่ม 10 กก./ไร่	4.57	0.89	13.45	40.50
ถั่วพร้า 15 กก./ไร่	4.75	1.03	10.70	25.50
ปอเทือง 5 กก./ไร่	4.72	1.10	17.53	32.00
ไม่ใช้ปุ๋ยพืชสด	4.47	0.75	10.53	29.00

ตารางที่ 7 คุณสมบัติทางเคมีของดินหลังเก็บเกี่ยวงา จากแปลงทดสอบเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยพืชสดที่เหมาะสมต่อการปลูกงาในสภาพนาอินทรีย์ ปี 2557 ไร่เกษตรกร จ.อุบลราชธานี

กรรมวิธี	pH	OM (%)	Avai.P	Exch.K
			(mg/kg)	(mg/kg)
ถั่วพู่ม 10 กก./ไร่	4.39	1.28	5.26	20.00
ถั่วพร้า 15 กก./ไร่	4.96	1.28	7.70	18.50
ปอเทือง 5 กก./ไร่	4.97	1.28	9.59	29.00
ไม่ใช้ปุ๋ยพืชสด	5.27	0.86	6.10	16.50

ตารางที่ 8 ผลผลิตต่อไร่ น้ำหนัก 1,000 เมล็ด จำนวนตันเก็บเกี่ยวต่อไร่ จำนวนฝักต่อตัน ความสูงเก็บเกี่ยวและน้ำหนักพืชสดต่อไร่ จากแปลงทดสอบเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยพืชสดที่เหมาะสมต่อการปลูกงานในสภาพนาอินทรีย์ ปี 2557 ไร่เกษตรกร จ.อุบลราชธานี

กรรมวิธี	ผลผลิต/ไร่ (กก.)	น้ำหนัก 1,000 เมล็ด (กรัม)	จำนวนตัน เก็บเกี่ยว/ไร่ (ตัน)	จำนวน ฝัก/ตัน	ความสูง เก็บเกี่ยว (ซม.)	นน.พืชสด/ไร่ (กก./ไร่)
ถั่วพุ่ม 10 กก./ไร่	49.90	3.36	42,920	16.95	106.9	280
ถั่วพร้า 15 กก./ไร่	69.20	3.23	56,200	16.78	112.9	320
ปอเทือง 5 กก./ไร่	58.04	3.33	47,960	17.30	117.9	240
ไม่ใช้ปุ๋ยพืชสด	43.32	3.37	42,920	14.28	97.55	0

ตารางที่ 9 ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจฯ จากแปลงทดสอบเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยพืชสดที่เหมาะสมต่อการปลูกงานในสภาพนาอินทรีย์ ปี 2557 ไร่เกษตรกร จ.อุบลราชธานี

กรรมวิธี	ต้นทุน (บาท/ไร่)	ผลผลิต (กก./ไร่)	รายได้ (บาท/ไร่)	กำไรสุทธิ (บาท/ไร่)	ผลผลิตคุ้มทุน (กก./ไร่)	ระดับราคาคุ้มทุน (บาท/กก.)
ถั่วพุ่ม 10 กก./ไร่	3,769	49.90	2,994	-775	62.82	75.53
ถั่วพร้า 15 กก./ไร่	3,819	69.20	4,152	333	63.65	55.19
ปอเทือง 5 กก./ไร่	3,619	58.04	3,482	-137	60.32	62.35
ไม่ใช้ปุ๋ยพืชสด	3,519	43.32	2,599	-920	58.65	81.23

ราคาขาย 60 บาทต่อกิโลกรัม

ระดับผลผลิตคุ้มทุน = ต้นทุนการผลิตต่อไร่ ÷ ราคากลางผลิต

ระดับราคาคุ้มทุน = ต้นทุนการผลิตต่อไร่ ÷ ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่

ตารางที่ 10 ผลวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของดินก่อนปลูก จากแปลงทดสอบเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยพืชสดที่เหมาะสมต่อการปลูกงานในสภาพนาอินทรีย์ ปี 2557 ไร่เกษตรกร จ.สุรินทร์

pH	OM (%)	Avai.P (mg/kg)	Exch.K (mg/kg)	Ca (mg/kg)	Mg (mg/kg)

4.74	1.01	2.95	13	235.5	28.25
------	------	------	----	-------	-------

ตารางที่ 11 ผลผลิตต่อไร่ น้ำหนัก 1,000 เมล็ด จำนวนตันเก็บเกี่ยวต่อไร่ จำนวนฝักต่อตัน ความสูงเก็บเกี่ยว และน้ำหนักพืชสดต่อไร่ จากแปลงทดสอบเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยพืชสดที่เหมาะสมต่อการปลูกงาในสภาพนาอินทรีย์ ปี 2557 ไร่เกษตรกร จ.สุรินทร์

กรรมวิธี	ผลผลิต/ไร่ (กก.)	น้ำหนัก 1,000 เมล็ด (กรัม)	จำนวนตัน เก็บเกี่ยว/ไร่	จำนวน ฝัก/ตัน (ฝัก)	ความสูง เก็บเกี่ยว (ซม.)	นน.พืชสด/ไร่ (กก.)
						จำนวน
ถั่วพู่ม 10 กก./ไร่	96.36	3.07	33,590	15.27	77.83	220
ถั่วพร้า 15 กก./ไร่	85.33	2.82	46,507	13.93	81.37	90
ปอเทือง 5 กก./ไร่	101.54	3.05	46,507	15.00	86.80	160
ไม่ใช้ปุ๋ยพืชสด	113.58	3.05	28,148	18.07	90.70	0

ตารางที่ 12 ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจฯ จากแปลงทดสอบเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยพืชสดที่เหมาะสมต่อการปลูกงาในสภาพนาอินทรีย์ ปี 2557 ไร่เกษตรกร จ.สุรินทร์

กรรมวิธี	ต้นทุน (บาท/ไร่)	ผลผลิต (กก./ไร่)	รายได้ (บาท/ไร่)	กำไรสุทธิ (บาท/ไร่)	ผลผลิตคุ้มทุน (กก./ไร่)	ระดับราคาคุ้มทุน (บาท/กก.)
ถั่วพู่ม 10 กก./ไร่	3,769	96.39	5,783.40	2,014.40	62.82	39.10
ถั่วพร้า 15 กก./ไร่	3,819	85.33	5,119.80	1,300.80	63.65	44.76
ปอเทือง 5 กก./ไร่	3,619	101.54	6,092.40	2,473.40	60.32	32.64
ไม่ใช้ปุ๋ยพืชสด	3,519	113.58	6,814.80	3,295.80	58.65	30.98

ราคาขาย 60 บาทต่อกิโลกรัม

ระดับผลผลิตคุ้มทุน = ต้นทุนการผลิตต่อไร่ ÷ ราคาราผลิต

ระดับราคาคุ้มทุน = ต้นทุนการผลิตต่อไร่ ÷ ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่