



ด้วงวงเจาะเมล็ดมะม่วง

Sternochetus olivieri (Faust) [Coleoptera : Curculionidae]

MANGO
SEED
WEEVIL

วงจรชีวิต



ด้วงวงเจาะเมล็ดมะม่วง (*Sternochetus olivieri* (Faust)) วางไข่ที่ผิวภายนอกผล
ตัวหนอน เจริญเติบโตอยู่ภายในเมล็ดมะม่วงจนกระทั่งเป็นตัวเต็มวัย เมื่อเมล็ดแห้งเปื่อย
จึงจะออกมาอาศัยตามร่องเปลือกของต้นมะม่วง อาจพบตามเศษซากพืช ตามรูโพรงบริเวณราก
และบริเวณผิวดิน สามารถหลบซ่อนตัวอยู่จนกระทั่งถึงฤดูมะม่วงในปีถัดไป

ลักษณะการทำลาย



การสำรวจ



การป้องกันกำจัด

1. พ่นสารฆ่าแมลง imidacloprid 10% SL
อัตรา 10 มล.ต่อน้ำ 20 ลิตร หลังจากมะม่วงติดผล
20-25 วัน (ผลอ่อน) 2 ครั้ง ห่างกันครั้งละ 5-7 วัน
2. เก็บผลมะม่วงที่ร่วงหล่น และเศษซากเมล็ดไปฝัง
ให้ลึกหรือเผาทำลาย
3. ทำความสะอาดสวน เพื่อลดแหล่งหลบซ่อนของ
ตัวเต็มวัย โดยการกำจัดวัชพืชและเศษซากพืช
การตัดแต่งกิ่ง และในกรณีที่ดินมะม่วงอายุมากกว่า
15 ปี ต้องหมั่นตรวจสอบตามรอยแตกของเปลือก
4. มีการจัดการการให้น้ำ ปู และการใช้สารฆ่าแมลง
อย่างเหมาะสม

กลุ่มบริหารศัตรูพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

กรมวิชาการเกษตร

โทร. 02-579-1061

