


# ฐานข้อมูลเชื้อพันธุ์พืชทุเรียน

## Plant Germplasm Database for Durian



สำนักคุ้มครองพันธุ์พืชแห่งชาติ  
กรมวิชาการเกษตร

ISBN 974-436-0151

## คำนำ

การปรับปรุงพันธุ์พืชหรือพัฒนาพันธุ์พืชให้ได้มาซึ่งพันธุ์ใหม่ (new plant variety) หรือพันธุ์ที่มีลักษณะที่ดีทั้งคุณลักษณะทางด้านปริมาณ (quantitative) และทางด้านคุณภาพ (qualitative) เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคหรือนักปรับปรุงพันธุ์พืช ปัจจัยที่สำคัญคือต้องมีพ่อแม่พันธุ์พืชที่มีฐานพันธุกรรมที่กว้างหรือมีความหลากหลายทางด้านพันธุกรรม (genetic diversity) พอสมควร อีกประการหนึ่งฐานข้อมูลเชื้อพันธุ์พืชเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญที่สุดเช่นกันในการที่จะทราบประวัติความเป็นมาตลอดจนคุณลักษณะประจำพันธุ์แต่ละพันธุ์พืช เหล่านี้ว่ามีลักษณะเด่นหรือลักษณะคืออะไร ทิศทางในการวางแผนเพื่อปรับปรุงพันธุ์พืชก็จะสะดวกขึ้นถ้ามีฐานข้อมูลที่ดีพอ

ปัจจุบันพันธุ์พืชใหม่ที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์หรือพัฒนาพันธุ์โดยนักปรับปรุงพันธุ์พืช ผู้ที่ปรับปรุงพันธุ์พืชสามารถยื่นขอรับสิทธิเพื่อคุ้มครองสิทธิ (Plant Variety Protection) ได้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ในการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ตามกฎหมายฉบับนี้จำเป็นต้องอาศัยฐานข้อมูลเกี่ยวกับพันธุ์พืชมากพอสมควร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา กรมวิชาการเกษตรโดยสำนักคุ้มครองพันธุ์พืชแห่งชาติ ได้ทำการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลเชื้อพันธุ์พืชต่าง ๆ "ภายใต้โครงการอนุรักษ์พัฒนาพืชสมุนไพรมะม่วงพื้นเมืองและจุลินทรีย์" เพื่ออนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดของเชื้อพันธุ์พืช ในระยะเบื้องต้นของโครงการดังกล่าว (พ.ศ. 2540 - 2544) สำนักคุ้มครองพันธุ์พืชแห่งชาติร่วมกับศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี สถาบันวิจัยพืชสวน ศูนย์วิจัยยางยะเชิงเทรา สถาบันวิจัยยางและศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี สถาบันวิจัยข้าว ได้ทำการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเชื้อพันธุ์พืชจำนวน 4 พันธุ์ได้แก่ มะม่วง ทูเรียน ยางพาราและข้าว ในโอกาสนี้จึงได้จัดทำเอกสารวิชาการฐานข้อมูลเชื้อพันธุ์พืชเหล่านี้ขึ้นมาโดยเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลสำหรับบันทึกลักษณะเชื้อพันธุ์พืช (descriptor) และรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลเชื้อพันธุ์พืช (plant germplasm database) ชนิดต่างๆ

ฐานข้อมูลเชื้อพันธุ์พืช ; ทูเรียน (Plant Germplasm Database for Durian) เอกสารเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของผลงานภายใต้โครงการดังกล่าว เป็นเรื่องเกี่ยวกับเชื้อพันธุ์ทูเรียนที่พบและมีรายงานการปลูกเลี้ยงในประเทศไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ภายในเล่มจะประกอบด้วยข้อมูลสำหรับบันทึกลักษณะเชื้อพันธุ์ทูเรียน การจัดจำแนกกลุ่มพันธุ์ทูเรียน ชื่อพันธุ์ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ ลักษณะประจำพันธุ์ ลักษณะทางด้าน การเกษตร ตลอดจนภาพประกอบลักษณะของผลทูเรียนประจำแต่ละพันธุ์ ฐานข้อมูลเชื้อพันธุ์ทูเรียนนับว่าเป็นครั้งแรกในการจัดพิมพ์ทางคณะผู้จัดทำยินดีน้อมรับคำติชมจากท่านผู้รู้และผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อมูลและความสมบูรณ์ของฐานข้อมูลเชื้อพันธุ์ทูเรียนต่อไป

(นายวิชา ธิติประเสริฐ)

ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองพันธุ์พืชแห่งชาติ

กรมวิชาการเกษตร

บทนำ

การจัดจำแนกกลุ่มพันธุ์ทุเรียน

การบันทึกลักษณะประจำเชื้อพันธุ์ทุเรียน (Descriptors for Durian)

รายชื่อพันธุ์ทุเรียนไทย

ลักษณะประจำเชื้อพันธุ์ทุเรียนเรียงตามตัวอักษร ก ถึง ฮ

คำนิยาม

เอกสารประกอบการเรียบเรียง

## บทนำ

พันธุ์พืชหรือเชื้อพันธุ์พืชเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในการปรับปรุงพันธุ์และผสมพันธุ์ให้ได้พันธุ์ที่ดีโดยให้ผลผลิตสูง เหมาะสมกับดินฟ้าอากาศ ด้านทานโรคและศัตรูพืช ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของประชาชน ตลอดจนมีคุณภาพดีเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ แต่ปัจจุบันพันธุ์พืชหรือเชื้อพันธุ์พืชตามธรรมชาติได้ถูกทำลายลงจนใกล้จะสูญพันธุ์โดยกิจกรรมของมนุษย์ เช่น การบุกรุกทำลายป่าเพื่อทำมาหาเลี้ยงชีพ การขยายแหล่งที่อยู่อาศัย การสร้างเขื่อน เป็นต้น นอกจากนี้ยังถูกทำลายโดยภัยทางธรรมชาติ เช่น ความแห้งแล้ง ความหนาวเย็น น้ำท่วม ไฟป่า เป็นต้น นักวิชาการด้านพันธุ์พืช นักอนุรักษ์ธรรมชาติได้ตระหนักถึงความสูญหายของพันธุ์พืชซึ่งถูกทำลายลงไปเรื่อยๆ จึงได้รณรงค์ให้มีการร่วมมือกันอนุรักษ์พันธุ์พืชตามธรรมชาติให้คงอยู่สภาพเดิม ส่วนนักพัฒนาพันธุ์พืชก็ได้ทำการสำรวจ รวบรวมและนำเทคนิคใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการเก็บรักษาเชื้อพันธุ์พืช การแลกเปลี่ยนเชื้อพันธุ์พืชและข้อมูลทางด้านเชื้อพันธุ์พืชเพื่อจะได้นำมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์และผสมพันธุ์ให้ได้พันธุ์พืชที่ดีให้ผลผลิตสูงและคุณภาพดีต่อไป

กรมวิชาการเกษตรได้มีการรวบรวมและอนุรักษ์เชื้อพันธุ์พืชทั้งภายในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศไว้จำนวนมากทั้งชนิดและปริมาณไว้ตามศูนย์และสถานีวิจัยทดลองต่างๆ ทั่วประเทศ นอกจากงานรวบรวมเก็บรักษา ปลูกต่ออายุ และการประเมินลักษณะประจำพันธุ์ของแต่ละชนิดแล้ว ยังจำเป็นต้องมีการบันทึกข้อมูล (documentation) ไว้เพื่อใช้ค้นคว้า อ้างอิง หรือจัดทำรายงานภายหลังซึ่งมีหลายรูปแบบ เช่น บันทึกลงในสมุดหรือกระดาษ บันทึกลงในโปรแกรมซอฟต์แวร์สำเร็จรูปต่างๆ เป็นต้น การบันทึกข้อมูลดังกล่าวยิ่งนานวันยิ่งมีมากขึ้นและถ้าไม่มีระบบการจัดเก็บที่ดีแล้ว ไม่เป็นระบบฐานเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน การค้นหาข้อมูล การแลกเปลี่ยนข้อมูลในภายหลังจะล่าช้าและสิ้นเปลืองแรงงานหรือค่าใช้จ่าย เพราะเปลืองเนื้อที่ในการเก็บ บางครั้งไม่ทันสมัย ข้อมูลจึงเป็นลักษณะข้อมูลขยะ การแก้ไขข้อมูลเป็นไปได้โดยยากและอาจมีการสับสนได้ง่าย ที่สำคัญข้อมูลอาจสูญหายได้โดยง่าย ปัญหาเหล่านี้แก้ไขได้โดยนำระบบการจัดการฐานข้อมูล (Database Management System) ซึ่งเป็นการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและการเรียกใช้ข้อมูลจากฐานหรือไฟล์ข้อมูลอย่างมีระบบ เพื่อให้การใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและสมบูรณ์สูงสุด วิธีนี้จำเป็นต้องมีโปรแกรมประยุกต์ใช้กับคอมพิวเตอร์เพื่ออำนวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลลงไฟล์ การเรียกใช้ข้อมูลจากไฟล์ การแก้ไขข้อมูลให้ทันสมัยได้โดยง่าย การนำข้อมูลออกมาวิเคราะห์ทางสถิติหรือออกแบบทำรายงานได้โดยสะดวก

กองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร โดยฝ่ายนำพืชและอนุรักษ์พืชป่า ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น “สำนักคุ้มครองพันธุ์พืชแห่งชาติ” ซึ่งเดิมมีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการอนุรักษ์และจัดทำทะเบียนพันธุ์พืชที่มีการนำเข้าและแลกเปลี่ยนพันธุ์จากต่างประเทศ เพื่อการศึกษา ทดลอง ค้นคว้าของนักวิชาการเกษตรและนักปรับปรุงพันธุ์พืชของกรมวิชาการเกษตร ดังนั้นจึงมีการรวบรวมข้อมูลทางด้านเชื้อพันธุ์พืชที่มีการนำเข้าไว้ส่วนหนึ่ง แต่จากการที่กรมวิชาการเกษตรไม่เคยมีฐานข้อมูลเชื้อพันธุ์พืช (plant germplasm database) ที่เป็นระบบมาก่อน จึงไม่สามารถบริการข้อมูลให้กับผู้จะนำไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ นักวิชาการเกษตรหรือนักปรับปรุงพันธุ์พืชของกรมวิชาการเกษตร ตลอดจนประชาชนผู้สนใจได้ว่าขณะนี้ มีทรัพยากรเชื้อพันธุ์พืชที่เก็บรวบรวมและอนุรักษ์ไว้ใน

หน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรจำนวนเท่าไร อยู่ที่ใดบ้างและมีลักษณะประจำพันธุ์เป็นอย่างไร ดังนั้นสำนัก  
คุ้มครองพันธุ์พืชแห่งชาติ จึงมีแนวความคิดที่จะจัดทำฐานข้อมูลเชื้อพันธุ์พืชของกรมวิชาการเกษตรขึ้น เพื่อ  
รวบรวมเชื้อพันธุ์พืชที่กระจายกระจายหรือจัดเป็นรูปแบบต่างๆ กัน ให้เป็นฐานข้อมูลที่เป็นระเบียบและมี  
มาตรฐานสากล โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยดำเนินการกล่าวคือ ใช้ระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลทาง  
คอมพิวเตอร์ ในการจัดฐานการฐานข้อมูลมีลักษณะเป็นระบบเชื่อมโยงเครือข่ายขึ้น กล่าวคือ มีศูนย์กลาง  
รวบรวมข้อมูลและในขณะเดียวกันสามารถกระจายการใช้งาน (distributed database) ไปยังผู้ใช้งาน (user) ที่อยู่  
ในเครือข่ายเดียวกันให้สามารถสืบค้น เรียกใช้ ปรับปรุงข้อมูลหรือโอนย้ายข้อมูลระหว่างกันได้ง่ายและสะดวก  
อย่างเป็นระบบ จึงได้เสนอ "โครงการการจัดทำระบบฐานข้อมูลเชื้อพันธุ์พืช" ไปยังสำนักงบประมาณเมื่อปี 2539  
และสำนักงบประมาณ ได้อนุมัติให้ดำเนินการการจัดทำระบบฐานข้อมูลเชื้อพันธุ์พืชของกรมวิชาการเกษตร  
ภายใต้โครงการอนุรักษ์ พัฒนาพืชสมุนไพร พืชพื้นเมืองและจุลินทรีย์ได้ตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา ซึ่งสำนัก  
คุ้มครองพันธุ์พืชแห่งชาติได้ดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์กล่าวคือ สามารถเก็บรวบรวมฐานข้อมูลเชื้อพันธุ์  
มะม่วง ทุเรียน ข้าว และยางพารา ไว้ได้มากพอสมควรและที่ผ่านมาได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำ  
ระบบฐานข้อมูลเชื้อพันธุ์พืชทั้ง 4 ชนิดพืชของกรมวิชาการเกษตร ในระยะเวลาและสถานที่ต่างกันโดยได้เรียน  
เชิญท่านผู้มีประสบการณ์จากภาคราชการ เอกชน และสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งผู้ที่มีประสบการณ์ในกลุ่มพืช  
นั้นๆ ทั่วประเทศมาให้ความเห็น โดยมีเป้าหมายของการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คือ


1. เพื่อทบทวน/ปรับปรุง โครงสร้างฐานข้อมูลเชื้อพันธุ์พืชให้ครบถ้วนสมบูรณ์
2. เพื่อทบทวน/ปรับปรุง ข้อมูลที่ทำการบันทึกในฐานข้อมูลเชื้อพันธุ์พืชให้มีความถูกต้องชัดเจน  
ในแต่ละลักษณะของพันธุ์พืช
3. เพื่อนำข้อมูล/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นจากนักวิชาการ ผู้มีประสบการณ์ มาพัฒนา  
ฐานข้อมูลเชื้อพันธุ์พืช
4. เพื่อใช้เป็นแบบอย่างในการทำฐานข้อมูลเชื้อพันธุ์พืชชนิดอื่น ๆ ต่อไป

เอกสารเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งหลังจากการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการดังกล่าวซึ่งได้ปรับปรุง  
ฐานข้อมูลให้สมบูรณ์ขึ้นและดำเนินการจัดพิมพ์ไว้เป็นเอกสารทางด้านวิชาการเพื่อการใช้ประโยชน์ต่อไป


## การจัดจำแนกกลุ่มพันธุ์ทุเรียน

การจัดจำแนกกลุ่มทุเรียนไทยเป็นการจำแนกภายใต้ระดับ species พบว่าลักษณะสามารถใช้เป็นเครื่องจำแนกทุเรียนไทยได้แก่ รูปร่างใบ ปลายใบ ฐานใบ ทรงผล และหนามผล (ดังตารางที่ 1) ซึ่งเป็นลักษณะที่ค่อนข้างคงที่ไม่แปรปรวนไปตามสภาพแวดล้อม การจัดจำแนกกลุ่มพันธุ์ทุเรียนพอจะจำแนกออกได้เป็น 6 กลุ่ม ดังนี้


1. **กลุ่มกบ** มีลักษณะรูปร่างใบ (leaf shape) เป็นแบบ ovate – oblong ลักษณะปลายใบ (leaf apex) เป็นแบบ acuminate – curve ลักษณะฐานใบ (leaf base) เป็นแบบ rounded – obtuse ลักษณะทรงผลของกลุ่มกบนี้จะกระจายอยู่ใน 3 ลักษณะคือ กลม (rounded) กลมรี (oval) กลมแป้น (oblate) มีรูปร่างของหนามผล (fruit spine shape) มีลักษณะโค้งงอ (hooked) ดังภาพที่ 1




รูปไข่ขอบขนาน (oval-oblong)



(acuminate-curve)



กลมมน (rounded-obtuse)



โค้งงอ (hooked)



กลมแป้น (oblate)



กลม (rounded)



กลมรี (oval)

ภาพที่ 1 แสดงลักษณะทรงใบ ปลายใบ ฐานใบ ทรงผลและหนามผลของทุเรียนในกลุ่มกบ


รายชื่อพันธุ์ทุเรียนที่จำแนกอยู่ในกลุ่มกบ ได้แก่

- |                         |                    |                          |                  |
|-------------------------|--------------------|--------------------------|------------------|
| 1. กบแม่เต่า            | 2. กบเล็บเหยี่ยว   | 3. กบตาขำ                | 4. กบพิกุล       |
| 5. กบวัดกล้วย           | 6. กบชายน้ำ        | 7. กบสาวน้อย(กบก้านสั้น) | 8. กบสุวรรณ      |
| 9. กบเจ้าคุณ            | 10. กบตาท่อม(กบดำ) | 11. กบตาปุ่น             | 12. กบหน้าศาล    |
| 13. กบจำปา(กบแข่งสิงห์) | 14. กบเบา          | 15. กบรัศมี              | 16. กบตาโห้      |
| 17. กบตาแจ่ม            | 18. กบทองคำ        | 19. กบสีนาค              | 20. กบทองก้อน    |
| 21. กบไว                | 22. กบงู           | 23. กบตาเต่า             | 24. กบชมพู       |
| 25. กบพลเทพ             | 26. กบพวง          | 27. กบวัดเพลง            | 28. กบก้านเหลือง |
| 29. กบตานวล             | 30. กบตามาก        | 31. กบทองเพ็ญ            | 32. กบราชเนตร    |
| 33. กบแก้ว              | 34. กบตานุช        | 35. กบตามิตร             | 36. กลิบสมุทร    |
| 37. กบตาเม้น            | 38. การะเกด        | 39. กบช่อนกลิ้ง          | 40. กบตาเป็น     |
| 41. กบทองดี             | 42. กบชिरะ         | 43. กบมังกร              | 44. กบลำเจียก    |
| 45. กบหลังวิหาร         | 46. กบหัวล้าน      |                          |                  |


2. กลุ่มลวง มีลักษณะรูปร่างใบ (leaf shape) รูปไข่ขอบขนาน (Oval-oblong) ลักษณะปลายใบ (leaf apex) แหลมเรียว (acuminate-acute) ลักษณะฐานใบ (leaf base) แหลม (acute) และมน (obtuse) ลักษณะทรงผลกระจายอยู่ใน 2 ลักษณะ คือ ทรงกระบอก (cylindroidal) และรูปรี (elliptic) ลักษณะหนามผลเว้า (concave) ดังภาพที่ 2

รายชื่อพันธุ์ทุเรียนที่จำแนกอยู่ในกลุ่มลวง ได้แก่

- |                 |                |                   |
|-----------------|----------------|-------------------|
| 1. ลวงทอง       | 2. ลวงมะรุม    | 3. ชะนี           |
| 4. ชะนีกิ่งม้วน | 5. ชมพูศรี     | 6. ย่ามะหวาด      |
| 7. สายหยุด      | 8. ชะนีก้านยาว | 9. ชะนีน้ำตาลทราย |
| 10. มดแดง       | 11. สีเทา      |                   |



รูปไข่ขอบขนาน  
(oval-oblong)



แหลมเรียว  
(acuminate-acute)



แหลม (acute)



มน (obtuse)



รูปรี (elliptic)



ทรงกระบอก (cylindroidal)



เว้า (concave)


ภาพที่ 2 แสดงลักษณะรูปร่างใบ ปลายใบ ฐานใบ ทรงผลและหนามผลของทุเรียนในกลุ่มลวง




3. กลุ่มก้านยาว มีลักษณะรูปร่างใบ (leaf shape) ป้อมปลายใบ (obovate-lanceolate) ลักษณะปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ลักษณะฐานใบ (leaf base) เรียว (cuneate-acute) ลักษณะทรงผลเป็นรูปไข่กลับ (obovate) และรูปกลม (rounded) รูปร่างหนามผลนูน (convex) ดังภาพที่ 3



ป้อมปลายใบ (obovate-lanceolate)



เรียวแหลม (acuminate)



เรียว (cuneate-acute)



กลม (rounded)



รูปไข่กลับ (obovate)



นูน (convex)

ภาพที่ 3 แสดงลักษณะรูปร่างใบ ปลายใบ ฐานใบ ทรงผลและหนามผลของทุเรียนในกลุ่มก้านยาว


รายชื่อพันธุ์ทุเรียนที่จำแนกอยู่ในกลุ่มก้านยาว ได้แก่

- |               |                                   |                 |
|---------------|-----------------------------------|-----------------|
| 1. ก้านยาว    | 2. ก้านยาววัดสัก (เหลืองประเสริฐ) | 3. ก้านยาวสีนาค |
| 4. ก้านยาวพวง | 5. ก้านยาวใบด่าง                  | 6. ทองสุก       |
| 7. ชมภูบาน    | 8. ต้นใหญ่                        |                 |


4. กลุ่มกำป็น มีลักษณะรูปร่างใบ (leaf shape) ยาวเรียว (linear-oblong) ลักษณะปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (caudate-acuminate) ลักษณะฐานใบ (leaf base) แหลม (acute) ลักษณะทรงผล ทรงขอบขนาน (oblong) รูปร่างหนามผลแหลมตรง (pointed) ดังภาพที่ 4



ยาวเรียว (linear-oblong)




(caudate-acuminate)



แหลม (acute)



ขอบขนาน (oblong)




แหลม (pointed)

ภาพที่ 4 แสดงลักษณะรูปร่างใบ ปลายใบ ฐานใบ ทรงผลและหนามผลของทุเรียนในกลุ่มกำป็น


รายชื่อพันธุ์ทุเรียนที่จำแนกอยู่ในกลุ่มกำป็น ได้แก่

- |                        |                         |                   |
|------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1. กำป็นเดิม(กำป็นขาว) | 2. กำป็นเหลือง(เจ้ากรม) | 3. กำป็นแดง       |
| 4. กำป็นตาแพ           | 5. กำป็นพวง             | 6. ชามะไฟ         |
| 7. ปิ่นทอง             | 8. เม็ดในกำป็น          | 9. เท-รา          |
| 10. หมอนเดิม           | 11. หมอนทอง             | 12. กำป็นบางสีทอง |
| 13. ลูกเกตุ            |                         |                   |


5. กลุ่มท่อย้อย มีลักษณะรูปร่างใบ (leaf shape) แบบป้อมปลายใบ (obovate-lanceolate) ลักษณะปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ลักษณะฐานใบ (leaf base) มน (obtuse) ลักษณะทรงผลเป็นรูปไข่ (ovate) รูปร่างหนามผลนูนปลายแหลม (pointed-convex) *ดั่งภาพที่ 5*




ป้อมปลายใบ (obovate-lanceolate)



เรียวแหลม (acuminate)



มน (obtuse)



รูปไข่ (ovate)




นูนปลายแหลม (pointed-convex)

ภาพที่ 5 แสดงลักษณะรูปร่างใบ ปลายใบ ฐานใบ ทรงผลและหนามผลของทุเรียนในกลุ่มท่อย้อย


รายชื่อพันธุ์ทุเรียนที่จำแนกอยู่ในกลุ่มท่อย้อย ได้แก่

- |               |               |              |
|---------------|---------------|--------------|
| 1. ทอย้อยเดิม | 2. ทอย้อยฉัตร | 3. ฉัตร      |
| 4. ฉัตรสีนาค  | 5. ฉัตรสีทอง  | 6. พวงฉัตร   |
| 7. ทองใหม่    | 8. นมสวรรค์   | 9. ทับทิม    |
| 10. ธรณีไหว   | 11. นกหีบ     | 12. แดงรัศมี |
| 13. อีอึ้ง    | 14. อีทุย     |              |


6. กลุ่มเบ็ดเตล็ด ทุเรียนที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้มีลักษณะไม้แน่ชัดบางลักษณะอาจเหมือนกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งใน 5 กลุ่มแรก ขณะเดียวกันก็มีลักษณะที่ผันแปรออกไป เช่นรูปร่างใบ (leaf shape) จะมีลักษณะป้อมกลางใบ (elliptical) หรือรูปไข่ขอบขนาน (oval-oblong) ลักษณะของปลายใบ (leaf apex) เป็น แหลมเรียว (acuminate-acute) หรือ cuspidate-acuminate ลักษณะฐานใบ (leaf base) แหลม (acute) หรือ มน (obtuse) ลักษณะทรงผลกระจายกันอยู่ใน 3 ลักษณะ คือ กลมแป้น (oblate) กลมรี (oval) และทรงกระบอก (cylindroidal) หนามผลมีลักษณะเว้าปลายแหลม (pointed-concave) หรือนูนปลายแหลม (pointed-convex) ดังภาพที่ 6



ใ้ลมกลางใบ (elliptical)      รูปไข่ขอบขนาน (oval-oblong)




แหลมเรียว (cuspidate-acuminate) (acuminate-acute)



มน (obtuse)      แหลม (acute)



กลมแป้น (oblate)      ทรงกระบอก (cylindroidal)



นูนปลายแหลม (pointed-convex)



เว้าปลายแหลม (pointed-concave)

ภาพที่ 6 แสดงลักษณะรูปร่างใบ ปลายใบ ฐานใบ ทรงผลหนามผล ของทุเรียนในกลุ่มเบ็ดเตล็ด

รายชื่อพันธุ์ทุเรียนที่จำแนกอยู่ในกลุ่มเบ็ดเตล็ด ได้แก่

- |                           |                       |                         |
|---------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1. กะเทยเนื้อขาว          | 2. กะเทยเนื้อแดง      | 3. กะเทยเนื้อเหลือง     |
| 4. กระจุมทอง              | 5. กระจุมสีนาค        | 6. กระจูปรองทอง         |
| 7. กระจุกทอง(กระจุกทองดี) | 8. ก้อนทอง            | 9. เขียวคำลิ่ง          |
| 10. ขุนทอง                | 11. จอกลอย            | 12. ชายมังกุด           |
| 13. แดงข้างเขียน          | 14. แดงตาน้อย         | 15. แดงตาเพื่อน         |
| 16. แดงสาวน้อย            | 17. ดาวกระจาย         | 18. ตะพาน้ำ             |
| 19. ตะโก(ทองแดง)          | 20. คุ่มทอง           | 21. ทศพิณ               |
| 22. ทองคำตาพรวด           | 23. ทองม้วน           | 24. ทองคำ               |
| 25. นกกระจิบ              | 26. บาตรทองคำ(อีบาตร) | 27. บางขุนนนท์          |
| 28. เป็ดถบ                | 29. ฝอยทอง            | 30. พวงมาลัย            |
| 31. พวงมณี                | 32. เม็ดในยายปราง     | 33. เม็ดในบางขุนนนท์    |
| 34. ยินดี                 | 35. ใ้ใหม่            | 36. สีทอง               |
| 37. สีไพร                 | 38. สาวชมเห็ด         | 39. สาวชมฟักทอง(ฟักทอง) |
| 40. หางสิงห์              | 41. เจริญทอง          | 42. ใ้ไข่               |
| 43. อินทรชิต              | 44. อีล่า             | 45. อีลืบ               |
| 46. อียกษ์                | 47. อีหนัก            | 48. ตอสามเส้า           |
| 49. ทองนพคุณ              | 50. ทองหยอด           | 51. ทองหยิบ             |
| 52. นมสด                  | 53. เนื้อหนา          | 54. โบราณ               |
| 55. ฟักข้าว               | 56. พื้นเมืองเกาะช้าง | 57. มะนาว               |
| 58. เม็ดในกระจุม          | 59. เม็ดในก้านยาว     | 60. เม็ดในลวง           |
| 61. เมล็ดพงษ์พันธุ์       | 62. เมล็ดเขียน        | 63. เมล็ดลับแล          |
| 64. เมล็ดสม               | 65. เมล็ดอารีย์       | 66. ย่อม่วาด            |
| 67. ลวงเพาะเมล็ด          | 68. ลูกไหล            | 69. ลูกหนัก             |
| 70. สาเก                  | 71. สาวใหญ่           | 72. หมอนข้าง            |
| 73. หมอนละอองฟ้า          | 74. หลงลับแล          | 75. หัวลูกไม่ถึงฝั้ว    |
| 76. เหมราช                | 77. เหลืองทอง         | 78. อึ้งอน              |
| 79. ใ้เม่น                | 80. กะเทยข้าวสั้น     |                         |

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบลักษณะต่าง ๆ ของใบและผลทุเรียน จำนวน 146 สายพันธุ์

สายพันธุ์	กลุ่มพันธุ์	ใบ (leaf)			ทรงผล (fruit shape)	หนามผล (fruit spine shape)	ลักษณะพิเศษ	หมายเหตุ
		ทรงใบ(leaf shape)	ปลายใบ(leaf apex)	ฐานใบ(leaf base)				
1.กลุ่มกบ	รูปไข่ขอบขนาน(oval-oblong)	Acuminate-curve	กลมมน(rounded-obtuse)	กลม(rounded) กลมรี(oval) กลมแป้น(oblade)	โค้งงอ (hooked)			
1) กบแม่เต่า		Acuminate-curve	กลมมน(rounded-obtuse)	กลมรี(oval)	โค้งงอ (hooked)			
2) กบเล็บเหยี่ยว	ป้อมกลางใบ (elliptical) ป้อมปลายใบ(obovate lanceolate)	Acuminate-curve	แหลม(acute)	กลมรี(oval)	โค้งงอ (hooked)		เหมือนกบแม่เต่าแต่ผลใหญ่กว่า	
3) กบตาขำ		Acuminate-curve	กลมมน(rounded-obtuse)	รูปไข่(ovate)	เว้าปลายแหลม(pointed-concave)			
4) กบพิตุล	ป้อมโคนใบ(ovate-lanceolate)	เรียวแหลม(acuminate)	กลมมน(rounded-obtuse)	กลมแป้น(oblade)	แหลม (pointed)			
5) กบวัดกล้วย	ป้อมกลางใบ (elliptical)	caudate-acuminate	แหลม(acute)	กลมแป้น(oblade)	โค้งงอ (hooked)			
6) กบชายน้ำ	ขอบขนาน(oblong)	เรียวแหลม(acuminate)	มน (obtuse)	รูปไข่(ovate)	นูน(convex)	เป็นพันธุ์ที่ชอบน้ำมาก	กบก้านสั้น	
7) กบสาวน้อย	รูปไข่ขอบขนาน(oval-oblong) ขอบขนาน(oblong)	cuspidate-acuminate	แหลม(acute)	ขอบขนาน(oblong)	แหลม (pointed)			
8) กบสุวรรณ		Acuminate-curve	กลมมน(rounded-obtuse)	รูปรี(elliptic)	โค้งงอ (hooked)		กบดำ	
9) กบเจ้าคุณ	ป้อมกลางใบ (elliptical)	เรียวแหลม(acuminate)	แหลม(acute)	-	-			
10) กบตาห้วม	ป้อมกลางใบ(elliptical)	เรียวแหลม(acuminate)	แหลม(acute)	รูปรี(elliptic)	นูนปลายแหลม(pointed-convex)			
11) กบตาปุ่น	ป้อมกลางใบ (elliptical)	เรียวแหลม(acuminate)	กลมมน(rounded-obtuse)	กลม(rounded)	-	ผลแก่จะมีสีเหลือง	กบแข็งสิงห์	
12) กบหน้าศาล	รูปไข่ขอบขนาน(oval-oblong)	แหลมเรียว(acuminate-acute)	มน(obtuse)	รูปรี(elliptic)	นูนปลายแหลม(pointed-convex)			
13) กบจำปา	ป้อมกลางใบ (elliptical) ป้อมกลางใบ (elliptical)	เรียวแหลม(acuminate)	กลมมน(rounded-obtuse)	รูปรี(elliptic)	แหลม (pointed)			

กลุ่มพันธุ์ สายพันธุ์	ใบ (leaf)			ทรงผล (fruit shape)	หนามผล (fruit spine shape)	ลักษณะพิเศษ	หมายเหตุ	
	ทรงใบ(leaf shape)	ปลายใบ(leaf apex)	ฐานใบ(leaf base)					
14) กบเบา	รูปไข่ขอบขนาน(oval-oblong)	เรียวแหลม(acuminate)	กลมมน(rounded-obtuse)	-	นูนปลายแหลม(pointed-convex)	เป็นพันธุ์สุกเร็ว	ทองคำ	
15) กบรัศมี	ขอบขนาน(oblong)	เรียวแหลม(acuminate)	มน(obtuse)	รูปไข่กลับ(obovate)	โค้งงอ (hooked)			
16) กบตาให้	รูปไข่ขอบขนาน(oval-oblong)	acuminate-curve	มน(obtuse)	กลมรี(oval)	โค้งงอ (hooked)			
17) กบตาแจ่ม	รูปไข่ขอบขนาน(oval-oblong)	เรียวแหลม(acuminate)	มน(obtuse)	กลมแป้น(oblate)	นูนปลายแหลม(pointed-convex)			
18) กบทองคำ	ยาวเรียว(linear-oblong)	caudate-acuminate	มน(obtuse)	กลมรี(oval)	เว้า(concave)			
19) กบสีนาค	ป้อมกลางใบ (elliptical)	caudate-acuminate	มน(obtuse)	กลมแป้น(oblate)	นูนปลายแหลม(pointed-convex)			
20) กบทองก้อน	รูปไข่ขอบขนาน(oval-oblong)	เรียวแหลม(acuminate)	มน(obtuse)	รูปไข่กลับ(obovate)	เว้าปลายแหลม(pointed-concave)			
21) กบไผ่	รูปไข่ขอบขนาน(oval-oblong)	เรียวแหลม(acuminate)	มน(obtuse)	-	โค้งงอ (hooked)			
22) กบงู	ป้อม โคนใบ(ovate-lanceolate)	เรียวแหลม(acuminate)	แหลม(acute)	กลมแป้น(oblate)	โค้งงอ (hooked)			ออกลูกตามลำต้น
23) กบตาเต่า	รูปไข่ขอบขนาน(oval-oblong)	Acuminate-curve	กลมมน(rounded-obtuse)	กลมรี(oval)	โค้งงอ (hooked)			
24) กบชมพู	รูปไข่ขอบขนาน(oval-oblong)	เรียวแหลม(acuminate)	แหลม(acute)	กลมแป้น(oblate)	แหลม(pointed)			
25) กบพลเทพ	รูปไข่ขอบขนาน(oval-oblong)	เรียวแหลม(acuminate)	มน(obtuse)	กลม(rounded)	โค้งงอ (hooked)			
26) กบพวง	ยาวเรียว(linear-oblong)	caudate-acuminate	เรียว (cuneate-acute)	-	โค้งงอ (hooked)			
27) กบวัดเพลง	ป้อมกลางใบ (elliptical)	cuspidate-acuminate	แหลม(acute)	-	โค้งงอ (hooked)			
28) กบก้านเหลือง	ยาวเรียว(linear-oblong)	เรียวแหลม(acuminate)	กลมมน(rounded-obtuse)	-	โค้งงอ (hooked)			
29) กบตานวล	รูปไข่ขอบขนาน(oval-oblong)	Acuminate-curve	กลมมน(rounded-obtuse)	-	โค้งงอ (hooked)			
30) กบตามาก	รูปไข่ขอบขนาน(oval-oblong)	เรียวแหลม(acuminate)	กลมมน(rounded-obtuse)	-	โค้งงอ (hooked)			
31) กบทองเพ็ง	รูปไข่ขอบขนาน(oval-oblong)	เรียวแหลม(acuminate)	กลมมน(rounded-obtuse)	-	โค้งงอ (hooked)	ทองเพ็ง		
32) กบราชันธร	ป้อมกลางใบ(elliptical)	เรียวแหลม(acuminate)	กลมมน(rounded-obtuse)	-	โค้งงอ (hooked)			
33) กบแก้ว	ป้อมกลางใบ (elliptical)	แหลมเรียว(acuminate-acute)	เรียว (cauneate-acute)	-	โค้งงอ (hooked)			

กลุ่มพันธุ์ สายพันธุ์	ใบ (leaf)			ทรงผล (fruit shape)	หนามผล (fruit spine shape)	ลักษณะพิเศษ	หมายเหตุ
	ทรงใบ(leaf shape)	ปลายใบ(leaf apex)	ฐานใบ(leaf base)				
34) กบตานูช	รูปไข่ขอบขนาน(oval-oblong)	Acuminate-curve	กลมมน(rounded-obtuse)	-	โค้งงอ (hooked)	เป็นพันธุ์ที่ไม่มี กลิ่นฟุ้งกระจาย	ช่อนกลิ่น
35) กบตามิตร	ป้อมกลางใบ (elliptical)	เรียวแหลม(acuminate)	กลมมน(rounded-obtuse)	-	โค้งงอ (hooked)		
36) กลิบสมุทร	ขอบขนาน(oblong)	เรียวแหลม(acuminate)	แหลม(acute)	กลมแป้น(oblate)	-		
37) กบตาแมน	ป้อมกลางใบ(elliptical)	เรียวแหลม(acuminate)	มน(obtuse)	-	โค้งงอ (hooked)		
38) การะเกด	ป้อมกลางใบ (elliptical)	เรียวแหลม(acuminate)	มน(obtuse)	กลม(rounded)	โค้งงอ (hooked)		
39) กบช่อนกลิ่น	ป้อมปลายใบ(obovate-lanceolate)	เรียวแหลม(acuminate)	แหลม(acute)	รูปไข่กลับ(obovate)	นูนน้อย(lip)		
40) กบธีระ	ป้อมปลายใบ(obovate-lanceolate)	caudate-acuminate	แหลม(acute)	-	-		
41) กบลำเจียก	รูปไข่ขอบขนาน(oval-oblong)	เรียวแหลม(acuminate)	แหลม(acute)	กลมรี(oval)	นูนปลายแหลม(pointed-convex)		
42) กบหัวล้าน	ป้อมกลางใบ (elliptical)	เรียวแหลม(acuminate)	แหลม(acute)	-	-		
<b>2. กลุ่มลวง</b>	<b>รูปไข่ขอบขนาน(oval-oblong)</b>	<b>แหลมเรียว(acuminate-acute)</b>	<b>แหลม(acute) และ มน(obtuse)</b>	<b>ทรงกระบอก(cylindroidal) และ รูปรี(elliptic)</b>	<b>หนามเว้า(concave)</b>		



กลุ่มพันธุ์ สายพันธุ์	ใบ (leaf)			ทรงผล (fruit shape)	หนามผล (fruit spine shape)	ลักษณะพิเศษ	หมายเหตุ
	ทรงใบ(leaf shape)	ปลายใบ(leaf apex)	ฐานใบ(leaf base)				
47) ลวงทอง	รูปไข่ขอบขนาน(oval-oblong)	เรียวแหลม(acuminate)	แหลม(acute)	รูปรี(elliptic)	เว้า(concave)		ลวง
48) ลวงมะรุม	รูปไข่ขอบขนาน(oval-oblong)	เรียวแหลม(acuminate)	มน(obtuse)	รูปรี(elliptic)	เว้า(concave)		
49) ชะนี	รูปไข่ขอบขนาน(oval-oblong)	เรียวแหลม(acuminate)	แหลม(acute)	กลมรี(oval)	นูนปลายแหลม(pointed-convex)		
50) ชะนีกิ่งม้วน	รูปไข่ขอบขนาน(oval-oblong)	แหลมเรียว(acuminate acute)	แหลม(acute)	กลมรี(oval)	เว้า(concave)		
51) ชมพูศรี	รูปไข่ขอบขนาน(oval-oblong)	แหลมเรียว(acuminate acute)	แหลม(acute)	ทรงกระบอก (cylindroidal)	เว้า(concave)		
52) ขำมะหาด	ป้อมปลายใบ(obovate lanceolate)	เรียวแหลม(acuminate)	แหลม(acute)	รูปรี(elliptic)	เว้า(concave)		
53) สายหยุด	ขอบขนาน(oblong)	แหลมเรียว(acuminate acute)	แหลม(acute)	รูปรี(elliptic)	เว้า(concave)		
54) ชะนีก้านยาว	ป้อมโคนใบ(ovate-lanceolate)	แหลมเรียว(acuminate acute)	แหลม(acute)	กลมแป้น(oblate)	เว้าปลายแหลม(pointed-concave)		
55) ชะนีน้ำตาล ทราย	ป้อมปลายใบ(obovate lanceolate)	เรียวแหลม(acuminate)	แหลม(acute)	กลมรี(oval)	นูน(convex)		
56) มดแดง	-	-	-	รูปรี(elliptic)	เว้า (concave)		
57) สีเทา	-	-	-	ทรงกระบอก (cylindroidal)	เว้าปลายแหลม(pointed-concave)		นายฉลวง/ หอยโข่ง
<b>3. กลุ่มก้านยาว</b>	<b><u>ป้อมปลายใบ(obovate-lanceolate)</u></b>	<b><u>เรียวแหลม(acuminate)</u></b>	<b><u>เรียว (cuneate-acute)</u></b>	<b><u>ไข่กลับ(obovate) และ รูปกลม(rounded)</u></b>	<b><u>หนามนูน(convex)</u></b>		
58) ก้านยาว	ป้อมปลายใบ(obovate-lanceola)	เรียวแหลม(acuminate)	เรียว (cuneate-acute)	กลมรี(oval)	นูน(convex)	เป็นพันธุ์ที่ อ่อนแอและตาย ง่าย	

กลุ่มพันธุ์ สายพันธุ์	ใบ (leaf)			ทรงผล (fruit shape)	หนามผล (fruit spine shape)	ลักษณะพิเศษ	หมายเหตุ
	ทรงใบ(leaf shape)	ปลายใบ(leaf apex)	ฐานใบ(leaf base)				
59) ก้านยาววัดล็ก	ป้อมโคนใบ(ovate-lanceolate)	เรียวแหลม(acuminate)	มน(obtuse)	รูปไข่กลับ (obovate)	นูนปลายแหลม(pointed-convex)	มีหนามผลที่น้อยมาก	เหลืออง ประเสริฐ
60) ก้านยาวสีนาค	ป้อมปลายใบ(obovate-lanceolate)	แหลมเรียว(acuminate-acute)	แหลม(acute)	-	นูนปลายแหลม(pointed-convex)		
61) ก้านยาวพวง	ขอบขนาน(oblong)	เรียวแหลม(acuminate)	มน(obtuse)	กลมรี ( oval )	เว้า(concave)		
62) ก้านยาวใบต่าง	ขอบขนาน(oblong)	เรียวแหลม(acuminate)	มน(obtuse)	รูปรี ( elliptic )	เว้า(concave)		
63) ทองสุก	รูปไข่ขอบขนาน(oval-oblong)	แหลมเรียว(acuminate-acute)	แหลม(acute)	รูปรี ( elliptic )	เว้า(concave)		
64) ชมภูบาน	ยาวเรียว(linear-oblong)	caudate-acuminate	แหลม(acute)	ขอบขนาน (oblong)	แหลม(pointed)		
65) ต้นใหญ่	-	-	-	ไข่กลับ(obovate)	นูน(convex)		
<b>4. กลุ่มกำป็น</b>	<b>ยาวเรียว(linear-oblong)</b>	<b>เรียวแหลม(caudate-acuminate)</b>	<b>แหลม(acute)</b>	<b>ขอบขนาน (oblong)</b>	<b>แหลม(pointed)</b>		
67) กำป็นเดิม	รูปไข่ขอบขนาน(oval-oblong)	caudate-acuminate	แหลม(acute)	กลมรี ( oval )	แหลม(pointed)		กำป็นขาว
68) กำป็นเนื้อ เหลืออง	ยาวเรียว(linear-oblong)	caudate-acuminate	แหลม(acute)	ขอบขนาน (oblong)	แหลม(pointed)		
69) กำป็นแดง	ยาวเรียว(linear-oblong)	caudate-acuminate	แหลม(acute)	ขอบขนาน (oblong)	แหลม(pointed)		กำป็น เจ้ากรรม
70) กำป็นตาแพ	ยาวเรียว(linear-oblong)	caudate-acuminate	แหลม(acute)	ขอบขนาน (oblong)	แหลม(pointed)		กำป็นดำ
71) กำป็นพวง	ป้อมกลางใบ (elliptical)	caudate-acuminate	แหลม(acute)	ขอบขนาน (oblong)	แหลม(pointed)	ผลค่อนข้างสีออก น้ำตาลแดงเวลาแก่จัด	
72) ชามะไฟ	ยาวเรียว(linear-oblong)	caudate-acuminate	แหลม(acute)	ขอบขนาน (oblong)	นูน(convex)		

กลุ่มพันธุ์ สายพันธุ์	ใบ (leaf)			ทรงผล (fruit shape)	หนามผล (fruit spine shape)	ลักษณะพิเศษ	หมายเหตุ
	ทรงใบ(leaf shape)	ปลายใบ(leaf apex)	ฐานใบ(leaf base)				
73) ปันทอง	ยาวเรียว(linear-oblong)	caudate-acuminate	แหลม(acute)	ขอบขนาน(oblong)	นูนปลายแหลม(pointed-convex)		
74) เม็ดในกำป็น	ป้อมกลางใบ (elliptical)	caudate-acuminate	แหลม(acute)	ขอบขนาน(oblong)	แหลม(pointed)		
75) เห-รา	ยาวเรียว(linear-oblong)	cuspidate-acuminate	แหลม(acute)	ขอบขนาน(oblong)	แหลม(pointed)		
76) หมอนเดิม	ป้อมกลางใบ (elliptical)	caudate-acuminate	แหลม(acute)	ขอบขนาน(oblong)	แหลม(pointed)		
77) หมอนทอง	ยาวเรียว(linear-oblong)	เรียวแหลม(acuminate)	แหลม(acute)	-	แหลม(pointed)		
78) ลูกเกตุ	ยาวเรียว(linear-oblong)	เรียวแหลม(acuminate)	แหลม(acute)	-	-		
<b>5. กลุ่มทองย้อย</b>	<b>ป้อมปลายใบ(obovate-lanceolate)</b>	<b>เรียวแหลม(acuminate)</b>	<b>มน(obtuse)</b>	<b>รูปไข่(ovate)</b>	<b>นูนปลายแหลม(pointed-convex)</b>		
79) ทองย้อยเดิม	ป้อมโคนใบ(ovate-lanceolate)	เรียวแหลม(acuminate)	มน(obtuse)	รูปไข่(ovate)	นูนปลายแหลม(pointed-convex)		
80) ทองย้อยฉัตร	ป้อมปลายใบ(obovate-lanceolate)	เรียวแหลม(acuminate)	มน(obtuse)	รูปไข่(ovate)	นูนปลายแหลม(pointed-convex)	ทรงผลมีจุดเห็นเด่น	
81) ฉัตร	ป้อมโคนใบ(ovate-lanceolate)	เรียวแหลม(acuminate)	-	รูปไข่(ovate)	นูนปลายแหลม(pointed-convex)		
82) ฉัตรสีนาค	ป้อมโคนใบ(ovate-lanceolate)	เรียวแหลม(acuminate)	มน(obtuse)	รูปไข่(ovate)	นูนปลายแหลม(pointed-convex)		
83) ฉัตรสีทอง	ป้อมโคนใบ(ovate-lanceolate)	เรียวแหลม(acuminate)	มน(obtuse)	รูปไข่(ovate)	นูนปลายแหลม(pointed-convex)	ทรงพุ่มเป็นรูปฉัตร	
84) พวงฉัตร	ป้อมโคนใบ(ovate-lanceolate)	เรียวแหลม(acuminate)	มน(obtuse)	รูปไข่(ovate)	นูนปลายแหลม(pointed-convex)	ปลายกิ่งชี้ลงดิน	
85) ทองใหม่	รูปไข่ขอบขนาน(oval-oblong)	แหลมเรียว(acuminate acute)	มน(obtuse)	รูปไข่(ovate)	นูน(convex)	เนื้อไม้สีทองคล้ายทอง ใหม่ ๆ	
86) นมสวรรค์	ยาวเรียว(linear-oblong)	caudate-acuminate	แหลม (acute)	รูปรี(elliptic)	นูนปลายแหลม(pointed-convex)		

กลุ่มพันธุ์ สายพันธุ์	ใบ (leaf)			ทรงผล (fruit shape)	หนามผล (fruit spine shape)	ลักษณะ พิเศษ	หมายเหตุ
	ทรงใบ(leaf shape)	ปลายใบ(leaf apex)	ฐานใบ(leaf base)				
88) ทับทิม	ป้อมโคนใบ(ovate-lanceolate)	เรียวแหลม(acuminate)	มน(obtuse)	รูปไข่(ovate)	นูนปลายแหลม(pointed-convex)		
89) ธรณีไหล	รูปไข่ขอบขนาน(oval-oblong)	เรียวแหลม(acuminate)	มน(obtuse)	รูปไข่(ovate)	นูนปลายแหลม(pointed-convex)		
90) นกหิขิ	ป้อมโคนใบ(ovate-lanceolate)	เรียวแหลม(acuminate)	มน(obtuse)	รูปไข่(ovate)	นูนปลายแหลม(pointed-convex)		
91) แดงรัศมี	ป้อมโคนใบ(ovate-lanceolate)	เรียวแหลม(acuminate)	มน(obtuse)	รูปไข่(ovate)	นูนปลายแหลม(pointed-convex)		
92) อีอั้ง	ป้อมโคนใบ(ovate-lanceolate)	เรียวแหลม(acuminate)	มน(obtuse)	รูปไข่(ovate)	นูนปลายแหลม(pointed-convex)		
93) อีทุย	-	-	-	รูปไข่(ovate)	นูน(convex)		
<b>6. กลุ่มเบ็ดเตล็ด</b>							
94) กะเทยเนื้อขาว	ยาวเรียว(linear-oblong)	cuspidate-acuminate	แหลม(acute)	รูปไข่(ovate)	นูนปลายแหลม(pointed-convex)	เนื้อจะมีสีขาว	
95) กะเทยเนื้อแดง	ป้อมโคนใบ(ovate-lanceolate)	เรียวแหลม(acuminate)	มน(obtuse)	ทรงกระบอก (cylindroidal)	แหลม(pointed)		
96) กะเทยเนื้อ เหลือง	ยาวเรียว(linear-oblong)	cuspidate-acuminate	มน(obtuse)	กลมรี(oval)	นูนปลายแหลม(pointed-convex)	ผลสุกเร็วและ ร่วงง่าย	
97) กระจุดทอง	ป้อมกลางใบ(elliptical)	caudate-acuminate	กลมมน(rounded-obtuse)	กลมแป้น(oblate)	นูนปลายแหลม(pointed-convex)	ปลูกขึ้นง่าย และโตเร็วกว่า พันธุ์อื่น ๆ	กระจุด
98) กระจุดสีนาค	ป้อมปลายใบ(obovate-lanceolate)	caudate-acuminate	กลมมน(rounded-obtuse)	กลมแป้น(oblate)	-		
99) กระจุดทอง	ขอบขนาน(oblong)	เรียวแหลม(acuminate)	แหลม(acute)	รูปไข่(ovate)	นูนปลายแหลม(pointed-convex)		
100) กระจุดทองดี	รูปไข่ขอบขนาน(oval-oblong)	เรียวแหลม(acuminate)	แหลม(acute)	-	นูนปลายแหลม(pointed-convex)		กระจุดทอง
101) ก้อนทอง	รูปไข่ขอบขนาน(oval-oblong)	เรียวแหลม(acuminate)	แหลม(acute)	ทรงกระบอก (cylindroidal)	นูนปลายแหลม(pointed-convex)		
102) เขียวคำลิ่ง	รูปไข่ขอบขนาน(oval-oblong)	แหลมเรียว(acuminate-acute)	แหลม(acute)	กลมรี(oval)	นูนปลายแหลม(pointed-convex)		

กลุ่มพันธุ์ สายพันธุ์	ใบ (leaf)			ทรงผล (fruit shape)	หนามผล (fruit spine shape)	ลักษณะ พิเศษ	หมายเหตุ
	ทรงใบ(leaf shape)	ปลายใบ(leaf apex)	ฐานใบ(leaf base)				
103) ขุนทอง	ขอบขนาน(oblond)	แหลมเรียว(acuminate acute)	แหลม(acute)	กลมแป้น(oblote)	นูนปลายแหลม(pointed-convex)	กลิ่นหอม หวาน เฉพาะตัว	
104) จอกลอย	รูปไข่ขอบขนาน(oval-oblond)	เรียวแหลม(acuminate)	แหลม(acute)	รูปรี(elliptic)	นูนปลายแหลม(pointed-convex)		
105) ชายมังคุด	ป้อมกลางใบ (elliptical)	caudate-acuminate	แหลม(acute)	กลมรี(oval)	นูน(convex)	น้ำหนักผลเบา	
106) แดงช่างเขียน	รูปไข่ขอบขนาน(oval-oblond)	แหลมเรียว(acuminate-acute)	แหลม(acute)	ทรงกระบอก	นูนปลายแหลม(pointed-convex)		
107) แดงตาน้อย	ป้อมปลายใบ(obovate-lanceolate)	แหลมเรียว(acuminate-acute)	กลมมน(rounded-obtuse)	-	นูนปลายแหลม(pointed-convex)		
108) แดงตาเดือน	ป้อมกลางใบ (elliptical)	cuspidate-acuminate	กลมมน(rounded-obtuse)	-	นูนปลายแหลม(pointed-convex)		
109) แดงสาวน้อย	ป้อมปลายใบ(obovate-lanceolate)	เรียวแหลม(acuminate)	เรียว(cuneate-acute)	รูปไข่กลับ(obovate)	นูนปลายแหลม(pointed-convex)		
110) คาวกระจาย	ป้อมกลางใบ (elliptical)	caudate-acuminate	กลมมน(rounded-obtuse)	รูปไข่(ovate)	แหลม(pointed)		
111) ตะพานน้ำ	ป้อมกลางใบ (elliptical)	caudate-acuminate	กลมมน(rounded-obtuse)	กลมแป้น(oblote)	นูนปลายแหลม(pointed-convex)		
112) ตะโก	รูปไข่ขอบขนาน(oval-oblond)	caudate-acuminate	กลมมน(rounded-obtuse)	กลมรี(oval)	นูนปลายแหลม(pointed-convex)	พุ่มเล็กขี้ม	ทองแดง
113) คุ่มทอง	ป้อมกลางใบ(elliptical)	cuspidate-acuminate	กลมมน(rounded-obtuse)	-	-		
114) ทศพิณ	ป้อมกลางใบ(elliptical)	cuspidate-acuminate	แหลม(acute)	กลมแป้น(oblote)	นูนปลายแหลม(pointed-convex)		
115) ทองคำดาพรวด	ป้อมปลายใบ(obovate-lanceolate)	เรียวแหลม(acuminate)	เรียว(cuneate acute)	กลมแป้น(oblote)	นูนปลายแหลม(pointed-convex)		ทองคำพรวด
116) ทองม้วน	รูปไข่ขอบขนาน(oval-oblond)	เรียวแหลม(acuminate)	แหลม(acute)	กลมรี(oval)	แหลม(pointed)		
117) นกกระจับ	-	-	-	กลมรี(oval)	นูนปลายแหลม(pointed-convex)		อีบาตร
118) บาตรทองคำ	รูปไข่ขอบขนาน(oval-oblond)	Acuminate-curve	กลมมน(rounded-obtuse)	กลมรี(oval)	นูนปลายแหลม(pointed-convex)		

กลุ่มพันธุ์ สาพันธุ์	ใบ (leaf)			ทรงผล (fruit shape)	หนามผล (fruit spine shape)	ลักษณะ พิเศษ	หมายเหตุ
	ทรงใบ(leaf shape)	ปลายใบ(leaf apex)	ฐานใบ(leaf base)				
121) เบ็ดดบ	ป้อมกลางใบ (elliptical)	cuspidate-acuminate	กลมมน(rounded-obtuse)	กลมรี(oval)	-		
122) ฝอยทอง	ยาวเรียว(linear-oblong)	เรียวแหลม(acuminate)	มน(obtuse)	รูปรี((elliptic)	นูนปลายแหลม(pointed-convex)	หนาม ค่อนข้าง แหลมและถี่ มีเนื้อน้อย	
123) พวงมาลัย	ยาวเรียว(linear-oblong)	แหลมเรียว(acuminate-acute)	กลมมน(rounded-obtuse)	กลมรี(oval)	นูนปลายแหลม(pointed-convex)		
124) พวงมณี	รูปไข่ขอบขนาน(oval-oblong)	เรียวแหลม(acuminate)	แหลม(acute)	รูปรี((elliptic)	นูนปลายแหลม(pointed-convex)		
125) เม็ดในขาปราง	ป้อมกลางใบ (elliptical)	cuspidate-acuminate	กลมมน(rounded-obtuse)	กลมแป้น(oblate)	นูนปลายแหลม(pointed-convex)		
126) เม็ดในบางขุนนนท์	รูปไข่ขอบขนาน(oval-oblong)	cuspidate-acuminate	แหลม(acute)	กลมแป้น(oblate)	เว้าปลายแหลม(pointed-concave)	กึ่งขนานกับ พื้นดิน	
127) ยินดี	รูปไข่ขอบขนาน(oval-oblong)	เรียวแหลม(acuminate)	แหลม(acute)	กลมแป้น(oblate)	นูนปลายแหลม(pointed-convex)		
128) ลีทอง	ยาวเรียว(linear-oblong)	caudate-acuminate	แหลม(acute)	กลมแป้น(oblate)	แหลม(poited)		
129) ลีพร	ขอบขนาน(oblong)	caudate-acuminate	แหลม(acute)	กลมรี(oval)	นูนปลายแหลม(pointed-convex)		
130) สาวชมเห็ด	รูปไข่ขอบขนาน(oval-oblong)	Acuminate-curve	แหลม(acute)	รูปไข่กลับ(obovate)	นูนปลายแหลม(pointed-convex)		ฟักทอง
131) สาวชมฟักทอง	รูปไข่ขอบขนาน(oval-oblong)	เรียวแหลม(acuminate)	แหลม(acute)	กลมรี(oval)	เว้าปลายแหลม(pointed-concave)		
132) หางสิงห์	ยาวเรียว(linear-oblong)	เรียวแหลม (acuminate)	-	กลมรี(oval)	-		
133) เหยี่ยวทอง	ป้อมกลางใบ (elliptical)	Acuminate-curve	กลมมน(rounded-obtuse)	-	-		ตะเข้
134) ไอ้เข้	ป้อมกลางใบ (elliptical)	cuspidate-acuminate	กลมมน(rounded-obtuse)	กลมรี(oval)	-		
135) อินทรชิต	รูปไข่ขอบขนาน(oval-oblong)	Acuminate-curve	กลมมน(rounded-obtuse)	-	-		
136) อีล่า	รูปไข่ขอบขนาน(oval-oblong)	เรียวแหลม(acuminate)	กลมมน(rounded-obtuse)	กลมรี(oval)	นูนปลายแหลม(pointed-convex)	ปลายกึ่งชี้ลงดิน	
137) อีลึบ	รูปไข่ขอบขนาน(oval-oblong)	caudate-acuminate	แหลม(acute)	ขอบขนาน(oblong)	-		

กลุ่มพันธุ์ สายพันธุ์	ใบ (leaf)			ทรงผล (fruit shape)	หนามผล (fruit spine shape)	ลักษณะพิเศษ	หมายเหตุ
	ทรงใบ(leaf shape)	ปลายใบ(leaf apex)	ฐานใบ(leaf base)				
138) อีชักษ์	รูปไข่ขอบขนาน(oval-oblong)	caudate-acuminate	แหลม(acute)	กลมรี(oval)	-	ผลเล็กเนื้อสี เหลืองคล้ายจำปา	
139) อีหนัก	ป้อมโคนใบ(ovate-lanceolate)	cuspidate-acuminate	กลมมน(rounded-obtuse)	รูปไข่(ovate)	นูนปลายแหลม(pointed-convex)		
140) ทองหยอด	-	-	-	กลมรี(oval)	เว้าปลายแหลม(pointed-concave)		
141) ทองหีบ	ป้อมกลางใบ(elliptical)	แหลมเรียว(acuminate-acute)	กลมมน(rounded-obtuse)	กลม(rounded)	แหลม(pointed)		
142) นมสด	ป้อมปลายใบ(obovate lanceolate)	cuspidate-acuminate	แหลม(acute)	-	-		
143) ฟักข้าว	ป้อมกลางใบ (elliptical)	caudate-acuminate	กลมมน(rounded-obtuse)	กลม(rounded)	เว้าปลายแหลม(pointed-concave)		
144) พื้นเมืองเกาะช้าง	-	-	-	กลมรี(oval)	นูน (convex)		
145) เม็ดในกระดุม	ป้อมโคนใบ(ovate-lanceolate)	แหลมเรียว(acuminate-acute)	แหลม(acute)	กลมรี(oval)	เว้าปลายแหลม(pointed-concave)		
146) เม็ดในก้านยาว	ป้อมโคนใบ(ovate-lanceolate)	เรียวแหลม(acuminate)	แหลม(acute)	กลมรี(oval)	เว้า (concave)		

# การบันทึกลักษณะประจำเชื้อพันธุ์ทุเรียน (Descriptors for Durian)

ฐานข้อมูลเชื้อพันธุ์ทุเรียน ในเอกสารเล่มนี้ได้ทำการบันทึกลักษณะทางด้านสัณฐานวิทยา (morphology) เป็นหลัก ประกอบด้วย ลักษณะรูปร่าง (shape) สี (colour) ขนาด (size) ตลอดจนการบันทึกคุณภาพโดยใช้ประสาทสัมผัส (panel test) และจำนวนนับเชิงปริมาณ เป็นต้น ในการบันทึกลักษณะแต่ละพันธุ์ ลักษณะที่สำคัญ คือ ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics) ซึ่งเป็นลักษณะที่ไม่มีการแปรปรวนไปตามสภาพแวดล้อม และลักษณะทางการเกษตร (agriculture descriptor) ซึ่งเป็นลักษณะอาจที่แปรปรวนไปตามสภาพแวดล้อม แต่บางครั้งจะเป็นลักษณะที่เด่นและสำคัญของพันธุ์นั้น ๆ จึงได้บันทึกไว้ นอกจากนี้บางพันธุ์จะมีข้อมูลในหัวข้อบันทึกเพิ่มเติม (note) ไว้ด้วย ข้อมูลส่วนนี้จะเป็นข้อมูลที่ได้รับมาจากการบอกเล่าของผู้มีประสบการณ์ในการจำแนกพันธุ์ทุเรียน โดยประสบการณ์ซึ่งเป็นเกษตรกรชาวสวนทุเรียนโดยตรง ข้อมูลส่วนใหญ่จะมีภาษาอังกฤษและภาษาลาดินกำกับไว้ด้วยเพื่อการค้นคว้าในภายหลังและเป็นมาตรฐานเดียวกัน สำหรับการบันทึกสี (colour) จะบันทึกเป็นรหัสสีโดยใช้มาตรฐานการเปรียบเทียบสีจากแผ่นเทียบสี RHS (Royal Horticultural Society Colour Chart) ของประเทศอังกฤษ เช่น YG 10 C เป็นต้น อย่างไรก็ตามโครงสร้างการบันทึกลักษณะประจำเชื้อพันธุ์ทุเรียนของกรมวิชาการเกษตรจะประกอบด้วยหัวข้อหลักดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลเบื้องต้น (Passport Data)
2. การบริหารเชื้อพันธุ์ (Management)
3. ลักษณะประจำพันธุ์ (Characterizations)
4. การประเมินผล (Evaluation)
5. รูปภาพประกอบ (Picture)



# ข้อมูลเบื้องต้น

## PASSPORT DATA

ในการจัดทำระบบฐานข้อมูลเชื้อพันธุกรรม การบันทึกข้อมูลเบื้องต้นนับว่าเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก ทั้งนี้เพื่อทราบประวัติของเชื้อพันธุกรรมที่ต้องการจะตรวจสอบและเพื่อการใช้ประโยชน์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรม การแลกเปลี่ยนเชื้อพันธุกรรมทั้งในและต่างประเทศ การขออนุญาตนำเข้าหรือส่งออก ตามกฎ ระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านอนุรักษ์ ด้านคุ้มครองและใช้ประโยชน์จากเชื้อพันธุกรรมและ รวมถึงการขึ้นทะเบียนพันธุกรรม การจดทะเบียนพันธุ์พืชตามกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ เป็นต้น หัวข้อการบันทึก ข้อมูลเบื้องต้นในการตรวจสอบพันธุกรรม มีดังนี้ คือ

### 1. หมายเลข (accession number)

เชื้อพันธุกรรมแต่ละตัวอย่างที่เก็บรวบรวมจะต้องมีรหัสหมายเลขกำกับไว้ทุกตัวอย่างหรือทุกพันธุ์เพื่อสะดวก ในการเรียกใช้ข้อมูลและอ้างอิงข้อมูลในภายหลังได้ ในที่นี้หมายเลขประจำเชื้อพันธุกรรมจะกำหนดไว้เป็นตัวเลข เรียงตามลำดับ เช่น 0001 พันธุ์กบกันเหลือง, 0002 พันธุ์กบกันป่าน เป็นต้น

### 2. ชื่อพันธุ์ (name)

### 3. ชื่อเดิม (former name)

### 4. ชื่อวิทยาศาสตร์ (scientific name) เช่น *Durio zibethinus* Murray. เป็นต้น

### 5. ประวัติพันธุ์ (Information)

5.1 แม่-พ่อพันธุ์ (pedigree) ในที่นี้หมายถึง การผสมพันธุ์เทียมซึ่งเกิดจากการกระทำโดยมนุษย์เท่านั้น (artificial hybrid)

5.2 ความเป็นมา

5.3 วันเดือนปีที่แนะนำ (date) (DDMMYYYY)\*

5.4 ชื่อและที่อยู่สถาบันหรือหน่วยงานที่ผลิตเชื้อพันธุกรรม (name and address of institution)

\* DD หมายถึง เลข 2 หลัก แทน วันที่

MM หมายถึง เลข 2 หลัก แทน เดือน

YY หมายถึง เลข 4 หลัก แทน ปี

### 6. สถานภาพของพันธุ์ (status of sample)

- 6.1 พันธุ์พื้นเมือง (indigenous)
- 6.2 พันธุ์ลูกผสม (artificial hybrids)
- 6.3 พันธุ์ต่างประเทศ (introduction)
- 6.4 อื่นๆ

7. วันเดือนปีที่ได้รับ (acquisition date) (DDMMYYYY)

8. ลักษณะของตัวอย่างที่ได้รับ (type of material received)

- 8.1 เมล็ด (seed)
- 8.2 กิ่งพันธุ์ (scion)
- 8.3 ส่วนขยายพันธุ์พืชในสภาพปลอดเชื้อ (*in vitro*)
- 8.4 อื่นๆ (other) เช่น ต้นพันธุ์ (planting material) โปรตอคอลเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อขยายพันธุ์

9. ปริมาณที่ได้รับ (accession size)

- 9.1 จำนวนนับเชิงปริมาณ (quantity)
- 9.2 จำนวนนับเชิงน้ำหนัก (weight)
- 9.3 ตามภาชนะบรรจุ (packing)

10. หมายเลขอื่นๆ (other number)

- 10.1 หมายเลขเดิมที่เจ้าของเชื้อพันธุ์กำหนดไว้ (donor number)
- 10.2 หมายเลขทะเบียนนำพืช (plant introduction number)
- 10.3 อื่นๆ (other)

11. แหล่งที่มา (source)

- 11.1 ผู้ให้ (donor)
  - ชื่อและที่อยู่ (name and address)
  - วันที่ / เดือน / ปี ที่ได้รับ (date) (DDMMYYYY)
- 11.2 ผู้นำเข้า (importer)
  - ชื่อและที่อยู่ (name and address)
  - วันที่ / เดือน / ปี ที่นำเข้า (date) (DDMMYYYY)
- 11.3 ผู้เก็บตัวอย่าง (collector)
  - ชื่อและที่อยู่ (name and address)
  - วันที่ / เดือน / ปี ที่เก็บตัวอย่าง (date) (DDMMYYYY)

11.4 แหล่งที่มาภายในประเทศ (indigenous source)

- ระบุชื่ออำเภอ / ชื่อจังหวัด

11.5 แหล่งที่มาจากต่างประเทศ (introduction source)

- ระบุชื่อประเทศหรือรหัสประเทศตาม ISO (international standard code for the representation of name of countries)

11.6 ตำแหน่งที่เก็บตัวอย่าง โดยระบุเส้นรุ้งแล้วตามด้วยทิศเหนือหรือใต้

(latitude of collection source)

- ระบุเป็นองศาของเส้นรุ้งด้านทิศเหนือหรือทิศใต้

11.7 ตำแหน่งที่เก็บตัวอย่าง โดยระบุเส้นแวงแล้วตามด้วยทิศเหนือหรือทิศใต้

(longitude of collection source)

- ระบุเป็นองศาของเส้นแวงด้านทิศเหนือหรือทิศใต้

11.8 ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลของสถานที่เก็บตัวอย่าง

(altitude of collection source)

- ระบุเป็นความสูงของพื้นที่เหนือระดับน้ำทะเล (m)

**12. ตัวอย่างสำหรับทำตัวอย่างแห้ง (herbarium specimen)**

**13. ภาพถ่าย (photograph)**

**14. บันทึกเพิ่มเติม (note)**

# การบริหารเชื้อพันธุกรรม

## MANAGEMENT

การบริหารเชื้อพันธุกรรมเป็นการปฏิบัติตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับหลักวิชาการและตามกฎระเบียบและกฎหมายต่างๆ ทั้งนี้เพื่อนำเชื้อพันธุกรรมไปใช้ประโยชน์สูงสุด หัวข้อที่ควรพิจารณาดำเนินการ มีดังนี้คือ

### 1. การกักกันพืชและการขออนุญาต (plant quarantine and permits)

การนำเข้าและส่งออกเชื้อพันธุกรรม (*Durio zibethinus* Murray.) จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และคำสั่งกรมวิชาการเกษตร ที่ 352/2528 เรื่อง ระเบียบการนำเข้าพันธุ์พืชเข้ามาในประเทศไทยและกำหนดแหล่งรวบรวมพันธุ์พืช เป็นต้น

#### 1.1 การนำเข้า (import)

- ใบอนุญาตนำเข้า (import permit) Yes/No
- ใบรับรองปลอดศัตรูพืชจากประเทศต้นทาง (Phytosanitary Certificate) Yes/No
- การป้องกันกำจัดศัตรูพืชทางกักกันพืช (quarantine treatment) Yes/No
- สถานกักพืช (Post Entry Quarantine) Yes/No
- ทะเบียนนำพืช (plant introduction) Yes/No

#### 1.2 การส่งออก (export)

- การป้องกันกำจัดศัตรูพืชทางกักกันพืช (quarantine treatment) Yes/No
- ใบรับรองปลอดศัตรูพืช (Phytosanitary Certificate) Yes/No
- ใบอนุญาตส่งออก (export permit) Yes/No

### 2. การแลกเปลี่ยนพันธุ์ระหว่างประเทศ (exchange of germplasm)

2.1 ให้ปฏิบัติตามระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยหลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนส่วนขยายพันธุ์พืชระหว่างประเทศ พ.ศ. 2531 ซึ่งปริมาณส่วนขยายพันธุ์พืชที่อนุญาตให้แลกเปลี่ยนกับต่างประเทศตามระเบียบดังกล่าวมีเงื่อนไขดังนี้คือ

#### กลุ่มพันธุ์พืชสวน

กิ่งตาดูเรียน	พันธุ์ละ 10 ตา
กิ่งพันธุ์ดูเรียน	พันธุ์ละ 5 ต้น

2.2 หมายเลข (accession number) ที่สามารถแลกเปลี่ยนพันธุ์ (Passport Data I)

- Yes/No

### 3. การเก็บรวบรวมพันธุ์และอนุรักษ์ (collection and conservation)

3.1 แหล่งรวบรวมและอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรม (maintenance site of collection)

- ชื่อและที่อยู่ (name and address) รหัส/code
- ผู้ดูแล (curator) รหัส/code

3.2 วิธีการเก็บรวบรวมและอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรม (methods)

3.2.1 *ex situ* (นอกที่เดิมตามธรรมชาติ)

- แปลงพันธุกรรม (field collection)

รหัส/code

3.2.2 *in vitro* (ส่วนขยายพันธุ์ในสภาพปลอดเชื้อ)

รหัส/code

3.3 หมายเลขที่เก็บรวบรวม (accession number)

(Passport Data 1)

3.4 ปริมาณที่เก็บรวบรวม (collection size)

(Passport Data 5)

3.5 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม (period of collection)

3.6 วิธีการจัดการ (management)


3.6.1 การดูแลรักษา (maintenance and treatment)

3.6.2 อื่นๆ (other)


4. การนำไปใช้ประโยชน์ (economic use)

5. บันทึกเพิ่มเติม (note)


การทำมุมกับลำต้น (Crotch angle of primary branching)



มุมตั้งฉาก (right angle)




มุมแคบ (ยักชัน) (narrowed)




มุมกว้าง (wide)


# รูปร่างของใบ (Leaf shape)




ป้อมปลายใบ (obovate-lanceolate)




รูปไข่ขอบขนาน (oval-oblong)




ป้อมโคนใบ (ovate-lanceolate)



ขอบขนาน (oblong)






ยาวเรียว (linear-oblong)



ป้อมกลางใบ (elliptical)



ปลายใบ (Leaf apex)



เรียวแหลม (acuminate)

แหลมเรียว (acuminate-acute)

caudate-acuminate




cuspidate-acuminate


acuminate-curve




ฐานใบ (Leaf base)




กลมมน (rounded-obtuse)



มน (obtuse)



แหลม (acute)



เว้า (cuneate-acute)

## รูปร่างดอกตูม (Flower shape at preblossom stage)




รูปรี (elliptic)



กลมรีขอบขนาน (oval-oblong)



ขอบขนาน (oblong)



กลม (rounded)



รูปไข่กลับ (obovate)




รูปไข่ (ovate)



กลมรี (oval)

## ปลายดอกตูม (Flower apex)



แหลม (acute)



กลม (rounded)



มน (obtuse)


รูปร่าง (Fruit shape)



กลมแบน (oblate)




กลม (rounded)



กลมรี (oval)




รูปรี (elliptic)




รูปไข่กลับ (obovate)



รูปไข่ (ovate)




ทรงกระบอก (cylindroidal)




ขอบขนาน (oblong)


## ปลายผล (Fruit apex)



แหลม (pointed)




แบน (flattened)




บุ๋ม (depressed)

## ฐานผล (Fruit base)




แบน (flattened)




บุ๋ม (depressed)

รูปร่างก้านผล (Peduncle shape)



เจียบ (uniform)



ขอบวงแหวน (funnel)









นูนมาก (taper)





นูนน้อย (lip)


**รูปร่างหนามผล (Fruit spine shape)**

		
หนูปปลายแหลม (pointed-convex)	โค้งงอ (hooked)	เว้าปลายแหลม (pointed-concave)
		
นูน (convex)	แหลม (pointed)	เว้า (concave)


**หนามผลรอบจุดศูนย์กลางบริเวณปลายผล  
(Fruit spine at the center point of distal)**

	
มีหนาม (present)	ไม่มีหนาม (absent)

หนามปลายผล (Fruit spine apex)




หนามงุ้มเข้า (hooked spine)




หนามตรง (vertical spine)

หนามรอบขั้วผล (Proximal spine)



หนามงุ้มเข้า (hooked)



หนามตรง (vertical)

รายชื่อพันธุ์ทุเรียนไทย

Accession Number	ชื่อพันธุ์ (ไทย)	ชื่อพันธุ์ (อังกฤษ)
00001	กบก้านเหลือง	Kop Kanlueang
00002	กบก้นปาน	Kop Konpan
00003	กบแก้ว	Kop Kaeo
00004	กบงู	Kop Ngu
00005	กบจำปา / กบแข็งสิงห์	Kop Champa (Kop khaengsing)
00006	กบเจ้าคุณ	Kop Chaokhun
00007	กบชมพู	Kop Chomphu
00008	กบชายน้ำ	Kop Chainam
00009	กบช่อนกลิ่น / ช่อนกลิ่น	Kop Sonklin (Sonklin)
00010	กบตาขำ	Kop Takham
00011	กบตาแจ่ม	Kop Tachaem
00012	กบตาเต่า	Kop Tathao
00013	กบตาท้วม / กบดำ	Kop Tathuam (Kop dam)
00014	กบตานวล	Kop Tanuan
00015	กบตานุช	Kop Tanut
00016	กบตาปุ่น	Kop Tapun
00017	กบตาเป็น	Kop Tapen
00018	กบตามาก	Kop Tamak
00019	กบตามิตร	Kop Tamit
00020	กบตาแมน	Kop Tamaen
00021	กบตาโห้	Kop Taho
00022	กบทองก้อน / ทองก้อน	Kop Thongkon (Thongkon)
00023	กบทองคำ / ทองคำ	Kop Thongkam (Thongkam)
00024	กบทองดี	Kop Thongdi
00025	กบทองเพ็ง / ทองเพ็ง	Kop Thongpheng (Thongpheng)
00026	กบธีระ	Kop Thira
00027	กบเบา	Kop Bao
00028	กบพลเทพ	Kop Phonthep
00029	กบพวง	Kop Phuang
Accession Number	ชื่อพันธุ์ (ไทย)	ชื่อพันธุ์ (อังกฤษ)



00030	กบพิกุล	Kop Phikun
00031	กบมังกร	Kop Mangkon
00032	กบแม่เต่า	Kop Maethao
00033	กบรัสมี่	Kop Ratsami
00034	กบราชเนตร	Kop Ratchanet
00035	กบลำเจียก / ลำเจียก	Kop Lamchiak (Lumchiak)
00036	กบเล็บเหยี่ยว	Kop Lep-yiao
00037	กบวัดกล้วย	Kop Watklual
00038	กบวัดเพลง	Kop Watphleng
00039	กบไว	Kop Wai
00040	กบสาวน้อย / กบก้านสั้น	Kop Saonoi (Kop Kansan)
00041	กบสีนาค	Kop Si-nak
00042	กบสุวรรณ	Kop Suwan
00043	กบหน้าศาล	Kop Nasan
00044	กบหลังวิหาร	Kop Langwihan
00045	กบหัวล้าน	Kop Hualan
00046	กระดุมทอง / กระดุม	Kradum Thong (Kradum)
00047	กระดุมสีนาค	Kradum Si-nak
00048	กระปุกทอง / กระปุกทองดี	Krapuk Thong (Krapuk Thongdi)
00049	กระโปรงทอง	Kraprongthong
00050	กลีบสมุทร	Klip Sa-mut
00051	ก้อนทอง / ทองก้อน	Konthong (Thongkon)
00052	กะเทยข้าวสั้น	Kathoei Khuasan
00053	กะเทยเนื้อขาว	Kathoei Nueakhao
00054	กะเทยเนื้อแดง	Kathoei Nueadaeng
00055	กะเทยเนื้อเหลือง	Kathoei Nuealueang
00056	ก้านยาว	Kanyao
00057	ก้านยาวใบด่าง	Kanyao Baidang
00058	ก้านยาวพวง	Kanyao Phuang
00059	ก้านยาววัดสัก / เหลืองประเสริฐ	Kanyao Watsak (Lueangprasoet)

Accession Number	ชื่อพันธุ์ (ไทย)	ชื่อพันธุ์ (อังกฤษ)
00060	ก้านยาวสีนาค	Kanyao Si-nak
00061	ก้านสั้น / สาวน้อยเรื่อนงาม	Kansan (Saonoi Rueanngam)
00062	การะเกด	Karaket
00063	กำป็นเดิม / กำป็นขาว	Kampan Doem (Kampan Khao)
00064	กำป็นแดง / กำป็นดำ	Kampan Daeng (Kampan Dam)
00065	กำป็นเนื้อเหลือง / เจ้ากรม	Kampan Nuealueang (Chaokrom)
00066	กำป็นตาเฟ่ง	Kampan Taphang
00067	กำป็นบางสีทอง	Kampan Bangsithong
00068	กำป็นพวง	Kampan Phuang
00069	ขุนทอง	Khunthong
00070	เขียวดำลิ่ง	Khiaotamlueng
00071	จอกลอย	Chok-loi
00072	จำปา	Champa
00073	ฉัตร	Chat
00074	ฉัตรสีทอง	Chat Sithong
00075	ฉัตรสีนาค	Chat Si-nak
00076	ชมพูปาน	Chomphu Phan
00077	ชมพูศรี	Chomphu Sri
00078	ชะนี	Chani
00079	ชะนีก้านยาว	Chani Kanyao
00080	ชะนีกิ่งม้วน	Chani Kingmuan
00081	ชะนีน้ำตาลทราย	Chani Namtansai
00082	ชายมะไฟ	Chai Mafai
00083	ชายมังกุด	Chai Mangkhut
00084	ดาวกระจาย	Daokrachai
00085	แดงข้างเขียน	Daeng Changkhian
00086	แดงตาน้อย	Daeng Tanoi
00087	แดงตาเพื่อน	Daeng Taphuean
00088	แดงรัศมี	Daeng Ratsami
00089	แดงสาวน้อย	Daeng Saonoi

Accession Number	ชื่อพันธุ์ (ไทย)	ชื่อพันธุ์ (อังกฤษ)
00090	ตันใหญ่	Tonyai
00091	ตอสามเส้า	Tosamsao
00092	ตะโก (ทองแดง)	Tako (Thongdaeng)
00093	ตะพานน้ำ	Taphapnam
00094	คุ่มทอง	Tumthong
00095	ทศพิน	Totsapin
00096	ทองคำตาพรวด / ทองคำพรวด	Thongkam Tapruat (Thongkam Pruat)
00097	ทองนพคุณ	Thongnoppakun
00098	ทองม้วน	Thongmuan
00099	ทองย้อยฉัตร	Thongyoichat
00100	ทองย้อยเดิม	Thongyoidoem
00101	ทองสุก	Thongsuk
00102	ทองหยอด	Thongyot
00103	ทองหยิบ	Thongyip
00104	ทองใหม่	Thongmai
00105	ทับทิม	Taptim
00106	ธรณีไหว	Thoraniwai
00107	นกกกระจิบ	Nokkrachip
00108	นกหยิบ	Nokyip
00109	นมสด	Nomsot
00110	นมสวรรค์	Nomsawan
00111	เนือหนา	Nueana
00112	บางขุนนนท์	Bangkhunnon
00113	บาตรทองคำ / อีบาตร	Batthongkam (E-bat)
00114	โบราณ	Boran
00115	ปิ่นทอง	Pinthong
00116	เป็ดถบ	Petthop
00117	ฝอยทอง	Foithong
00118	พวงฉัตร	Phuang Chat
00120	พวงมาลัย	Phuang Malai
00119	พวงมณี	Phuang Mani

Accession Number	ชื่อพันธุ์ (ไทย)	ชื่อพันธุ์ (อังกฤษ)
00122	ฟักข้าว	Fakkhao
00123	มดแดง	Motdaeng
00124	มะนาว	Ma-nao
00125	เมื่อดในกระดุม	Metnai Kradum
00126	เมื่อดในกำยาน	Metnai Kanyao
00127	เมื่อดในกำป็น	Metnai Kampan
00128	เมื่อดในบางขุนนนท์	Metnai Bangkhunnon
00129	เมื่อดในยายปราง	Metnai Yaiprang
00130	เมื่อดในหลวง	Metnai Luang
00131	เมื่อดพงษ์พันธุ์	Malet Phongphan
00132	เมื่อดเฟียน	Malet Phian
00133	เมื่อดลับแล	Malet Lap-lae
00134	เมื่อดสม	Malet Som
00135	เมื่อดอารีย์	Malet Ar-ri
00136	ย่ามแม่หวาด	Yammaewat
00137	ย่ามหวาด	Yammawat
00138	ยินดี	Yindi
00139	หลวงทอง	Luang Thong
00140	หลวงเพาะเมื่อด	Luang Pomalet
00141	หลวงมะรุม	Luang Marum
00142	ลุงเกตุ	Lungket
00143	ลุงไหล	Lunglai
00144	ลูกหนัก	Luknak
00145	สาเก	Sa-ke
00146	สายหยุด	Saiyut
00147	สาวชมฟักทอง / ฟักทอง	Saochom Fakthong (Fakthong)
00148	สาวชมเห็ด	Saochomhet
00149	สาวใหญ่	Saoyai
00150	สีทอง	Sithong
00151	สีเทา / นายฉลวย / หอยโข่ง	Sithao (Naichaluai / Hoikhong)
00152	สีไพร	Siprai

Accession Number	ชื่อพันธุ์ (ไทย)	ชื่อพันธุ์ (อังกฤษ)
00153	หมอนข้าง	Monkhang
00154	หมอนเดิม	Mondoem
00155	หมอนทอง	Monthong
00156	หมอนละอองฟ้า	Monla-ongfa
00157	หลงลับแล	Longlap-lae
00158	หลินลับแล	Linlap-lae
00159	หางสิงห์	Hangsing
00160	ห้าลูกไม่ถึงฝัว	Halukmaithuengphua
00161	เหมราช	Hemmarat
00162	เห-รา	He-ra
00163	เหรียญทอง	Rianthong
00164	เหลืองทอง	Lueangthong
00165	อินทราชิต	Inthorachit
00166	อิงอน	E-ngon
00167	อีทุย	E-tui
00168	อีักษ์	E-yak
00169	อีล่า / อีหนัก	E-la (E-nak)
00170	อีลิปนายทิพย์	E-lipnaitip
00171	อีลิป	E-lip
00172	อีอิ่ง	E-eueng
00173	ไอ้เข้ / ตะเข้	Eaikhe (Ta-khe)

แหล่งรวบรวมพันธุ์ทุเรียนในความรับผิดชอบกรมวิชาการเกษตรที่มีการบันทึกข้อมูลอยู่  
 ในฐานข้อมูล เชื้อพันธุ์พืช สำนักคุ้มครองพันธุ์พืชแห่งชาติ

สถานที่รวบรวมพันธุ์ทุเรียน	ชื่อพันธุ์ทุเรียนที่รวบรวม
<p>ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี                      ต. ตะปอน อ.ขลุง                      จ. จันทบุรี                      โทร (039) 397-030                      (039) 397-076</p>	<p>กบงู กบเจ้าคุณ กบชายน้ำ กช่อนกลั่น กบดำ กบตาขำ กบทองดำ                      กบตาท้วม กบทองคำ กบธีระ กบเบา กบมังกร กบแม่เต่า กบรัศมี                      กบเล็บเหยี่ยว กบวัดกล้วย กบสีนวล กบสุวรรณ กบหน้าศาล                      กบหลังวิหาร กบหัวล้าน กระจุมทอง กะเทยข้าวสั้น กะเทยเนื้อขาว                      กะเทยเนื้อแดง กะปุกทองดี กล้วย ก้านยาว ก้านยาววัดสัก                      ก้านยาวสีนาค ก้านสั้น กำป็นขาว กำป็นดำ กำป็นตาเฟง                      กำป็นบางสีทอง กำป็นพลวง กำป็นเหลือง ก้อนทอง                      ขุนทอง ขุนนนท์ เขียวดำลิ่ง                      จอกลอย จำปา จำปาใน                      ฉัตรสีทอง ชมพูบาน ชมพูศรี ชะนี ชะนี ชะรียน้ำตาลทราย ชายมะไฟ                      ชายมังกุด                      ดาวกระจาย แดงสาวน้อย                      ตะพานน้ำ ต้นใหญ่                      ทองย้อยฉัตร ทองย้อยเดิม ทองม้วน ทองหีบ ทองใหม่ ทับทิม                      ธรณีไหว                      นกหีบ นมสด นมสวรรค์                      ปิ่นทอง ฝอยทอง พวงมณี มดแดง เม็ดในกระจุม เม็ดในก้านยาว ย่อม                      แม่หวาด ยินดี                      ลวงทอง ลวง ลูกเกตุ ลิ้ม                      สาวชมเห็ด                      หมอนทอง หางสิงห์                      อีทุย</p> <p>ที่มา : รายงานผลการดำเนินการโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพืช สมุนไพร                      พืชเมืองและจุลินทรีย์ ปี 2540-2544 สถาบันวิจัยพืชสวน</p>

ชื่อพันธุ์ กบก้านเหลือง (Kop Kanleuang)

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* Murray

ประวัติ แหล่งที่ค้นพบ จ.นนทบุรี

สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง

#### ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) **ไม่เป็นระเบียบ (not orderly)** ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) **ยาวเรียว (linear-oblong)** ปลายใบ (leaf apex) **เรียวแหลม (acuminate)** ฐานใบ (leaf base) **กลมมน (rounded-obtuse)** หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) **โค้งงอ (hooked)**

#### ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) **เร็ว** การออกดอก (flowering) **มาก (abundant)** การติดผล (fruit setting) **ปานกลาง (intermediate)** ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้ 15 ปี (fruit bearing) **100-120 ผล** ฤดูกาลเก็บเกี่ยว (harvesting season) **ตรงฤดูภาค (season)**

#### บันทึกเพิ่มเติม (notes)

---

---

---

ชื่อพันธุ์ กบแก้ว (Kop Kaeo)

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* Murray

ประวัติ แหล่งที่ค้นพบ จ.นนทบุรี

สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง

#### ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) **ไม่เป็นระเบียบ (not orderly)** ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) **ป้อมกลางใบ (elliptical)** ปลายใบ (leaf apex) **เรียวแหลม (acuminate)** ฐานใบ (leaf base) **เรียว (cauneate-acute)** หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) **โค้งงอ (hooked)**

#### ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) **เร็ว** การออกดอก (flowering) **มาก (abundant)** การติดผล (fruit setting) **ปานกลาง (intermediate)** ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้ 15 ปี (fruit bearing) **100-120 ผล** ฤดูกาลเก็บเกี่ยว (harvesting season) **ตรงฤดูภาค (season)** อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) **100-110 วัน**

#### บันทึกเพิ่มเติม (notes)

---

---

---





ชื่อพันธุ์	กบจำปา (Kop Cham pa) หรือ กบแข็งสิงห์ (Gob Khaengsing)
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Durio zibethinus</i> Murray
ประวัติ	แหล่งที่ค้นพบ จ.นนทบุรี จ.ระยอง
สถานภาพพันธุ์	พันธุ์พื้นเมือง

#### ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) **ไม่เป็นระเบียบ (not orderly)** ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) **ป้อมกลางใบ (elliptical)** ปลายใบ (leaf apex) **เรียวแหลม (acuminate)** ฐานใบ (leaf base) **กลมมน (acute)** ดอก (flower) รูปร่างของดอกตูม (flower shape at preblossom stage) **กลมรีขอบขนาน (oval-oblong)** ปลายดอกตูม (flower apex) **มน (obtuse)** ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) **ทรงรี (elliptic)** ปลายผล (fruit apex) **แหลม (pointed)** ลักษณะฐานผล (fruit base) **ป้าน (flattened)** ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) **ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร** รูปร่างก้านผล (fruit peduncle shape) **ขอบนูน (lip)** หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) **แหลม (pointed)** หนามผลรอบจุดศูนย์กลางบริเวณปลายผล (fruit spine at the center point of distal) **ไม่มีหนาม (absent)** หนามปลายผล (fruit spine apex) **หนามตรง (vertical spine)** หนามรอบขั้วผล (proximal spine) **หนามตรง (vertical)**

#### ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) **เร็ว** การออกดอก (flowering) **มาก (abundant)** การติดผล (fruit setting) **มาก (abundant)** น้ำหนักผล (fruit weight) **1.93 กิโลกรัม** กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) **มีกลิ่นอ่อน (mild)** รสชาติของเนื้อ (taste) **หวานมันพอดี** ลักษณะของเนื้อ (fruit texture) **ปานกลาง (intermediate)** เส้นใยในเนื้อ (fibre) **มี (present)** ปริมาณน้ำในเนื้อ (fruit juiciness) **ปานกลาง (intermediate)** ฤดูกาลผลิต (fruiting season) **ตรงฤดูกาล (season)**

#### บันทึกเพิ่มเติม (notes)

---

ชื่อพันธุ์	กบเจ้าคุณ (Kop Chaokhunun)
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Durio zibethinus</i> Murray
ประวัติ	เพาะจากเมล็ดกบแม่เต่า แหล่งที่ค้นพบ บางกอกน้อย ดลิ่งชัน กรุงเทพฯ
สถานภาพพันธุ์	พันธุ์พื้นเมือง

#### ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) **ไม่เป็นระเบียบ (not orderly)** ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) **ป้อมกลางใบ (elliptical)** ปลายใบ (leaf apex) **เรียวแหลม (acuminate)** ฐานใบ (leaf base) **แหลม (acute)** ดอก (flower) รูปร่างของดอกตูม (flower shape at preblossom stage) **กลมรีขอบขนาน (oval-oblong)** ปลายดอกตูม (flower apex) **มน (obtuse)**

#### ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors)

#### บันทึกเพิ่มเติม (notes)

---

ชื่อพันธุ์	กบชมพู่ (Kop Chomphu)
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Durio zibethinus</i> Murray
ประวัติ	เพาะจากเมล็ดกบ แหล่งที่ค้นพบ จ.ปราจีนบุรี
สถานภาพพันธุ์	พันธุ์พื้นเมือง

ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) **ไม่เป็นระเบียบ (not orderly)** ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) **รูปไข่ขอบขนาน (oval-oblong)** ปลายใบ (leaf apex) **เรียวแหลม (acuminate)** ฐานใบ (leaf base) **แหลม (acute)** ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) **กลมแป้น (oblate)** ปลายผล (fruit apex) **ป้าน (flattened)** ลักษณะฐานผล (fruit base) **ป้าน (flattened)** ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) **ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร** รูปร่างก้านผล (fruit peduncle shape) **ขอบนูน (lip)** หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) **แหลม (pointed)** หนามผลรอบจุดศูนย์กลางบริเวณปลายผล (fruit spine at the center point of distal) **ไม่มีหนาม (absent)** หนามปลายผล (fruit spine apex) **หนามตรง (vertical spine)** หนามรอบขั้วผล (proximal spine) **หนามงุ้มเข้า (hooked)**

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) **เร็ว** การออกดอก (flowering) **มาก (abundant)** การติดผล (fruit setting) **ปานกลาง (intermediate)** ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้ 15 ปี (fruit bearing) **100-120 ผล** ฤดูกาลผลิต (fruiting season) **ตรงฤดูกาล (season)** อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) **100-110 วัน**

บันทึกเพิ่มเติม (notes)

---



---



---

ชื่อพันธุ์	กบชายน้ำ (Kop Chainam)
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Durio zibethinus</i> Murray
ประวัติ	เพาะจากเมล็ดกบ แหล่งที่ค้นพบ จ.นนทบุรี จ.จันทบุรี
สถานภาพพันธุ์	พันธุ์พื้นเมือง

#### ลักษณะประจําพันธุ์ (characteristics)


การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) **ไม่เป็นระเบียบ (not orderly)** ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) **รูปไข่ขอบขนาน (oval-oblong)** ปลายใบ (leaf apex) **เรียวแหลม (acuminate)** ฐานใบ (leaf base) **มน (obtuse)** ดอก (flower) รูปร่างของดอกตูม (flower shape at preblossom stage) **กลมรีขอบขนาน (oval-oblong)** ปลายดอกตูม (flower apex) **แหลม (acute)** ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) **รูปไข่ (ovate)** ปลายผล (fruit apex) **บุ๋ม (depressed)** ลักษณะฐานผล (fruit base) **ป้าน (flattened)** ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) **ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร** รูปร่างก้านผล (fruit peduncle shape) **ขอบนูน (lip)** หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) **นูน (convex)** หนามผลรอบจุดศูนย์กลางบริเวณปลายผล (fruit spine at the center point of distal) **ไม่มีหนาม (absent)** หนามปลายผล (fruit spine apex) **งุ้มเข้า (hooked spine)** หนามรอบหัวผล (proximal spine) **หนามตรง (vertical)**

#### ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) **เร็ว** การออกดอก (flowering) **มาก (abundant)** การติดผล (fruit setting) **ปานกลาง (intermediate)** ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้ 15 ปี (fruit bearing) **100-120 ผล** กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) **มีกลิ่นอ่อน (mild)** รสชาติของเนื้อ (taste) **หวานมันพอดี** ลักษณะของเนื้อ (fruit texture) **ละเอียด (fine)** เส้นใยในเนื้อ (fibre) **ไม่มี (absent)** ปริมาณน้ำในเนื้อ (fruit juiciness) **ปานกลาง (intermediate)** ฤดูกาลผลิต (fruiting season) **ตรงฤดูกาล (season)**

#### บันทึกเพิ่มเติม (notes)

ทรงผลมีรูปทรงที่ไม่เป็นระเบียบแต่พู่เห็นเด่นชัด ปลายผลหรือก้านผลบุ๋ม หนามผลไม่เป็นระเบียบ หนามคมและแข็ง มีฐาน (โคน) หนามผลใหญ่ พันธุ์นี้เป็นพันธุ์เปลือกหนาและแข็ง ปอกเปลือกยาก ก้านผลใหญ่และแข็ง ก้านผลโปน (นูน) เนื้อมีสีเหลือง เนื้อละเอียด รสชาติหวาน ลักษณะเด่นของพันธุ์นี้คือ เป็นพันธุ์ที่ชอบน้ำมาก ชอบขึ้นใกล้น้ำ ทนฝน ไม่มีอาการไส้ซึม ฝนตกเมล็ดไม่แกร็นปลูก พันธุ์นี้ต้องได้รับน้ำสม่ำเสมอตลอดปี



ชื่อพันธุ์ กบซ่อนกลิ่น (Kop Sonklin)

หรือ ซ่อนกลิ่น (Sonklin)

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* Murray

สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง

#### ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) **ป้อมปลายใบ (obovate-lanceolate)** ปลายใบ (leaf apex) **เรียวแหลม (acuminate)**  
ฐานใบ (leaf base) **แหลม (acute)** ดอก (flower) รูปร่างของดอกตูม (flower shape at preblossom stage) **รี (elliptical)** ปลายดอก  
ตูม (flower apex) **แหลม (acute)** ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) **รูปไข่กลับ (obovate)** ปลายผล (fruit apex) **แหลม (pointed)**  
ลักษณะฐานผล (fruit base) **ป้าน (flattened)** ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) **ปานกลาง (medium)** 5-11 เซนติเมตร  
หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) **ขอบนูน (lip)** หนามผลรอบจุดศูนย์กลางบริเวณปลายผล (fruit spine  
at the center point of distal) **มีหนาม (present)** หนามปลายผล (fruit spine apex) **หนามตรง (vertical spine)** หนามรอบหัวผล  
(proximal spine) **หนามงุ้มเข้า (hooked)**

#### ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors)


การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) **ปานกลาง (intermediate)** การออกดอก (flowering) **ปานกลาง (intermediate)**  
เส้นใยในเนื้อ (fibre) **มี (present)** ปริมาณน้ำในเนื้อ (fruit juiciness) **น้อย (scarce)**

#### บันทึกเพิ่มเติม (notes)

---

---

---



ชื่อพันธุ์	กบตาขำ (Kop Takham)
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Durio zibethinus</i> Murray
ประวัติ	เพาะจากเมล็ดกบแม่เต่าเกิดที่ ต. ร้าง บางกรวย
แหล่งที่ค้นพบ	จันทบุรี จ.ระยอง และ จ. ปราจีนบุรี
สถานภาพพันธุ์	พันธุ์พื้นเมือง


#### ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) **ไม่เป็นระเบียบ (not orderly)** ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) **ป้อม โคนใบ (ovate-lanceolate)** ปลายใบ (leaf apex) **acuminate-curve** ฐานใบ (leaf base) **กลมมน (rounded-obtuse)** ดอก (flower) รูปร่างของดอกตูม (flower shape at preblossom stage) **กลมรี (oval)** ปลายดอกตูม (flower apex) **แหลม (acute)** ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) **รูปไข่ (ovate)** ปลายผล (fruit apex) **บุ๋ม (depressed)** ลักษณะฐานผล (fruit base) **ป้าน (flattened)** ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) **ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร** รูปร่างก้านผล (fruit peduncle shape) **ขอบนูน (lip)** หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) **เว้าปลายแหลม (pointed-concave)** หนามผลรอบจุดศูนย์กลางบริเวณปลายผล (fruit spine at the center point of distal) **ไม่มีหนาม (absent)** หนามปลายผล (fruit spine apex) **หนามงุ้มเข้า (hooked spine)** หนามรอบขั้วผล (proximal spine) **หนามงุ้มเข้า (hooked)**

#### ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) **เร็ว** การออกดอก (flowering) **มาก (abundant)** การติดผล (fruit setting) **มาก (abundant)** ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้ 15 ปี (fruit bearing) **100-120 ผล** ความยาวผล **23 เซนติเมตร** ความกว้างผล **22 เซนติเมตร** เส้นรอบวงผล **64 เซนติเมตร** น้ำหนักผล (fruit weight) **0.35 กิโลกรัม** ความกว้างปากปลิง **1.75 เซนติเมตร** ความยาวจากขั้วผลถึงปากปลิง **7 เซนติเมตร** น้ำหนักเนื้อต่อผล (flesh weight) **370 กรัม** ความหนาเนื้อ (flesh thickness) **1.95 เซนติเมตร** สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) **YO 18 A** กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) **มีกลิ่นแรง (strong)** รสชาติของเนื้อ (taste) **หวานมันพอดี** ลักษณะของเนื้อ (fruit texture) **ละเอียด (fine)** เส้นใยในเนื้อ (fibre) **ไม่มี (absent)** ปริมาณน้ำในเนื้อ (fruit juiciness) **ปานกลาง (intermediate)** น้ำหนักเปลือก (shell weight) **1,440 กรัม** ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกว้าง (width) **3.03 เซนติเมตร** ความยาว **5.44 เซนติเมตร** น้ำหนักเมล็ด (weight of stone) **170 กรัม** ฤดูกาลผลิต (fruiting season) **ตรงฤดูกาล (season)** อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) **132 วัน**

#### บันทึกเพิ่มเติม (notes)



ชื่อพันธุ์ กบตาแจ่ม (Kop Tachaem)

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* Murray

ประวัติ เกิดจากการเพาะเมล็ด  
แหล่งที่ค้นพบ จ.จันทบุรี

สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง

#### ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) **ไม่เป็นระเบียบ (not orderly)** ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) **รูปไข่ขอบขนาน (oval-oblong)** ปลายใบ (leaf apex) **เรียวแหลม (acuminate)** ฐานใบ (leaf base) **มน (obtuse)** ดอก (flower) รูปร่างของดอกตูม (flower shape at preblossom stage) **กลมรี (oval)** ปลายดอกตูม (flower apex) **แหลม (acute)** ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) **กลมแป้น (oblate)** ปลายผล (fruit apex) **ป้าน (flattened)** ลักษณะฐานผล (fruit base) **ป้าน (flattened)** ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) **สั้น (short)** น้อยกว่า 5 เซนติเมตร รูปร่างก้านผล (fruit peduncle shape) **ขอบวงแหวน (funnel)** หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) **นูนปลายแหลม (pointed-convex)** หนามผลรอบจุดศูนย์กลางบริเวณปลายผล (fruit spine at the center point of distal) **ไม่มีหนาม (absent)** หนามปลายผล (fruit spine apex) **หนามตรง (vertical spine)** หนามรอบขั้วผล (proximal spine) **หนามตรง (vertical)**

#### ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) **เร็ว** การออกดอก (flowering) **มาก (abundant)** การติดผล (fruit setting) **มาก (abundant)** ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้ 15 ปี (fruit bearing) **100 ผล** ความยาวผล **24 เซนติเมตร** ความกว้างผล **22 เซนติเมตร** เส้นรอบวงผล **64.68 เซนติเมตร** น้ำหนักผล (fruit weight) **0.31 กิโลกรัม** ความกว้างปากปลิง **2.23 เซนติเมตร** ความยาวจากขั้วผลถึงปากปลิง **5.26 เซนติเมตร** น้ำหนักเนื้อต่อผล (flesh weight) **600 กรัม** ความหนาเนื้อ (flesh thickness) **2.08 เซนติเมตร** สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) **YO 16 D** กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) **มีกลิ่นอ่อน (mild)** รสชาติของเนื้อ (taste) **มันมากกว่าหวาน** ลักษณะของเนื้อ (fruit texture) **ละเอียด (fine)** เส้นใยในเนื้อ (fibre) **ไม่มี (absent)** ปริมาณน้ำในเนื้อ (fruit juiciness) **ปานกลาง (intermediate)** น้ำหนักเปลือก (shell weight) **2,030 กรัม** สีเปลือกผลสุก (skin colour of ripe fruit) **Y 147 C** จำนวนเมล็ดดิบ/เมล็ดเต็ม **-/100** ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกว้าง (width) **2.86 เซนติเมตร** ความยาว **4.73 เซนติเมตร** น้ำหนักเมล็ด (weight of stone) **70 กรัม** ฤดูกาลผลิต (fruiting season) **ตรงฤดูกาล (season)**

#### บันทึกเพิ่มเติม (notes)

---

---

---

ชื่อพันธุ์ กบตาเต่า (Kop Tathao)  
ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* Murray  
ประวัติ เกิดจากการเพาะเมล็ดกบ  
แหล่งที่ค้นพบ จ.จันทบุรี จ.ระยอง  
สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง

#### ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) **ไม่เป็นระเบียบ (not orderly)** ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) **รูปไข่ขอบขนาน (oval-oblong)** ปลายใบ (leaf apex) **acuminate-curve** ฐานใบ (leaf base) **กลมมน (rounded-obtuse)** ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) **กลมรี (oval)** ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) **ปานกลาง (intermediate)** หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) **โค้งงอ (hooked)**

#### ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) **เร็ว** การออกดอก (flowering) **มาก (abundant)** การติดผล (fruit setting) **ปานกลาง (intermediate)** กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) **มีกลิ่นอ่อน (mild)** รสชาติของเนื้อ (taste) **มันมากกว่าหวาน** ลักษณะของเนื้อ (fruit texture) **ปานกลาง (intermediate)** เส้นใยในเนื้อ (fibre) **มี (present)** ปริมาณน้ำในเนื้อ (fruit juiciness) **ปานกลาง (intermediate)**

#### บันทึกเพิ่มเติม (notes)

---

---

---

ชื่อพันธุ์ กบตาท้วม (Kop Tathuam) หรือ กบดำ (Kop dam)

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* Murray

ประวัติ เกิดจากการเพาะเมล็ดกบ

แหล่งที่ค้นพบ สวนนายพ่าย วัฒนา จ. จันทบุรี

สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง

#### ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) **ไม่เป็นระเบียบ (not orderly)** ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) **ป้อมกลางใบ (elliptical)** ปลายใบ (leaf apex) **เรียวแหลม (acuminate)** ฐานใบ (leaf base) **แหลม (acute)** ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) **รูปรี (elliptical)** ปลายผล (fruit apex) **ป้าน (flattened)** ลักษณะฐานผล (fruit base) **ป้าน (flattened)** ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) **ปานกลาง (medium)** 5-11 เซนติเมตร รูปร่างก้านผล (fruit peduncle shape) **ขอบนูน (lip)** หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) **นูนปลายแหลม (pointed-convex)** หนามผลรอบจุดศูนย์กลางบริเวณปลายผล (fruit spine at the center point of distal) **มีหนาม (present)** หนามปลายผล (fruit spine apex) **หนามตรง (vertical spine)** หนามรอบขั้วผล (proximal spine) **หนามตรง (vertical)**

#### ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) **เร็ว** การออกดอก (flowering) **มาก (abundant)** การติดผล (fruit setting) **ปานกลาง (intermediate)** ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้ 15 ปี (fruit bearing) **100-120 ผล** ความยาวผล **22.24 เซนติเมตร** ความกว้างผล **17 เซนติเมตร** เส้นรอบวงผล **56.04 เซนติเมตร** น้ำหนักผล (fruit weight) **2.38 กิโลกรัม** ความกว้างปากปลิง **2.47 เซนติเมตร** ความยาวจากขั้วผลถึงปากปลิง **5.37 เซนติเมตร** น้ำหนักเนื้อต่อผล (flesh weight) **510 กรัม** ความหนาเนื้อ (flesh thickness) **1.51 เซนติเมตร** สีเนื้อผลดิบ (flesh colour of mature green fruit) **YOG 16 B** กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) **มีกลิ่นอ่อน (mild)** รสชาติของเนื้อ (taste) **หวานมันพอดี** ลักษณะของเนื้อ (fruit texture) **ละเอียด (fine)** เส้นใยในเนื้อ (fibre) **ไม่มี (absent)** ปริมาณน้ำในเนื้อ (fruit juiciness) **ปานกลาง (intermediate)** น้ำหนักเปลือก (shell weight) **1,250 กรัม** สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) **YG 146 C** จำนวนเมล็ดดิบ/เมล็ดเต็ม **69/31** ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกว้าง (width) **2 เซนติเมตร** ความยาว **5.16 เซนติเมตร** น้ำหนักเมล็ด (weight of stone) **110 กรัม**

#### บันทึกเพิ่มเติม (notes)





ชื่อพันธุ์ กบตานวล (Kop Tanuan)  
ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* Murray  
ประวัติ แหล่งที่ค้นพบ จ. จันทบุรี  
สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง

ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไม่เป็นระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) รูปไข่  
ขอบขนาน (oval-oblong) ปลายใบ (leaf apex) acuminate-curve ฐานใบ (leaf base) กลมมน (rounded-obtuse) หนามผล (fruit  
spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) โค้งงอ (hooked)

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล (fruit setting) ปาน  
กลาง (intermediate) ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตรงฤดูกาล (season) อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) 100-110 วัน  
บันทึกเพิ่มเติม (notes)

---

---

---

ชื่อพันธุ์ กบตานุช (Kop Tanut)  
ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* Murray  
ประวัติ แหล่งที่ค้นพบ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ  
สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง

ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไม่เป็นระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) รูปไข่  
ขอบขนาน (oval-oblong) ปลายใบ (leaf apex) acuminate-curve ฐานใบ (leaf base) กลมมน (rounded-obtuse) หนามผล (fruit  
spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) โค้งงอ (hooked)

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล (fruit setting) ปาน  
กลาง (intermediate) ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้ 15 ปี (fruit bearing) 100-120 ผล ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตรงฤดูกาล  
(season) อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) 100-110 วัน  
บันทึกเพิ่มเติม (notes)

---

---

---

ชื่อพันธุ์	กบตาปุ่น (Kop Tapun)
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Durio zibethinus</i> Murray
ประวัติ	แหล่งที่ค้นพบ จ. จันทบุรี และ จ.นนทบุรี
สถานภาพพันธุ์	พันธุ์พื้นเมือง

#### ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)


การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) **ไม่เป็นระเบียบ (not orderly)** ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) **รูปไข่ขอบขนาน (oval-oblong)** ปลายใบ (leaf apex) **เรียวแหลม (acuminate)** ฐานใบ (leaf base) **กลมมน (obtusate)** ดอก (flower) รูปร่างของดอกตูม (flower shape at preblossom stage) **ไข่กลับ (obovate)** ปลายดอกตูม (flower apex) **แหลม (acute)** ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) **กลม (oval)** ปลายผล (fruit apex) **บุ๋ม (depressed)** ลักษณะฐานผล (fruit base) **บุ๋ม (depressed)** ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) **ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร**

#### ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) **เร็ว** การออกดอก (flowering) **มาก (abundant)** การติดผล (fruit setting) **มาก (abundant)** ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้ 15 ปี (fruit bearing) **70 ผล** ความยาวผล **22.24 เซนติเมตร** ความกว้างผล **21.30 เซนติเมตร** เส้นรอบวงผล **58.6 เซนติเมตร** น้ำหนักผล (fruit weight) **3.09 กิโลกรัม** ความกว้างปากปลิง **1.97 เซนติเมตร** ความยาวจากขั้วผลถึงปากปลิง **5.21 เซนติเมตร** น้ำหนักเนื้อต่อผล (flesh weight) **650 กรัม** ความหนาเนื้อ (flesh thickness) **6.12 เซนติเมตร** สีเนื้อผลสุก (flesh colour of mature ripe fruit) **YO 13 C** กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) **มีกลิ่นอ่อน (mild)** รสชาติของเนื้อ (taste) **มันมากกว่าหวาน** ลักษณะของเนื้อ (fruit texture) **ละเอียด (fine)** เส้นใยในเนื้อ (fibre) **มี (present)** ปริมาณน้ำในเนื้อ (fruit juiciness) **ปานกลาง (intermediate)** น้ำหนักเปลือก (shell weight) **2,047 กรัม** สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) **YG 152 ABC** จำนวนเมล็ดดิบ/เมล็ดเต็ม **23/77** ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกว้าง (width) **3.78 เซนติเมตร** ความยาว **5.47 เซนติเมตร** น้ำหนักเมล็ด (weight of stone) **239 กรัม** ฤดูกาลผลิต (fruiting season) **ตรงฤดูกาล (season)**

#### บันทึกเพิ่มเติม (notes)

ทุเรียนพันธุ์นี้ทรงพุ่มแข็งแรง ทรงพุ่มเป็นฉัตร ใบขนาดใหญ่หนาและสีเขียวเข้มผลแก่จัดมีสีเหลืองรสชาติหวานเล็กน้อยกลิ่นหอมหวานเนื้อละเอียดเหนียวนุ่ม



ชื่อพันธุ์ กบตามาก (Kop Tamak)  
ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* Murray  
ประวัติ แหล่งที่ค้นพบ จ.นนทบุรี  
สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง

ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไม่เป็นระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) รูปไข่  
ขอบขนาน (oval-oblong) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ฐานใบ (leaf base) กลมมน (obtuse) หนามผล (fruit  
spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) โค้งงอ (hooked)

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล (fruit setting) ปาน  
กลาง (intermediate) ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้ 15 ปี (fruit bearing) 100-120 ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตรงฤดูกาล (season)  
อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) 100-110 วัน

บันทึกเพิ่มเติม (notes)

---

---

---

ชื่อพันธุ์ กบตามิตร (Kop Tamit)  
ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* Murray  
ประวัติ แหล่งที่ค้นพบ จ.นนทบุรี  
สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง

ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไม่เป็นระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) ป้อม  
กลางใน (elliptical) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ฐานใบ (leaf base) กลมมน (obtuse) หนามผล (fruit spine)  
รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) โค้งงอ (hooked)

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล (fruit setting) ปาน  
กลาง (intermediate) ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้ 15 ปี (fruit bearing) 100-120 ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตามฤดูกาล (season)  
อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) 100-110 วัน

บันทึกเพิ่มเติม (notes)

---

---

---

ชื่อพันธุ์ กบตาแม่น้ (Kop Tamaen)

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* Murray

สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง

#### ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) **ไม่เป็นระเบียบ (not orderly)** ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) **ป้อมกลางใบ (elliptical)** ปลายใบ (leaf apex) **เรียวแหลม (acuminate)** ฐานใบ (leaf base) **มน (obtus)** หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) **โค้งงอ (hooked)**

#### ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) **เร็ว** การออกดอก (flowering) **มาก (abundant)** การติดผล (fruit setting) **ปานกลาง (intermediate)** ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้ 15 ปี (fruit bearing) **100-120 ผล** ฤดูกาลผลติ (fruiting season) **ตรงฤดูกาล (season)** อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) **100-110 วัน**

#### บันทึกเพิ่มเติม (notes)

---

ชื่อพันธุ์ กบตาไห้ (Kop Taho)

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* Murray

ประวัติ แหล่งที่ค้นพบ จ. จันทบุรี

จ.ระยอง จ. ปราจีนบุรี

สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง

#### ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) **ไม่เป็นระเบียบ (not orderly)** ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) **รูปไข่ขอบขนาน (oval-oblong)** ปลายใบ (leaf apex) **โค้ง (acuminate-curve)** ฐานใบ (leaf base) **มน (obtus)** ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) **กลมรี (oval)** ปลายผล (fruit apex) **ป้าน (flattened)** ลักษณะฐานผล (fruit base) **ป้าน (flattened)** ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) **ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร** หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) **โค้งงอ (hooked)**

#### ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) **เร็ว** การออกดอก (flowering) **มาก (abundant)** การติดผล (fruit setting) **มาก (abundant)** ความยาวผล **20.08 เซนติเมตร** ความกว้างผล **18.43 เซนติเมตร** เส้นรอบวงผล **58.05 เซนติเมตร** น้ำหนักผล (fruit weight) **2.05 กิโลกรัม** ความกว้างปากปลิง **2.23 เซนติเมตร** ความยาวจากขั้วผลถึงปากปลิง **5.21 เซนติเมตร** น้ำหนักเนื้อต่อผล (flesh weight) **370 กรัม** ความหนาเนื้อ (flesh thickness) **1.4 เซนติเมตร** สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) **YO 15 D** กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) **มีกลิ่นอ่อน (mild)** รสชาติของเนื้อ (taste) **หวานมันพอดี** ลักษณะของเนื้อ (fruit texture) **ละเอียด (fine)** เส้นใยในเนื้อ (fibre) **มี (present)** ปริมาณน้ำในเนื้อ (fruit juiciness) **ปานกลาง (intermediate)** น้ำหนักเปลือก (shell weight) **1,600 กรัม** สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) **YG 148 C** จำนวนเมล็ดดิบ/เมล็ดเต็ม **60/40** ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกว้าง (width) **2.76 เซนติเมตร** ความยาว **4.23 เซนติเมตร** รูปทรงของเมล็ด (shape of stone) **ขอบขนาน (oblong)** น้ำหนักเมล็ด (weight of stone) **80 กรัม** ฤดูกาลผลติ (fruiting season) **ตรงฤดูกาล (season)**

#### บันทึกเพิ่มเติม (notes)

---

ชื่อพันธุ์ กบทองก้อน (Kop Thongkon)  
หรือ ทองก้อน (Thongkon)

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* Murray

ประวัติ เกิดจากการเพาะเมล็ดกบ  
แหล่งที่ค้นพบ จ. จันทบุรี

สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง

#### ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) **ไม่เป็นระเบียบ (not orderly)** ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) **ไข่ขอบขนาน (oval-oblong)** ปลายใบ (leaf apex) **เรียวแหลม (acuminate)** ฐานใบ (leaf base) **มน (obtuse)** ดอก (flower) รูปร่างของดอกตูม (flower shape) **กลมรี (oval)** ปลายดอกตูม (flower apex) **แหลม (acute)** ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) **รูปไข่กลับ (obovate)** ปลายผล (fruit apex) **แหลม (pointed)** ลักษณะฐานผล (fruit base) **ป้าน (flattened)** ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) **ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร** รูปร่างก้านผล (fruit peduncle shape) **ขอบมน (lip)** หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) **เว้าปลายแหลม (pointed-concave)** หนามผลรอบจุดศูนย์กลางบริเวณปลายผล (fruit spine at the center point of distal) **ไม่มีหนาม (absent)** หนามปลายผล (fruit spine apex) **หนามตรง (vertical spine)** หนามรอบขั้วผล (proximal spine) **หนามตรง (vertical)**

#### ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) **เร็ว** การออกดอก (flowering) **มาก (abundant)** การติดผล (fruit setting) **มาก (abundant)** ความยาวผล **23.28 เซนติเมตร** ความกว้างผล **20.96 เซนติเมตร** เส้นรอบวงผล **68.65 เซนติเมตร** น้ำหนักผล (fruit weight) **4.2 กิโลกรัม** ความกว้างปากปลิง **2.58 เซนติเมตร** ความยาวจากขั้วผลถึงปากปลิง **6.77 เซนติเมตร** น้ำหนักเนื้อต่อผล (flesh weight) **1,640 กรัม** ความหนาเนื้อ (flesh thickness) **9.97 เซนติเมตร** สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) **YO 20 B** กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) **มีกลิ่นอ่อน (mild)** รสชาติของเนื้อ (taste) **หวานมันพอดี** ลักษณะของเนื้อ (fruit texture) **หยาบ (coarse)** เส้นใยในเนื้อ (fibre) **ไม่มี (absent)** ปริมาณน้ำในเนื้อ (fruit juiciness) **ปานกลาง (intermediate)** น้ำหนักเปลือก (shell weight) **2,210 กรัม** สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) **YG 148 A** จำนวนเมล็ดดิบ/เมล็ดเต็ม **40/60** ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกว้าง (width) **3.11 เซนติเมตร** ความยาว **5.56 เซนติเมตร** รูปทรงของเมล็ด (shape of stone) **ขอบขนาน (oblong)** น้ำหนักเมล็ด (weight of stone) **340 กรัม** ฤดูกาลผลิต (fruiting season) **ตรงฤดูกาล (season)**

#### บันทึกเพิ่มเติม (notes)

---

---

---

ชื่อพันธุ์ กบทองคำ (Kop Thongkam)

หรือ ทองคำ (Thongkam)


ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* Murray

ประวัติ แหล่งที่ค้นพบ จ. จันทบุรี

จ.ระยอง จ.ปราจีนบุรี

สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง

ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)



การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) **ไม่เป็นระเบียบ (not orderly)** ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) **ยาวเรียว (linear-oblong)** ปลายใบ (leaf apex) **caudate-acuminate** ฐานใบ (leaf base) **มน (obtus)** ดอก (flower) รูปร่างของดอกตูม (flower shape) **กลมรี (oval)** ปลายดอกตูม (flower apex) **แหลม (acute)** ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) **กลมรี (oval)** ปลายผล (fruit apex) **บุ๋ม (depressed)** ลักษณะฐานผล (fruit base) **บุ๋ม (depressed)** ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) **ปานกลาง (medium)** 5-11 เซนติเมตร รูปร่างก้านผล (fruit peduncle shape) **ขอบนูน (lip)** หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) **เว้า (concave)** หนามผลรอบจุดศูนย์กลางบริเวณปลายผล (fruit spine at the center point of distal) **มีหนาม (present)** หนามปลายผล (fruit spine apex) **หนามตรง (vertical spine)** หนามรอบขั้วผล (proximal spine) **หนามงุ้มเข้า (hooked)**

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) **เร็ว** การออกดอก (flowering) **มาก (abundant)** การติดผล (fruit setting) **มาก (abundant)** ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้ 15 ปี (fruit bearing) **100 ผล** ความยาวผล **23.1 เซนติเมตร** ความกว้างผล **21.02 เซนติเมตร** เส้นรอบวงผล **66 เซนติเมตร** น้ำหนักผล (fruit weight) **2.87 กิโลกรัม** ความกว้างปากปลิง **2.16 เซนติเมตร** ความยาวจากขั้วผลถึงปากปลิง **9.31 เซนติเมตร** น้ำหนักเนื้อต่อผล (flesh weight) **726 กรัม** ความหนาเนื้อ (flesh thickness) **1.06 เซนติเมตร** สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) **Y 13 B** กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) **มีกลิ่นอ่อน (mild)** รสชาติของเนื้อ (taste) **หวานมันพอดี** ลักษณะของเนื้อ (fruit texture) **ละเอียด (fine)** เส้นใยในเนื้อ (fibre) **ไม่มี (absent)** ปริมาณน้ำในเนื้อ (fruit juiciness) **ปานกลาง (intermediate)** น้ำหนักเปลือก (shell weight) **1,890 กรัม** สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) **YG 152 A** ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกว้าง (width) **3.5 เซนติเมตร** ความยาว **5.47 เซนติเมตร** รูปทรงของเมล็ด (shape of stone) **ขอบขนาน (oblong)** น้ำหนักเมล็ด (weight of stone) **252 กรัม** ฤดูกาลผลิต (fruiting season) **ตรงฤดูกาล (season)**

บันทึกเพิ่มเติม (notes)

ชื่อพันธุ์ กบทองดี (Kop Thongdi)

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* Murray

ประวัติ แหล่งที่ค้นพบ จ.ระยอง

สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง

ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors)

บันทึกเพิ่มเติม (notes)

ชื่อพันธุ์ กบทองเพ็ง (Kop Thongpheng)  
หรือ ทองเพ็ง (Thongpheng)

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* Murray

ประวัติ แหล่งที่ค้นพบ จ.ระยอง

สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง

#### ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) **ไม่เป็นระเบียบ (not orderly)** ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) **รูปไข่ขอบขนาน (oval-oblong)** ปลายใบ (leaf apex) **เรียวแหลม (acuminate)** ฐานใบ (leaf base) **กลมมน (rounded-obtuse)** ดอก (flower) รูปร่างของดอกตูม (flower shape) **ขอบขนาน (oblong)** ปลายดอกตูม (flower apex) **มน (obtuse)** ผล (fruit) หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) **โค้งงอ (hooked)**

#### ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) **เร็ว** การออกดอก (flowering) **มาก(abundant)** การติดผล (fruit setting) **ปานกลาง (intermediate)** ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้ 15 ปี (fruit bearing) **100-120 ผล** ฤดูกาลผลิต (fruiting season) **ตรงฤดูกาล (season)** อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) **100-110 วัน**

#### ลักษณะพิเศษ (notes)

---

---

---

ชื่อพันธุ์ กบธีระ (Kop Thira)

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* Murray

ประวัติ แหล่งที่ค้นพบ จ. จันทบุรี

จ.ระยอง จ.ปราจีนบุรี

สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง

#### ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) **ป้อมปลายใบ (obovate-lanceolate)** ปลายใบ (leaf apex) **caudateacuminate** ฐานใบ (leaf base) **แหลม (acute)**

#### ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) **เร็ว** การออกดอก (flowering) **มาก(abundant)** การติดผล (fruit setting) **มาก (abundant)** ฤดูกาลผลิต (fruiting season) **ตรงฤดูกาล (season)** อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) **120 วัน**

#### บันทึกเพิ่มเติม (notes)

---

---

---

ชื่อพันธุ์	กบเบา (Kop Bao)
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Durio zibethinus</i> Murray
ประวัติ	เพาะจากเมล็ดกบ แหล่งที่ค้นพบ จ. จันทบุรี จ.ระยอง
สถานภาพพันธุ์	พันธุ์พื้นเมือง

#### ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) **ไม่เป็นระเบียบ (not orderly)** ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) **รูปไข่ขอบขนาน (oval-oblong)** ปลายใบ (leaf apex) **เรียวแหลม (acuminate)** ดอก (flower) รูปร่างของดอกตูม (flower shape) **กลมรี (oval)** ปลายดอกตูม (flower apex) **กลม (rounded)** ผล (fruit) รูปร่างก้านผล (fruit peduncle shape) **ขอบนูน (lip)** หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) **นูนปลายแหลม (pointed-convex)** หนามผลรอบจุดศูนย์กลางบริเวณปลายผล (fruit spine at the center point of distal) **ไม่มีหนาม (absent)** หนามรอบขั้วผล (proximal spine) **หนามงุ้มเข้า (hooked)**

#### ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) **เร็ว** การออกดอก (flowering) **มาก (abundant)** การติดผล (fruit setting) **มาก (abundant)** ความยาวผล **20.26 เซนติเมตร** ความกว้างผล **17.68 เซนติเมตร** เส้นรอบวงผล **55.13 เซนติเมตร** น้ำหนักผล (fruit weight) **1.93 กิโลกรัม** ความกว้างปากปลิง **2.06 เซนติเมตร** ความยาวจากขั้วผลถึงปากปลิง **4.03 เซนติเมตร** น้ำหนักเนื้อต่อผล (flesh weight) **760 กรัม** ความหนาเนื้อ (flesh thickness) **1.46 เซนติเมตร** สีเนื้อผลดิบ (flesh colour of ripe fruit) **YG 10 C** กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) **มีกลิ่นอ่อน (mild)** รสชาติของเนื้อ (taste) **หวานมันพอดี** ลักษณะของเนื้อ (fruit texture) **ละเอียด (fine)** เส้นใยในเนื้อ (fibre) **ไม่มี (absent)** ปริมาณน้ำในเนื้อ (fruit juiciness) **ปานกลาง (intermediate)** น้ำหนักเปลือก (shell weight) **1,070 กรัม** สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) **YG 147 C** จำนวนเมล็ดต่อบ่อต่อเมล็ดเต็ม **69/31** ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกว้าง (width) **3.14 เซนติเมตร** ความยาว **5.84 เซนติเมตร** รูปร่างของเมล็ด (shape of stone) **ขอบขนาน (oblong)** น้ำหนักเมล็ด (weight of stone) **140 กรัม** ฤดูกาลผลิต (fruiting season) **ตรงฤดูกาล (season)**

#### บันทึกเพิ่มเติม (notes)

ทรงผลเป็นทรงกระบอก ลักษณะพูเห็นไม่เด่นชัด น้ำหนักผลเฉลี่ยประมาณ 2.5 กิโลกรัม ปลายผลป้านทั้งหัวและท้าย และมีขนาดใกล้เคียง สีเปลือกมีสีเขียวเข้ม ร่องหนามมีสีน้ำตาลแซม ลักษณะเด่นของพันธุ์นี้คือ มีลักษณะหนามคู่ตรงบริเวณกลางพูเป็นยาวหัวท้าย และเป็นพันธุ์สุกเร็ว





ชื่อพันธุ์	กบพลเทพ (Kop Phonthep)
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Durio zibethinus</i> Murray
ประวัติ	เจ้าคุณพลเทพเป็นคนเพาะเมล็ด แหล่งที่ค้นพบ จ. จันทบุรี จ.ระยอง จ.ปราจีนบุรี
สถานภาพพันธุ์	พันธุ์พื้นเมือง

#### ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) **ไม่เป็นระเบียบ (not orderly)** ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) **รูปไข่ขอบขนาน (oval-oblong)** ปลายใบ (leaf apex) **เรียวแหลม (acuminate)** ดอก (flower) รูปร่างของดอกตูม (flower shape) **กลม (rounded)** ปลายดอกตูม (flower apex) **แหลม (acute)** ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) **กลม (rounded)** ปลายผล (fruit apex) **ป้าน (flattened)** ลักษณะฐานผล (fruit base) **ป้าน (flattened)** ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) **ปานกลาง (medium)** 5-11 เซนติเมตร รูปร่างก้านผล (fruit peduncle shape) **ขอบนูน (lip)** หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) **โค้งงอ (hooked)** หนามผลรอบจุดศูนย์กลางบริเวณปลายผล (fruit spine at the center point of distal) **ไม่มีหนาม (absent)** หนามปลายผล (fruit spine apex) **หนามตรง (vertical spine)** หนามรอบขั้วผล (proximal spine) **หนามงุ้มเข้า (hooked)**

#### ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) **เร็ว** การออกดอก (flowering) **มาก (abundant)** การติดผล (fruit setting) **มาก (abundant)** ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้ 15 ปี (fruit bearing) **100-120 ผล** ฤดูกาลผลิต (fruiting season) **ตรงฤดูกาล (season)**

#### บันทึกเพิ่มเติม (notes)

ชื่อพันธุ์	กบพวง (Kop Phuang)
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Durio zibethinus</i> Murray
ประวัติ	แหล่งที่ค้นพบ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ
สถานภาพพันธุ์	พันธุ์พื้นเมือง



#### ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)


การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) **ไม่เป็นระเบียบ (not orderly)** ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) **ยาวเรียว (linear-oblong)** ปลายใบ (leaf apex) **caudate-acuminate** ฐานใบ (leaf base) **เรียว (cauneateacute)** ดอก (flower) รูปร่างของดอกตูม (flower shape) **รี (elliptic)** ปลายดอกตูม (flower apex) **แหลม (acute)** ผล (fruit) หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) **โค้งงอ (hooked)**

#### ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) **เร็ว** การออกดอก (flowering) **มาก (abundant)** การติดผล (fruit setting) **ปานกลาง (intermediate)** ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้ 15 ปี (fruit bearing) **100-120 ผล** ฤดูกาลผลิต (fruiting season) **ตรงฤดูกาล (season)**

#### บันทึกเพิ่มเติม (notes)

ชื่อพันธุ์	กบแม่เต่า (Kop Maethao)
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Durio zibethinus</i> Murray
ประวัติ	เพาะจากเมล็ดการะเกดแม่เต่า แหล่งที่ค้นพบ จ. นนทบุรี จ.จันทบุรี จ.ระยอง
สถานภาพพันธุ์	พันธุ์พื้นเมือง



### ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) **ไม่เป็นระเบียบ (not orderly)** ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) **ป้อมกลางใบ (elliptical)** ปลายใบ (leaf apex) **acuminate-curve** ฐานใบ (leaf base) **กลมมน (rounded obtuse)** ดอก (flower) รูปร่างของดอกตูม (flower shape) **กลมรี (oval)** ปลายดอกตูม (flower apex) **มน (obtuse)** ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) **กลมรี (oval)** ปลายผล (fruit apex) **ป้าน (flattened)** ลักษณะฐานผล (fruit base) **ป้าน (flattened)** ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) **ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร** รูปร่างก้านผล (fruit peduncle shape) **ขอบนูน (lip)** หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) **โค้งงอ (hooked)** หนามผลรอบจุดศูนย์กลางบริเวณปลายผล (fruit spine at the center point of distal) **มีหนาม (present)** หนามปลายผล (fruit spine apex) **หนามตรง (vertical spine)** หนามรอบขั้วผล (proximal spine) **หนามจุ่มเข้า (hooked)**

### ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) **เร็ว** การออกดอก (flowering) **มาก (abundant)** การติดผล (fruit setting) **มาก (abundant)** ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้ 15 ปี (fruit bearing) **100-120 ผล** ความยาวผล **24.05 เซนติเมตร** ความกว้างผล **20.5 เซนติเมตร** เส้นรอบวงผล **64 เซนติเมตร** น้ำหนักผล (fruit weight) **2.5 กิโลกรัม** ความกว้างปากปลิง **1.7 เซนติเมตร** ความยาวจากขั้วผลถึงปากปลิง **4.5 เซนติเมตร** น้ำหนักเนื้อต่อผล (flesh weight) **730 กรัม** ความหนาเนื้อ (flesh thickness) **0.63 เซนติเมตร** สีเนื้อผลดิบ (flesh colour of mature green fruit) **Y OG 22 B** กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) **มีกลิ่นอ่อน (mild)** รสชาติของเนื้อ (taste) **หวานมันพอดี** ลักษณะของเนื้อ (fruit texture) **หยาบ (coarse)** เส้นใยในเนื้อ (fibre) **ไม่มี (present)** ปริมาณน้ำในเนื้อ (fruit juiciness) **น้อย (scarce)** น้ำหนักเปลือก (shell weight) **1,600 กรัม** สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) **GN 199 B** ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกว้าง (width) **5.57 เซนติเมตร** ความยาว **5.75 เซนติเมตร** รูปทรงของเมล็ด (shape of stone) **ขอบขนาน (oblong)** น้ำหนักเมล็ด (weight of stone) **252 กรัม** ฤดูกาลผลิต (fruiting season) **ตรงฤดูกาล (season)** อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) **132 วัน**

### บันทึกเพิ่มเติม (notes)

ทรงผลทรงกลม ปลายผลแหลมกว่าด้านขั้วผล หนามผลแหลมยาว หนามตรงกลางพุ่มีร่อง การสุกของผลช้า ทนต่อสภาพดิน ฟ้า อากาศ ชอบน้ำ ผิวเปลือกบาง รสชาติหวานมันจัด เนื้อแห้ง ละเอียดย นับว่าเป็นพันธุ์เศรษฐกิจพันธุ์หนึ่ง

ชื่อพันธุ์	กบพิกุล (Kop PiKun)
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Durio zibethinus</i> Murray
ประวัติ	เป็นทุเรียนพันธุ์ใหม่ แหล่งที่ค้นพบ จ.นนทบุรี
สถานภาพพันธุ์	พันธุ์พื้นเมือง

ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) **ไม่เป็นระเบียบ (not orderly)** ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) **ป้อมกลางใบ (elliptical)** ปลายใบ (leaf apex) **เรียวแหลม (acuminate)** ฐานใบ (leaf base) **กลมมน (rounded-obtuse)** ดอก (flower) รูปร่างของดอกตูม (flower shape) **ขอบขนาน (oblong)** ปลายดอกตูม (flower apex) **แหลม (acute)** ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) **กลมรี (oval)** ปลายผล (fruit apex) **บุ๋ม (depressed)** ลักษณะฐานผล (fruit base) **กลมแป้น (oblate)** ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) **ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร** รูปร่างก้านผล (fruit peduncle shape) **ขอบมน (lip)** หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) **แหลม (pointed)** หนามผลรอบจุดศูนย์กลางบริเวณปลายผล (fruit spine at the center point of distal) **มีหนาม (present)** หนามปลายผล (fruit spine apex) **หนามตรง (vertical spine)** หนามรอบขั้วผล (proximal spine) **หนามงุ้มเข้า (hooked)**

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) **เร็ว** การออกดอก (flowering) **มาก (abundant)** การติดผล (fruit setting) **มาก (abundant)** ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้ 15 ปี (fruit bearing) **100-120 ผล** รสชาติของเนื้อ (taste) **หวานมันพอดี** ลักษณะของเนื้อ (fruit texture) **ละเอียด (fine)** เส้นใยในเนื้อ (fibre) **มี (present)** ปริมาณน้ำในเนื้อ (fruit juiciness) **น้อย (scarce)** ฤดูกาลผลิต (fruiting season) **ตรงฤดูกาล (season)**

บันทึกเพิ่มเติม (notes)

---



---




---



---

ชื่อพันธุ์	กบรัสมี่ (Kop Ratsami)
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Durio zibethinus</i> Murray
ประวัติ	เพาะจากเมล็ดกบ แหล่งที่ค้นพบ จ.จันทบุรี
สถานภาพพันธุ์	จ.ระยอง พันธุ์พื้นเมือง



### ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching)

ไม่เป็นระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) ขอบขนาน (oblong) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ฐานใบ (leaf base) มน (obtus) ดอก (flower) รูปร่างของดอกตูม (flower shape) ขอบขนาน (oblong) ปลายดอกตูม (flower apex) มน (obtus) ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) รูปไข่กลับ (obovate) ปลายผล (fruit apex) ป้าน (flattened) ลักษณะฐานผล (fruit base) ป้าน (flattened) ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร รูปร่างก้านผล (fruit peduncle shape) ขอบนูน (lip) หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) โค้งงอ (hooked) หนามผลรอบจุดศูนย์กลางบริเวณปลายผล (fruit spine at the center point of distal) มีหนาม (present) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนามตรง (vertical spine) หนามรอบขั้วผล (proximal spine) หนามงุ้มเข้า (hooked)

### ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล (fruit setting) มาก (abundant) ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้ 15 ปี (fruit bearing) 100 ความยาวผล 24 เซนติเมตร ความกว้างผล 20 เซนติเมตร เส้นรอบวงผล 63 เซนติเมตร น้ำหนักผล (fruit weight) 2.73 กิโลกรัม ความกว้างปากปลิง 1.95 เซนติเมตร ความยาวจากขั้วผลถึงปากปลิง 6.94 เซนติเมตร น้ำหนักเนื้อต่อผล (flesh weight) 659 กรัม ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 1.23 เซนติเมตร สีเนื้อผลดิบ (flesh colour of mature green fruit) Y O16B,C กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) มีกลิ่นอ่อน (mild) รสชาติของเนื้อ (taste) หวานมันพอดี ลักษณะของเนื้อ (fruit texture) ละเอียด (fine) เส้นใยในเนื้อ (fibre) ไม่มี (present) ปริมาณน้ำในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate) น้ำหนักเปลือก (shell weight) 1,889 กรัม สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) YG 16 B,C น้ำหนักเมล็ด (weight of stone) 182 กรัม ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตรงฤดูกาล (season) อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) 115 วัน

### บันทึกเพิ่มเติม (notes)

ทุเรียนพันธุ์นี้ ทรงต้นแข็งแรงเมื่อต้นมีอายุมากจะมีเปลือกเป็นสะเก็ด กิ่งแผ่ยื่นขนานพับพื้น บางกิ่งย้อยลงในดิน ใบหนา ยาวรีโคนใบมีลักษณะมน ผลทุเรียนพันธุ์นี้จะมีลักษณะรูปทรงใหญ่กลม มีสีเขียวเข้มหนามถี่ สีเขียวเข้ม รสชาติของทุเรียนพันธุ์นี้จะหวานมัน กลิ่นเนื้อหอม เนื้อละเอียด

ชื่อพันธุ์ กบราชนेत्र (Kop Ratchanet)

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* Murray

ประวัติ แหล่งที่ค้นพบ จ.ระยอง

สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง

ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) **ไม่เป็นระเบียบ (not orderly)** ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) **ป้อมกลางใบ (elliptical)** ปลายใบ (leaf apex) **เรียวแหลม (acuminate)** ฐานใบ (leaf base) **กลมมน (rounded obtuse)** หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) **โค้งงอ (hooked)**

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) **เร็ว** การออกดอก (flowering) **มาก (abundant)** การติดผล (fruit setting) **มาก (abundant)** ฤดูกาลผลิต (fruiting season) **ตรงฤดูกาล (season)** อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) **100-110 วัน**

บันทึกเพิ่มเติม (notes)

---

---

---

ชื่อพันธุ์ กบลำเจียก (Kop Lumchiak)

หรือลำเจียก (Lumchiak)

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* Murray

ประวัติ แหล่งที่ค้นพบสวนนายชอง ศศิผลิน

อ. บางกอกน้อย กรุงเทพฯ

สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง

ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching)

**ไม่เป็นระเบียบ (not orderly)** ใบ (leaf) รูปร่างของใบ

(leaf shape) **รูปไข่ขอบขนาน (oval – oblong)** ปลายใบ (leaf apex) **เรียวแหลม (acuminate)** ฐานใบ (leaf base) **แหลม (acute)**

ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) **กลมรี (oval)** ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) **ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร**

รูปร่างก้านผล (fruit peduncle shape) **ขอบนูน (lip)** หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) **นูนปลายแหลม**

(pointed convex)

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors)

---

---

---

บันทึกเพิ่มเติม (notes)

---

---

---



ชื่อพันธุ์ กบเล็บเหยี่ยว (Kop Leb-yiao)

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* Murray

ประวัติ เพาะจากเมล็ดกบแม่เต่า  
แหล่งที่ค้นพบ จ. จันทบุรี

สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง

#### ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) **ไม่เป็นระเบียบ (not orderly)** การทำมุมกับลำต้น **มุมกว้าง (width) ใบบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) ข้อมปลายใบ (obovate-lanceolate) ปลายใบ (leaf apex) acuminate-curve** ฐานใบ

(leaf base) **แหลม (acute)** ดอก (flower) รูปร่างของดอกตูม (flower shape) **กลมรี (oval)** ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) **กลมรี (oval)** ปลายผล (fruit apex) **ป้าน (flattened)** ลักษณะฐานผล (fruit base) **นูน (depressed)** ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) **ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร** รูปร่างก้านผล (fruit peduncle shape) **ขอบนูน (lip)** หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) หนามผลรอบจุดศูนย์กลางบริเวณปลายผล (fruit spine at the center point of distal) **มีหนาม (present)** หนาม


ปลายผล (fruit spine apex) **หนามงุ้มเข้า (hooked spine)** หนามรอบขั้วผล (proximal spine) **หนามงุ้มเข้า (hooked)**

#### ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) **เร็ว** การออกดอก (flowering) **มาก (abundant)** การติดผล (fruit setting) **มาก (abundant)** ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้ 15 ปี (fruit bearing) **100-120 ผล** ความยาวผล **26.5 เซนติเมตร** ความกว้างผล **20.5 เซนติเมตร** เส้นรอบวงผล **64.5 เซนติเมตร** น้ำหนักผล (fruit weight) **2.8 กิโลกรัม** ความกว้างปากปลิง **1.63 เซนติเมตร** ความยาวจากขั้วผลถึงปากปลิง **8.2 เซนติเมตร** น้ำหนักเนื้อต่อผล (flesh weight) **790 กรัม** ความหนาเนื้อ (flesh thickness) **1.22 เซนติเมตร** สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) **GO 170 D** กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) **มีกลิ่นอ่อน (mild)** รสชาติของเนื้อ (taste) **มันมากกว่าหวาน** ลักษณะของเนื้อ (fruit texture) **หยาบ (coarse)** เส้นใยในเนื้อ (fibre) **มี (present)** ปริมาณน้ำในเนื้อ (fruit juiciness) **น้อย (scarce)** น้ำหนักเปลือก (shell weight) **1,800 กรัม** สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) **GG 195 A** ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกว้าง (width) **2.23 เซนติเมตร** ความยาว **5.33 เซนติเมตร** รูปทรงของเมล็ด (shape of stone) **ขอบขนาน (oblong)** สีของเมล็ด (stone colour) **GOG 164 A** น้ำหนักเมล็ด (weight of stone) **210 กรัม** ฤดูกาลผลิต (fruiting season) **ตรงฤดูกาล (season)** อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) **132 วัน**

#### บันทึกเพิ่มเติม (notes)

เป็นพันธุ์ที่มีเนื้อคุณภาพเหมือนกบแม่เต่าทุกอย่าง แต่มีขนาดผลที่ใหญ่กว่า หนามผลมีหนามคู่ตรงบริเวณกลางพู ปลายหนามงุ้มเข้าหากัน เหมือนเล็บเหยี่ยว



ชื่อพันธุ์	กบวัดกล้วย (Kop Watklual)
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Durio zibethinus</i> Murray
ประวัติ	เพาะจากเมล็ดกบ แหล่งที่ค้นพบ จ. จันทบุรี จ.ระยอง จ.ปราจีนบุรี
สถานภาพพันธุ์	พันธุ์พื้นเมือง

#### ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) **ไม่เป็นระเบียบ (not orderly)** ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) **ขอบขนาน (oblong)** ปลายใบ (leaf apex) **caudate-acuminate** ฐานใบ (leaf base) **แหลม (acute)** ดอก (flower) รูปร่างของดอกตูม (flower shape) **กลมรี (oval)** ปลายดอกตูม (flower apex) **แหลม (acute)** ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) **กลมแป้น (oblate)** ปลายผล (fruit apex) **แหลม (pointed)** ลักษณะฐานผล (fruit base) **แบน (flattened)** ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) **ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร** รูปร่างก้านผล (fruit peduncle shape) **ขอบนูน (lip)** หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) **โค้งงอ (hooked)** หนามผลรอบจุดศูนย์กลางบริเวณปลายผล (fruit spine at the center point of distal) **ไม่มีหนาม (absent)** หนามปลายผล (fruit spine apex) **หนามตรง (vertical spine)** หนามรอบขั้วผล (proximal spine) **หนามตรง (hooked)**

#### ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) **เร็ว** การออกดอก (flowering) **มาก (abundant)** การติดผล (fruit setting) **มาก (abundant)** ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้ 15 ปี (fruit bearing) **100 ผล** ความยาวผล **27.63 เซนติเมตร** ความกว้างผล **19.3 เซนติเมตร** เส้นรอบวงผล **60.86 เซนติเมตร** น้ำหนักผล (fruit weight) **3.6 กิโลกรัม** ความกว้างปากปลิง **2.16 เซนติเมตร** ความยาวจากขั้วผลถึงปากปลิง **9.06 เซนติเมตร** น้ำหนักเนื้อต่อผล (flesh weight) **380 กรัม** ความหนาเนื้อ (flesh thickness) **1.7 เซนติเมตร** สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) **YO 20 A** กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) **มีกลิ่นอ่อน (mild)** รสชาติของเนื้อ (taste) **หวานมัน** พอดี ลักษณะของเนื้อ (fruit texture) **ละเอียด (fine)** เส้นใยในเนื้อ (fibre) **ไม่มี (absent)** ปริมาณน้ำในเนื้อ (fruit juiciness) **ปานกลาง (intermediate)** น้ำหนักเปลือก (shell weight) **3,100 กรัม** สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) **YG 147 C** จำนวนเมล็ดดิบต่อเมล็ดเต็ม **76/24** ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกว้าง (width) **3.17 เซนติเมตร** ความยาว **5.56 เซนติเมตร** รูปทรงของเมล็ด (shape of stone) **ขอบขนาน (oblong)** น้ำหนักเมล็ด (weight of stone) **80 กรัม** ฤดูกาลผลิต (fruiting season) **ตรงฤดูกาล (season)** อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) **130 วัน**

#### บันทึกเพิ่มเติม (notes)

---



---



---

ชื่อพันธุ์	กบวัดเพลิง (Kop Watphleng)
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Durio zibethinus</i> Murray
ประวัติ	แหล่งที่ค้นพบ จ. นนทบุรี จ.ระยอง
สถานภาพพันธุ์	พันธุ์พื้นเมือง

#### ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) **ไม่เป็นระเบียบ (not orderly)** ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) **ป้อมกลางใบ (elliptical)** ปลายใบ (leaf apex) **cuspidate-acuminate** ฐานใบ (leaf base) **แหลม (acute)** รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) **โค้งงอ (hooked)** หนามผลรอบจุดศูนย์กลางบริเวณปลายผล (fruit spine at the center point of distal) **มีหนาม (present)** หนามปลายผล (fruit spine apex) **หนามตรง (vertical spine)** หนามรอบขั้วผล (proximal spine) **หนามงุ้มเข้า (hooked)**

#### ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) **เร็ว** การออกดอก (flowering) **มาก (abundant)** การติดผล (fruit setting) **ปานกลาง (intermediate)** ฤดูกาลผลิต (fruiting season) **ตรงฤดูกาล (season)** อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) **100-110 วัน**

#### บันทึกเพิ่มเติม (notes)

ชื่อพันธุ์	กบไว (Kop Wai)
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Durio zibethinus</i> Murray
ประวัติ	เพาะจากเมล็ดกบ แหล่งที่ค้นพบ จ. จันทบุรี
สถานภาพพันธุ์	พันธุ์พื้นเมือง

#### ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) **ไม่เป็นระเบียบ (not orderly)** ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) **รูปไข่ขอบขนาน (oval oblong)** ปลายใบ (leaf apex) **เรียวแหลม (acuminate)** ฐานใบ (leaf base) **มน (obtuse)** ดอก (flower) รูปร่างของดอกตูม (flower shape) **กลมรี (oval)** ปลายดอกตูม (flower apex) **แหลม (acute)** ผล (fruit) ปลายผล (fruit apex) **ป้าน (flattened)** ลักษณะฐานผล (fruit base) **ป้าน (flattened)** ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) **ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร** รูปร่างก้านผล (fruit peduncle shape) **ขอบนูน (lip)** หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) **โค้งงอ (hooked)** หนามผลรอบจุดศูนย์กลางบริเวณปลายผล (fruit spine at the center point of distal) **ไม่มีหนาม (present)** หนามปลายผล (fruit spine apex) **หนามตรง (vertical spine)** หนามรอบขั้วผล (proximal spine) **หนามงุ้มเข้า (hooked)**

#### ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) **เร็ว** การออกดอก (flowering) **มาก (abundant)** การติดผล (fruit setting) **ปานกลาง (intermediate)** รสชาติของเนื้อ (taste) **หวานมันพอดี** ลักษณะของเนื้อ (fruit texture) **ปานกลาง (intermediate)** เส้นใยในเนื้อ (fibre) **มี (present)** ปริมาณน้ำในเนื้อ (fruit juiciness) **ปานกลาง (intermediate)** ฤดูกาลผลิต (fruiting season) **ตรงฤดูกาล (season)**

#### บันทึกเพิ่มเติม (notes)



ชื่อพันธุ์	กบสาวน้อย (Kop Saonoi) หรือ กบก้านสั้น (Kop Kansan)
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Durio zibethinus</i> Murray
ประวัติ	แหล่งที่ค้นพบ จ. จันทบุรี จ.ระยอง และ จ.ปราจีนบุรี
สถานภาพพันธุ์	พันธุ์พื้นเมือง

#### ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) **ไม่เป็นระเบียบ (not orderly)** ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) **ขอบขนาน (oblong)** ปลายใบ (leaf apex) **caudate-acuminate** ฐานใบ (leaf base) **แหลม (acute)** ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) **ขอบขนาน (oblong)** ปลายผล (fruit apex) **บุ๋ม (depressed)** ลักษณะฐานผล (fruit base) **ป้าน (flattened)** ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) **สั้น (short) <5 เซนติเมตร** รูปร่างก้านผล (fruit peduncle shape) **ขอบมน (lip)** หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) **แหลม (pointed)** หนามผลรอบจุดศูนย์กลางบริเวณปลายผล (fruit spine at the center point of distal) **ไม่มีหนาม (absent)** หนามปลายผล (fruit spine apex) **หนามตรง (vertical spine)** หนามรอบขั้วผล (proximal spine) **หนามงุ้มเข้า (hooked)**

#### ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) **เร็ว** การออกดอก (flowering) **มาก (abundant)** การติดผล (fruit setting) **มาก (abundant)** ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้ 15 ปี (fruit bearing) **100 ผล** ความยาวผล **23.5 เซนติเมตร** ความกว้างผล **17 เซนติเมตร** เส้นรอบวงผล **58 เซนติเมตร** น้ำหนักผล (fruit weight) **23.5 กิโลกรัม** ความกว้างปากปลิง **1.78 เซนติเมตร** ความยาวจากขั้วผลถึงปากปลิง **4.14 เซนติเมตร** น้ำหนักเนื้อต่อผล (flesh weight) **620 กรัม** ความหนาเนื้อ (flesh thickness) **0.84 เซนติเมตร** สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) **Y 12 C** กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) **มีกลิ่นอ่อน (mild)** รสชาติของเนื้อ (taste) **มันมากกว่าหวาน** ลักษณะของเนื้อ (fruit texture) **ละเอียด (fine)** เส้นใยในเนื้อ (fibre) **ไม่มี (absent)** ปริมาณน้ำในเนื้อ (fruit juiciness) **น้อย (scarce)** น้ำหนักเปลือก (shell weight) **1,420 กรัม** สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) **YG 153 B** จำนวนเมล็ดต่อบ่อเมล็ดเต็ม **17/83** ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกว้าง (width) **3.54 เซนติเมตร** ความยาว **5.29 เซนติเมตร** รูปทรงของเมล็ด (shape of stone) **ขอบขนาน (oblong)** น้ำหนักเมล็ด (weight of stone) **500 กรัม** ฤดูกาลผลิต (fruiting season) **ตรงฤดูกาล (season)**

#### บันทึกเพิ่มเติม (notes)

---



---



---



---

ชื่อพันธุ์ กบสีนาค Kop Si-nak)  
 ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* Murray  
 ประวัติ เพาะจากเมล็ดกบ  
 แหล่งที่ค้นพบ จ. จันทบุรี  
 จ.นันทบุรี  
 สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง



ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไม่เป็น

ระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape)

ป้อมกลางใบ (elliptical) ปลายใบ (leaf apex) caudate-acuminate ฐานใบ (leaf base) มน (obtuse) ดอก (flower) รูปร่างของดอก  
 ดอก (flower shape) กลมรี (oval) ปลายดอก (flower apex) แหลม (acute) ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) กลมแป้น (oblate)  
 ปลายผล (fruit apex) แหลม (acute) ลักษณะฐานผล (fruit base) นุ่ม (depressed) ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) ปาน  
 กลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร รูปร่างก้านผล (fruit peduncle shape) ขอบนูน (lip) หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล  
 (fruit spine shape) นูนปลายแหลม (pointed-convex) หนามผลรอบจุดศูนย์กลางบริเวณปลายผล (fruit spine at the center point  
 of distal) มีหนาม (present) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนามตรง (vertical spine) หนามรอบขั้วผล (proximal spine)  
 หนามงุ้มเข้า (hooked)


ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล (fruit setting) มาก  
 (abundant) ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้ 15 ปี (fruit bearing) 80-100 ผล ความยาวผล 19.48 เซนติเมตร ความกว้างผล 19.48  
 เซนติเมตร เส้นรอบวงผล 61.04 เซนติเมตร น้ำหนักผล (fruit weight) 2.31 กิโลกรัม ความกว้างปากปลิง 1.69 เซนติเมตร ความ  
 ยาวจากขั้วผลถึงปากปลิง 4.76 เซนติเมตร น้ำหนักเนื้อต่อผล (flesh weight) 468 กรัม ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 0.58  
 เซนติเมตร สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) Y O16 B กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) มีกลิ่นอ่อน (mild) รสชาติของเนื้อ  
 (taste) หวานมันพอดี ลักษณะของเนื้อ (fruit texture) ปานกลาง (intermediate) เส้นใยในเนื้อ (fibre) มี (present) ปริมาณน้ำใน  
 เนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate) น้ำหนักเปลือก (shell weight) 1,549 กรัม สีเปลือกผลสุก (skin colour of ripe  
 fruit) YC 146 A ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกว้าง (width) 3.09 เซนติเมตร ความยาว 4.94 เซนติเมตร รูปทรงของเมล็ด  
 (shape of stone) ขอบขนาน (oblong) น้ำหนักเมล็ด (weight of stone) 3.29 กรัม ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตรงฤดูกาล  
 (season) อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) 102 วัน

บันทึกเพิ่มเติม (notes)

ทุเรียนพันธุ์นี้ทรงต้นแข็งแรง ทรงพุ่มเป็นรูปฉัตร ใบมีขนาดเล็ก ปลายใบแหลม ผลมีขนาดปานกลาง สำหรับรสชาติ  
 ของทุเรียนพันธุ์นี้ จะมีรสชาติดหวานมัน ปานกลาง กลิ่นเนื้อหอม เนื้อทุเรียนจะละเอียดจะมีความเหนียว เนื้อสีเหลืองเข้ม

**อพันธุ์** กบสุวรรณ (Kop Suwan)  
**ชื่อวิทยาศาสตร์** *Durio zibethinus* Murray  
**ประวัติ** เพาะจากเมล็ดกบเปลือกสีทอง  
 แหล่งที่ค้นพบ จ. นนทบุรี  
 จ.จันทบุรี และ จ.ระยอง  
**สถานภาพพันธุ์** พันธุ์พื้นเมือง



**ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)**

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) **ไม่เป็นระเบียบ (not orderly)** ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) **ป้อมกลางใบ (elliptical)** ปลายใบ (leaf apex) **acuminate curve** ฐานใบ (leaf base) **กลมมน (rounded-obtuse)** ดอก (flower) รูปร่างของดอกตูม (flower shape) **ขอบขนาน (oblong)** ปลายดอกตูม (flower apex) **มน (obtuse)** ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) **รูปรี (elliptic)** ปลายผล (fruit apex) **นูน (depressed)** ลักษณะฐานผล (fruit base) **ปาน (flattened)** ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) **ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร** รูปร่างก้านผล (fruit peduncle shape) **ขอบนูน (lip)** หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) **โค้งงอ (hooked)** หนามผลรอบจุดศูนย์กลางบริเวณปลายผล (fruit spine at the center point of distal) **ไม่มีหนาม (absent)** หนามปลายผล (fruit spine apex) **หนามตรง (vertical spine)** หนามรอบขั้วผล (proximal spine) **หนามตรง (vertical)**

**ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors)**

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) **เร็ว** การออกดอก (flowering) **มาก (abundant)** การติดผล (fruit setting) **มาก (abundant)** ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้ 15 ปี (fruit bearing) **100-130 ผล** ความยาวผล **23 เซนติเมตร** ความกว้างผล **19 เซนติเมตร** เส้นรอบวงผล **52.5 เซนติเมตร** น้ำหนักผล (fruit weight) **2 กิโลกรัม** ความกว้างปากปลิง **1.35 เซนติเมตร** ความยาวจากขั้วผลถึงปากปลิง **6 เซนติเมตร** น้ำหนักเนื้อต่อผล (flesh weight) **860 กรัม** ความหนาเนื้อ (flesh thickness) **1.06 เซนติเมตร** สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) **Y 12 AB** กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) **มีกลิ่นแรง (strong)** รสชาติของเนื้อ (taste) **หวานมันพอดี** ลักษณะของเนื้อ (fruit texture) **ละเอียด (fine)** เส้นใยในเนื้อ (fibre) **ไม่มี (absent)** ปริมาณน้ำในเนื้อ (fruit juiciness) **ปานกลาง (intermediate)** น้ำหนักเปลือก (shell weight) **1,068 กรัม** จำนวนเมล็ดตลบต่อเมล็ดเต็ม **43/57** ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกว้าง (width) **3.10 เซนติเมตร** ความยาว **5.02 เซนติเมตร** รูปทรงของเมล็ด (shape of stone) **ขอบขนาน (oblong)** น้ำหนักเมล็ด (weight of stone) **155 กรัม** ฤดูกาลผลิต (fruiting season) **ตรงฤดูกาล (season)** อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) **102 วัน**

**บันทึกเพิ่มเติม (notes)**

ทรงผลทรงกลม พูไม่เด่นชัด ขึ้นขนาดปานกลาง ก้านผลโปนเล็กน้อย หนามยาวปานกลางแต่ไม่ถึงคล้ายกับพันธุ์กบแม่เต่า หนามเป็นระเบียบคล้ายพันธุ์ก้านยาว ขนาดผลโต น้ำหนักผลเฉลี่ยประมาณ 2.5 กิโลกรัม เป็นพันธุ์ที่อ่อนไหวต่อสภาพดินฟ้าอากาศ มักพบอาการไส้ซึม ไม่ทนฝน ดูแลรักษายาก ลักษณะเด่นของพันธุ์นี้คือ เนื้อมีสีเหลืองทองคล้ายสีทองสุกแล้ว (ใหม่) สีผลเขียวสด

ชื่อพันธุ์ กบหน้าศาล (Kop Nasan)  
 ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* Murray  
 ประวัติ แหล่งที่ค้นพบ จ. จันทบุรี  
 จ.ระยอง และ นนทบุรี  
 สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง



ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) **ไม่เป็นระเบียบ (not orderly)** ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) **ป้อมกลางใบ (elliptical)** ปลายใบ (leaf apex) **แหลมเรียว (acuminate acute)** ฐานใบ (leaf base) **มน (obtuse)** ดอก (flower) รูปร่างของดอกตูม (flower shape) **ขอบขนาน (oblong)** ปลายดอกตูม (flower apex) **แหลม (acute)** ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) **รูปรี (oval)** ปลายผล (fruit apex) **ป้าน (flattened)** ลักษณะฐานผล (fruit base) **ป้าน (flattened)** ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) **สั้น (short) <5 เซนติเมตร** รูปร่างก้านผล (fruit peduncle shape) **ขอบมน (lip)** หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) **นูนปลายแหลม (pointed convex)** หนามผลรอบจุดศูนย์กลางบริเวณปลายผล (fruit spine at the center point of distal) **ไม่มีหนาม (present)** หนามปลายผล (fruit spine apex) **หนามงุ้มเข้า (hooked spine)** หนามรอบขั้วผล (proximal spine) **หนามงุ้มเข้า (hooked)**

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) **เร็ว** การออกดอก (flowering) **มาก (abundant)** การติดผล (fruit setting) **มาก (abundant)** ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้ 15 ปี (fruit bearing) **100-120 ผล** ความยาวผล **24.6 เซนติเมตร** ความกว้างผล **19.3 เซนติเมตร** เส้นรอบวงผล **58.6 เซนติเมตร** น้ำหนักผล (fruit weight) **2.1 กิโลกรัม** ความกว้างปากปลิง **2.1 เซนติเมตร** ความยาวจากขั้วผลถึงปากปลิง **9.31 เซนติเมตร** น้ำหนักเนื้อต่อผล (flesh weight) **500 กรัม** ความหนาเนื้อ (flesh thickness) **0.9 เซนติเมตร** สีเนื้อผลดิบ (flesh colour of mature green fruit) **YG 14 C** กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) **มีกลิ่นอ่อน (mild)** รสชาติของเนื้อ (taste) **หวานมันพอดี** ลักษณะของเนื้อ (fruit texture) **ละเอียด (fine)** เส้นใยในเนื้อ (fibre) **ไม่มี (absent)** ปริมาณน้ำในเนื้อ (fruit juiciness) **ปานกลาง (intermediate)** น้ำหนักเปลือก (shell weight) **1,500 กรัม** สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) **YG 152 C** จำนวนเมล็ดต่อบทต่อเมล็ดเต็ม **40/60** ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกว้าง (width) **3.5 เซนติเมตร** ความยาว **5.47 เซนติเมตร** รูปทรงของเมล็ด (shape of stone) **ขอบขนาน (oblong)** สีของเมล็ด (stone colour) น้ำหนักเมล็ด (weight of stone) **20 กรัม** ฤดูกาลผลิต (fruiting season) **ตรงฤดูกาล (season)** อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) **120 วัน**

บันทึกเพิ่มเติม (notes)

---




---



---

ชื่อพันธุ์ กระคุมทอง (Kradum Thong)  
หรือ กระคุม (Kradum)  
ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* Murray  
ประวัติ แหล่งที่ค้นพบบางกอกน้อยเขตลิ่งชัน  
จ. นนทบุรี จ.จันทบุรี  
สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง  
ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)



การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching)

ไม่เป็นระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) ป้อมกลางใบ (elliptical) ปลายใบ (leaf apex) caudate acuminata) ฐานใบ (leaf base) กลมมน (obtus) ดอก (flower) รูปร่างของดอกตูม (flower shape) กลมรี (oval) ปลายดอกตูม (flower apex) กลม (rounded) ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) กลมแป้น (oblate) ปลายผล (fruit apex) ป้าน (flattened) ลักษณะฐานผล (fruit base) ป้าน (flattened) ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร รูปร่างก้านผล (fruit peduncle shape) ขอบนูน (lip) หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) นูนปลายแหลม (pointed convex) หนามผลรอบจุดศูนย์กลางบริเวณปลายผล (fruit spine at the center point of distal) ไม่มีหนาม (present) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนามงุ้มเข้า (hooked spine) หนามรอบขั้วผล (proximal spine) หนามงุ้มเข้า (hooked)

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล (fruit setting) มาก (abundant) ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้ 15 ปี (fruit bearing) 100-120 ผล ความยาวผล 13.5 เซนติเมตร ความกว้างผล 13.15 เซนติเมตร เส้นรอบวงผล 41 เซนติเมตร น้ำหนักผล (fruit weight) 0.75 กิโลกรัม ความกว้างปากปลิง 1.01 เซนติเมตร ความยาวจากขั้วผลถึงปากปลิง 4.5 เซนติเมตร น้ำหนักเนื้อต่อผล (flesh weight) 150 กรัม ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 0.6 เซนติเมตร สีเนื้อผลดิบ (flesh colour of mature green fruit) Y 111A-YO14C กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) มีกลิ่นอ่อน (mild) รสชาติของเนื้อ (taste) มันมากกว่าหวาน ลักษณะของเนื้อ (fruit texture) ละเอียด (fine) เส้นใยในเนื้อ (fibre) ไม่มี (absent) ปริมาณน้ำในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate) น้ำหนักเปลือก (shell weight) 500 กรัม สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) YG146C-153A จำนวนเมล็ดต่อผลเต็ม 47/53 ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกว้าง (width) 2.15 เซนติเมตร ความยาว 3.10 เซนติเมตร รูปทรงของเมล็ด (shape of stone) ขอบขนาน (oblong) สีของเมล็ด (stone colour) น้ำหนักเมล็ด (weight of stone) 80 กรัม ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตรงฤดูกาล (season) อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) 90-100 วัน

บันทึกเพิ่มเติม (notes)

ทุเรียนพันธุ์นี้ ทรงต้นดี เป็นพันธุ์ที่ปลูกขึ้นง่ายและโตเร็วกว่าพันธุ์อื่นๆ ทั้งหมดในบรรดาทุเรียนพันธุ์อื่น เป็นพันธุ์ที่ปลูกแล้วไม่ค่อยทิ้งกิ่ง ลักษณะใบจะมีขนานค่อนข้างใหญ่ แผ่นใบสองข้างห่อเข้าหากันแผ่นใบเป็นคลื่นเล็กน้อย ผลของทุเรียนพันธุ์นี้ค่อนข้างกลมแบน หัวและท้ายค่อนข้างป้าน ขันค่อนข้างสั้นเล็ก โคนจะใหญ่ปลายเรียว หนามจะสั้นถี่ ฐานของหนามมี 5 เหลี่ยม ฐานกว้าง หนามมีลักษณะแบน หนามตอนหัวและก้นผลเล็กและถี่ ร่องพูตื้น เนื้อละเอียด อ่อนนุ่ม มีสีเหลืองอ่อน

ชื่อพันธุ์ กบหัวล้าน (Kop Hualan)  
ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* Murray  
ประวัติ แหล่งที่ค้นพบ จ. จันทบุรี จ.ระยอง จ.ปราจีนบุรี  
สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง

ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) **ป้อมกลางใบ (elliptical)** ปลายใบ (leaf apex) **เรียวแหลม (acuminate)** ฐานใบ (leaf base) **แหลม (acute)**

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors) การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) **เร็ว** การออกดอก (flowering) **มาก (abundant)** การติดผล (fruit setting) **มาก (abundant)** ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้ 15 ปี (fruit bearing) **100-120 ผล** ฤดูกาลผลิต (fruiting season) **ตรงฤดูกาล (season)** อายุการเก็บเกี่ยว **120 วัน**

บันทึกเพิ่มเติม (notes)

---

---

---

---

ชื่อพันธุ์ กระคุ่มสีนาค (Kradum Sri-nak)  
ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* Murray  
ประวัติ แหล่งที่ค้นพบ จ. นนทบุรี  
สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง

ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) **ไม่เป็นระเบียบ (not orderly)** ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) **ป้อมกลางใบ (obovate-lanceolate)** ปลายใบ (leaf apex) **caudate-acuminate** ฐานใบ (leaf base) **กลมมน (rounded obtuse)** ดอก (flower) รูปร่างของดอกตูม (flower shape) **กลมรี (oval)** ปลายดอกตูม (flower apex) **กลม (rounded)** ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) **กลมแป้น (oblate)** ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) **ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร** หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) **นูนปลายแหลม (pointed-convex)**

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) **เร็ว** การออกดอก (flowering) **มาก (abundant)** การติดผล (fruit setting) **มาก (abundant)** ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้ 15 ปี (fruit bearing) **100-120 ผล** ฤดูกาลผลิต (fruiting season) **ตรงฤดูกาล (season)** อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) **100-120 วัน**

บันทึกเพิ่มเติม (notes)

---

---

---

---

ชื่อพันธุ์ กระปุกทอง (Krapuk Thong) หรือ

กระปุกทองดี (Krapuk Thongdi)

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* Murray


ประวัติ แหล่งที่ค้นพบบางกอกน้อย

จ. นนทบุรี จ.จันทบุรี

สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง

ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching)



ไม่เป็นระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) รูปไข่ขอบขนาด (oval-oblong) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute) ดอก (flower) รูปร่างของดอกตูม (flower shape) ขอบขนาน (oblong) ปลายดอกตูม (flower apex) แหลม (acute) ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) รูปไข่ (ovate) ปลายผล (fruit apex) บุ่ม (depressed) ลักษณะฐานผล (fruit base) บุ่ม (depressed) ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) สั้น (short) < 5 เซนติเมตร รูปร่างก้านผล (fruit peduncle shape) ขอบนูน (lip) หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) นูนปลายแหลม (pointed convex) หนามผลรอบจุดศูนย์กลางบริเวณปลายผล (fruit spine at the center point of distal) มีหนาม (present) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนามงุ้มเข้า (hooked spine) หนามรอบขั้วผล (proximal spine) หนามงุ้มเข้า (hooked)

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors)

ขนาดผล (fruit size) ความยาวผล 121.08 เซนติเมตร ความกว้างผล 191 เซนติเมตร เส้นรอบวงผล 57.32 เซนติเมตร น้ำหนักผล (fruit weight) 2.05 กิโลกรัม ความกว้างปากปลิง 2.05 เซนติเมตร ความยาวจากขั้วผลถึงปากปลิง 5.12 เซนติเมตร น้ำหนักเนื้อต่อผล (flesh weight) 784 กรัม ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 1.11 เซนติเมตร สีเนื้อผลสุก (flesh colour of mature ripe fruit) YO12C,YO11B กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) มีกลิ่นแรง (strong) รสชาติของเนื้อ (taste) หวานมันพอดี ลักษณะของเนื้อ (fruit texture) ปานกลาง (intermediate) เส้นใยในเนื้อ (fibre) ไม่มี (absent) ปริมาณน้ำในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate) น้ำหนักเปลือก (shell weight) 1,662 กรัม สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) YO152AB,146BC ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกว้าง (width) 2.95 เซนติเมตร ความยาว 5.06 เซนติเมตร น้ำหนักเมล็ด (weight of stone) 84 กรัม

บันทึกเพิ่มเติม (notes)

---

---

---

---

---

ชื่อพันธุ์	กลีบสมุทร (Klib Sa-mut)
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Durio zibethinus</i> Murray
ประวัติ	เพาะจากเมล็ดกบแม่เต่า แหล่งที่ค้นพบ จ. ชนบุรี จ.นนทบุรี
สถานภาพพันธุ์	พันธุ์พื้นเมือง

#### ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) **ไม่เป็นระเบียบ(notorderly)** ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) **รูปไข่ขอบขนาน (oval-oblong)** ปลายใบ(leaf apex) **เรียวแหลม (acuminate)** ฐานใบ (leaf base) **มน (obtuse)** ดอก (flower) รูปร่างของดอกตูม (at preblossom stage) **รูปไข่กลับ (obovate)** ปลายดอกตูม (flower apex) **แหลม(acute)** ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) **กลมรี (oval)** ปลายผล (fruit apex) **ป้าน (flattened)** ลักษณะฐานผล (fruit base) **ป้าน (flattened)** ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) **ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร** รูปร่างก้านผล (fruit peduncle shape) **ขอบนูน (lip)** หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) **โค้งงอ (hooked)** หนามผลรอบจุดศูนย์กลางบริเวณปลายผล (fruit spine at the center point of distal) **มีหนาม (present)** หนามปลายผล (fruit spine apex) **หนามตรง (vertical spine)** หนามรอบขั้วผล (proximal spine) **หนามตรง (vertical spine)**

#### ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) **เร็ว** การออกดอก (flowering) **มาก (abundant)** การติดผล (fruit setting) **มาก (abundant)** ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้ 15 ปี (fruit bearing) **100-120 ผล** สีเนื้อผลดิบ (flesh colour of mature green fruit) **YG 164 C** สีเปลือกผลสุก (husk colour) **Y11 B** ฤดูกาลเก็บเกี่ยว (harvesting season) **ตรงฤดูกาล (season)** อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) **100-110 วัน**

#### บันทึกเพิ่มเติม (notes)

---



---



---



---



ชื่อพันธุ์ ก้อนทอง (Konthong)  
หรือ ทองก้อน (Thongkon)

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* Murray  
แหล่งที่ค้นพบ จ. ระยอง จ.นนทบุรี  
และบางกอกน้อย

สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง

#### ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไม่เป็นระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) รูปไข่  
ขอบขนาน (oval-oblong) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute) ดอก (flower) รูปร่าง  
ของดอกตูม (flower shape) รูปไข่กลับ (obovate) ปลายดอกตูม (flower apex) แหลม (acute) ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape)  
ทรงกระบอก (cylindrical) ปลายผล (fruit apex) ป้าน (flattened) ลักษณะฐานผล (fruit base) ป้าน (flattened) ความยาวก้านผล  
(fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร รูปร่างก้านผล (fruit peduncle shape) ขอบนูน (lip) หนามผล  
(fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) นูนปลายแหลม (pointed-convex) หนามผลรอบจุดศูนย์กลางบริเวณปลายผล  
(fruit spine at the center point of distal) ไม่มีหนาม (absent) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนามตรง (vertical spine)  
หนามรอบขั้วผล (proximal spine) หนามงุ้มเข้า (hooked)

#### ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล (fruit setting) ปาน  
กลาง (intermediate) ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้ 15 ปี (fruit bearing) 100-120 ผล ความยาวผล 29 เซนติเมตร ความกว้างผล 21.85  
เซนติเมตร เส้นรอบวงผล 63.4 เซนติเมตร น้ำหนักผล (fruit weight) 3.63 กิโลกรัม ความกว้างปากปลิง 2.16 เซนติเมตร ความ  
ยาวจากขั้วผลถึงปากปลิง 2.45 เซนติเมตร น้ำหนักเนื้อต่อผล (flesh weight) 760 กรัม ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 1.92  
เซนติเมตร สีเนื้อผลดิบ (flesh colour of mature green fruit) YG 10 C กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) มีกลิ่นอ่อน (mild) รสชาติ  
ของเนื้อ (taste) หวานมันพอดี ลักษณะของเนื้อ (fruit texture) หยาบ (coarse) เส้นใยในเนื้อ (fibre) มี (present) ปริมาณน้ำใน  
เนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate) น้ำหนักเปลือก (shell weight) 2,600 กรัม สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green  
fruit) YG 146 จำนวนเมล็ดต่อบ่อเมล็ดเต็ม -/100 ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกว้าง (width) 3.76 เซนติเมตร ความยาว 5.4  
เซนติเมตร รูปทรงของเมล็ด (shape of stone) ขอบขนาน (oblong) น้ำหนักเมล็ด (weight of stone) 170 กรัม ฤดูกาลผลิต  
(fruiting season) ตรงฤดูกาล (season) อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) 100-120 วัน

#### บันทึกเพิ่มเติม (notes)

---

---

---

---

---

ชื่อพันธุ์ กะเทยข้าวสั้น (Kathoei Khuasan)

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* Murray

สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง

#### ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) **ไม่เป็นระเบียบ (not orderly)** ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) **ป้อมกลางใบ (elliptical)** ปลายใบ (leaf apex) **acuminate-curve** ฐานใบ (leaf base) **กลมมน (roundedobtuse)** ดอก (flower) รูปร่างของดอกตูม (flower shape at preblossom stage) **ขอบขนาน (oblong)** ปลายดอกตูม (flower apex) **แหลม (acute)** ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) **กลมรี (oval)** ปลายผล (fruit apex) **แหลม (pointed)** ลักษณะฐานผล (fruit base) **ป้าน (flattened)** ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) **ปานกลาง (medium)** 5-11 เซนติเมตร รูปร่างก้านผล (fruit peduncle shape) **ขอบนูน (lip)** หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) **นูนปลายแหลม (pointed-convex)** หนามผลรอบจุดศูนย์กลางบริเวณปลายผล (fruit spine at the center point of distal) **มีหนาม (present)** หนามปลายผล (fruit spine apex) **หนามตรง (vertical spine)** หนามรอบขั้วผล (proximal spine) **หนามงุ้มเข้า (hooked)**

#### ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) **เร็ว** การออกดอก (flowering) **มาก (abundant)** การติดผล (fruit setting) **มาก (abundant)** ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้ 15 ปี (fruit bearing) 100-120 ผล ความยาวผล 19 เซนติเมตร ความกว้างผล 16 เซนติเมตร เส้นรอบวงผล 55.5 เซนติเมตร น้ำหนักผล (fruit weight) 1.7 กิโลกรัม ความกว้างปากปลิง 1.51 เซนติเมตร ความยาวจากขั้วผลถึงปากปลิง 4.28 เซนติเมตร น้ำหนักเนื้อต่อผล (flesh weight) 415 กรัม ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 0.18 เซนติเมตร สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) **Y 11 B** กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) **มีกลิ่นอ่อน (mild)** รสชาติของเนื้อ (taste) **หวานมันพอดี** ลักษณะของเนื้อ (fruit texture) **ปานกลาง (intermediate)** เส้นใยในเนื้อ (fibre) **มี (present)** ปริมาณน้ำในเนื้อ (fruit juiciness) **น้อย (scarce)** น้ำหนักเปลือก (shell weight) 1,010 กรัม สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) **YG 153 A** จำนวนเมล็ดดิบ/เมล็ดเต็ม 15/85 ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกว้าง (width) 2.78 เซนติเมตร ความยาว 4.80 เซนติเมตร รูปทรงของเมล็ด (shape of stone) **ขอบขนาน (oblong)** สีเมล็ด (stone colour) **GO 164 C 170** น้ำหนักเมล็ด (weight of stone) 185 กรัม ฤดูกาลผลิต (fruiting season) **ตรงฤดูกาล (season)** อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) 132 วัน

#### บันทึกเพิ่มเติม (notes)



ชื่อพันธุ์ กะเทยเนื้อขาว (Kathoi Nucakhao)

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* Murray

ประวัติ แหล่งที่ค้นพบ บางกอกน้อย ตลิ่งชัน จ.นนทบุรี  
จ.ระยอง จ. จันทบุรี

สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง

ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)


การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) **ไม่เป็นระเบียบ (not orderly)** ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) **ยาวเรียว (linear-oblong)** ปลายใบ (leaf apex) **cuspidate-acuminate** ฐานใบ (leaf base) **แหลม (acute)** ดอก (flower) รูปร่างของดอกตูม (flower shape at preblossom stage) **กลมรี (oval)** ปลายดอกตูม (flower apex) **แหลม (acute)** ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) **รูปไข่ (ovate)** ปลายผล (fruit apex) **ป้าน (flattened)** ลักษณะฐานผล (fruit base) **บุ๋ม (depressed)** ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) **สั้น (short) <5 เซนติเมตร** รูปร่างก้านผล (fruit peduncle shape) **ขอบนูน (lip)** หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) **นูนปลายแหลม (pointed-convex)** หนามผลรอบจุดศูนย์กลางบริเวณปลายผล (fruit spine at the center point of distal) **มีหนาม (absent)** หนามปลายผล (fruit spine apex) **หนามตรง (vertical spine)** หนามรอบขั้วผล (proximal spine) **หนามงุ้มเข้า (hooked spine)**

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) **เร็ว** การออกดอก (flowering) **มาก (abundant)** การติดผล (fruit setting) **มาก (abundant)** ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้ 15 ปี (fruit bearing) **100-120 ผล** ความยาวผล **26.03 เซนติเมตร** ความกว้างผล **19.84 เซนติเมตร** เส้นรอบวงผล **60.72 เซนติเมตร** น้ำหนักผล (fruit weight) **3.33 กิโลกรัม** ความกว้างปากปลิง **2.54 เซนติเมตร** ความยาวจากขั้วผลถึงปากปลิง **4.51 เซนติเมตร** น้ำหนักเนื้อต่อผล (flesh weight) **820 กรัม** ความหนาเนื้อ (flesh thickness) **1.66 เซนติเมตร** สีเนื้อผลดิบ (flesh colour of mature green fruit) **YG 11 D** กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) **มีกลิ่นอ่อน (mild)** รสชาติของเนื้อ (taste) **มันมากกว่าหวาน** ลักษณะของเนื้อ (fruit texture) **ละเอียด (fine)** เส้นใยในเนื้อ (fibre) **ไม่มี (absent)** ปริมาณน้ำในเนื้อ (fruit juiciness) **ปานกลาง (intermediate)** น้ำหนักเปลือก (shell weight) **2,120 กรัม** จำนวนเมล็ดดิบ/เมล็ดเต็ม **86/14** ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกว้าง (width) **2.92 เซนติเมตร** ความยาว **5.05 เซนติเมตร** รูปทรงของเมล็ด (shape of stone) **ขอบขนาน (oblong)** น้ำหนักเมล็ด (weight of stone) **90 กรัม** ฤดูกาลผลิต (fruiting season) **ตรงฤดูกาล (season)** อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) **100-120 วัน**

บันทึกเพิ่มเติม (notes)

-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----



ชื่อพันธุ์	กะเทยเนื้อแดง (Kathoei Nueadaeng)
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Durio zibethinus</i> Murray
ประวัติ	แหล่งที่ค้นพบ จ.จันทบุรี จ.ปราจีนบุรี
สถานภาพพันธุ์	พันธุ์พื้นเมือง

#### ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไม่เป็นระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) ป้อม โคนใบ (ovate-lanceolate) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ฐานใบ (leaf base) มน (obtusate) ดอก (flower) รูปร่างของดอกตูม (flower shape at preblossom stage) กลมรีขอบขนาน (oval-oblong) ปลายดอกตูม (flower apex) แหลม (acute) ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) ทรงกระบอก (cylindrical) ปลายผล (fruit apex) ป้าน (flattened) ลักษณะฐานผล (fruit base) มุม (depressed) ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) สั้น (short) <5 เซนติเมตร รูปร่างก้านผล (fruit peduncle shape) ขอบนูน (lip) หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) แหลม (pointed) หนามผลรอบจุดศูนย์กลางบริเวณปลายผล (fruit spine at the center point of distal) มีหนาม (absent) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนามตรง (vertical spine) หนามรอบขั้วผล (proximal spine) หนามงุ้มเข้า (hooked)

#### ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate) การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate) ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้ 15 ปี (fruit bearing) 100-120 ผล ความยาวผล 23.38 เซนติเมตร ความกว้างผล 19.54 เซนติเมตร เส้นรอบวงผล 57.65 เซนติเมตร น้ำหนักผล (fruit weight) 2.78 กิโลกรัม ความกว้างปากปลิง 2.35 เซนติเมตร ความยาวจากขั้วผลถึงปากปลิง 4.56 เซนติเมตร น้ำหนักเนื้อต่อผล (flesh weight) 80 กรัม ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 1.66 เซนติเมตร สีเนื้อผลดิบ (flesh colour of mature green fruit) YG 11 D กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) มีกลิ่นอ่อน (mild) รสชาติของเนื้อ (taste) หวานมากกว่ามัน ลักษณะของเนื้อ (fruit texture) ละเอียด (fine) เส้นใยในเนื้อ (fibre) ไม่มี (absent) ปริมาณน้ำในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate) น้ำหนักเปลือก (shell weight) 1,770 กรัม สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) YG 146 C จำนวนเมล็ดดิบ/เมล็ดเต็ม 85/15 ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกว้าง (width) 3.12 เซนติเมตร ความยาว 5.4 เซนติเมตร รูปทรงของเมล็ด (shape of seed) ขอบขนาน (oblong) น้ำหนักเมล็ด (weight of stone) 140 กรัม ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตรงฤดูกาล (season) อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) 100-120 วัน

#### บันทึกเพิ่มเติม (notes)

---



---



---

ชื่อพันธุ์ กะเทยเนื้อเหลือง (Kathoei Nucalueang)

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* Murray

ประวัติ แหล่งที่ค้นพบ บางกอกน้อย ตลิ่งชัน จ.นนทบุรี  
จ.ระยอง จ.ปราจีนบุรี

สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง

#### ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) **ไม่เป็นระเบียบ (not orderly)** ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) **ยาวเรียว (linear-oblong)** ปลายใบ (leaf apex) **cuspidate-acuminate** ฐานใบ (leaf base) **มน (obtuse)** ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) **กลมรี (oval)** ปลายผล (fruit apex) **ป้าน (flattened)** ลักษณะฐานผล (fruit base) **ป้าน (flattened)** รูปร่างก้านผล (fruit peduncle shape) **ขอบนูน (lip)** หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) **นูนปลายแหลม (pointed-convex)** หนามผลรอบจุดศูนย์กลางบริเวณปลายผล (fruit spine at the center point of distal) **ไม่มีหนาม (absent)** หนามปลายผล (fruit spine apex) **หนามตรง (vertical spine)** หนามรอบขั้วผล (proximal spine) **หนามงุ้มเข้า (hooked)**

#### ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) **เร็ว** การออกดอก (flowering) **ปานกลาง (intermediate)** การติดผล (fruit setting) **ปานกลาง (intermediate)** ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้ 15 ปี (fruit bearing) **100-120 ผล** ความยาวผล **26.5 เซนติเมตร** ความกว้างผล **20.5 เซนติเมตร** เส้นรอบวงผล **67 เซนติเมตร** น้ำหนักผล (fruit weight) **3.44 กิโลกรัม** ความกว้างปากปลิง **2.08 เซนติเมตร** ความยาวจากขั้วผลถึงปากปลิง **6.99 เซนติเมตร** น้ำหนักเนื้อต่อผล (flesh weight) **940 กรัม** ความหนาเนื้อ (flesh thickness) **1.19 เซนติเมตร** สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) **Y 12 C** กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) **มีกลิ่นอ่อน (mild)** รสชาติของเนื้อ (taste) **มันมากกว่าหวาน** ลักษณะของเนื้อ (fruit texture) **ปานกลาง (intermediate)** เส้นใยในเนื้อ (fibre) **มี (present)** ปริมาณน้ำในเนื้อ (fruit juiciness) **น้อย (scarce)** น้ำหนักเปลือก (husk weight) **1,960 กรัม** สีเปลือก (husk colour) **YG 152 B** จำนวนเมล็ดดิบ/เมล็ดเต็ม **20/80** ขนาดของเมล็ด (seed size) ความกว้าง (width) **4.04 เซนติเมตร** ความยาว (length) **5.62 เซนติเมตร** รูปทรงของเมล็ด (seed shape) **ขอบขนาน (oblong)** สีของเมล็ด (stone colour) **GO 164 B** น้ำหนักเมล็ด (seed weight) **540 กรัม** ฤดูกาลเก็บเกี่ยว (harvesting season) **ตรงฤดูกาล (season)** อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) **100-120 วัน**

#### บันทึกเพิ่มเติม (notes)

ทรงผลคล้ายพันธุ์ชะนีแต่มีขนาดผลใหญ่กว่า หนามผลมีขนาดใหญ่กว่าพันธุ์ชะนี เมล็ดเล็ก รสชาติหวานมัน ผลสุกเร็วและร่วงง่าย ขั้วผลไม่เหนียว เนื้อมีสีเหลืองเข้ม



ชื่อพันธุ์	ก้านยาว (Kanyao)
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Durio zibethinus</i> Murray
ประวัติ	เกิดจากเมล็ดพันธุ์ทองสุก แหล่งที่ค้นพบ จ.นนทบุรี จ.จันทบุรี
สถานภาพพันธุ์	พันธุ์พื้นเมือง

#### ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไม่เป็นระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) ไข่ม  
ปลายใบ (obovate-lanceolate) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ฐานใบ (leaf base) แหลมเรียว (acuminate-acute)  
ดอก (flower) รูปร่างของดอกตูม (flower shape at preblossom stage) ขอบขนาน (oblong) ปลายดอกตูม (flower apex) แหลม  
(acute) ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) กลมรี (oval) ปลายผล (fruit apex) ป้าน (flattened) ลักษณะฐานผล (fruit base) ป้าน  
(flattened) ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) ยาว (long) >11 เซนติเมตร รูปร่างก้านผล (fruit peduncle shape) เรียบ  
(uniform) หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) นูน (convex) หนามผลรอบจุดศูนย์กลางบริเวณปลายผล  
(fruit spine at the center point of distal) มีหนาม (present) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนามตรง (vertical spine) หนาม  
รอบขั้วผล (proximal spine) หนามงุ้มเข้า (hooked)

#### ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) ปานกลาง (medium) การออกดอก (flowering) น้อย (little) การติดผล (fruit  
setting) น้อย (little) ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้ 15 ปี (fruit bearing) 60-70 ผล ความยาวผล 23 เซนติเมตร ความกว้างผล 19  
เซนติเมตร เส้นรอบวงผล 61 เซนติเมตร น้ำหนักผล (fruit weight) 3 กิโลกรัม ความกว้างปากปลิง 2.4 เซนติเมตร ความยาวจาก  
ขั้วผลถึงปากปลิง 10 เซนติเมตร น้ำหนักเนื้อต่อผล (flesh weight) 740 กรัม ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 1.5 เซนติเมตร สี  
เนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) YO 14 C กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) มีกลิ่นอ่อน (mild) รสชาติของเนื้อ (taste) หวานมัน  
พอดี ลักษณะของเนื้อ (fruit texture) ละเอียด (fine) เส้นใยในเนื้อ (fibre) ไม่มี (absent) ปริมาณน้ำในเนื้อ (fruit juiciness) ปาน  
กลาง (intermediate) น้ำหนักเปลือก (shell weight) 1,480 กรัม สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) YG 147 C จำนวน  
เมล็ดดิบ/เมล็ดเต็ม 70/30 ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกว้าง (width) 3.65 เซนติเมตร ความยาว 5.5 เซนติเมตร รูปทรงของ  
เมล็ด (shape of stone) ขอบขนาน (oblong) น้ำหนักเมล็ด (weight of stone) 180 กรัม ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตรงฤดูกาล  
(season) อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) 100-115 วัน

#### บันทึกเพิ่มเติม (notes)

---



---



---

ชื่อพันธุ์ ก้านยาวใบด่าง (Kanyao Baidang)

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* Murray

ประวัติ แหล่งที่ค้นพบ จ.ปราจีนบุรี

สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง

#### ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) **ไม่เป็นระเบียบ (not orderly)** ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) **ขอบขนาน (oblong)** ปลายใบ (leaf apex) **เรียวแหลม (acuminate)** ฐานใบ (leaf base) **มน (obtuse)** ดอก (flower) ปลายดอกตูม (flower apex) **แหลม (acute)** ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) **รูปรี (elliptical)** ปลายผล (fruit apex) **แหลม (pointed)** ลักษณะฐานผล (fruit base) **ป้าน (flattened)** ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) **ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร** หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) **เว้า (concave)** หนามผลรอบจุดศูนย์กลางบริเวณปลายผล (fruit spine at the center point of distal) **มีหนาม (present)** หนามปลายผล (fruit spine apex) **หนามตรง (vertical spine)** หนามรอบขั้วผล (proximal spine) **หนามงุ้มเข้า (hooked)**

#### ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) **ปานกลาง (intermediate)** การออกดอก (flowering) **น้อย (little)** การติดผล (fruit setting) **น้อย (little)** ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้ 15 ปี (fruit bearing) **60-70 ผล** กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) **ปานกลาง (intermediate)** รสชาติของเนื้อ (taste) **หวานมันพอดี** ลักษณะของเนื้อ (fruit texture) **ละเอียด (fine)** เส้นใยในเนื้อ (fibre) **ไม่มี (absent)** ปริมาณน้ำในเนื้อ (fruit juiciness) **น้อย (scarce)** ฤดูกาลผลติ (fruiting season) **ตรงฤดูกาล (season)** อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) **100-115 วัน**

#### บันทึกเพิ่มเติม (notes)

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---





## ชื่อพันธุ์

ก้านยาววัดสัก (Kanyao Watsak)

หรือ เหลืองประเสริฐ (Lueangprasoet)

## ชื่อวิทยาศาสตร์

*Durio zibethinus* Murray

## ประวัติ

เป็นพันธุ์ก้านยาวที่เกิดที่วัดสัก

เดิมชื่อว่าเหลืองประเสริฐ

แต่เจ้าพระยาแพทย์พงษาวิสูทธาบดี

ให้ชื่อว่า สายทอง เพราะก้านยาวกว่าพันธุ์แม่

แหล่งที่ค้นพบ จ.จันทบุรี จ.ปราจีนบุรี จ.ระยอง

## สถานภาพพันธุ์

พันธุ์พื้นเมือง

## ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) **ไม่เป็นระเบียบ (not orderly)** ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) **ป้อม โคนใบ (ovate-lanceolate)** ปลายใบ (leaf apex) **เรียวแหลม (acuminate)** ฐานใบ (leaf base) **มน (obtus)** ดอก (flower) รูปร่างของดอกตูม (flower shape at preblossom stage) **ขอบขนาน (oblong)** ปลายดอกตูม (flower apex) **แหลม (acute)** ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) **รูปไข่กลับ (obovate)** ปลายผล (fruit apex) **แหลม (pointed)** ลักษณะฐานผล (fruit base) **นูน (depressed)** ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) **ปานกลาง (intermediate) 5-11 เซนติเมตร** รูปร่างก้านผล (fruit peduncle shape) **เรียว (uniform)** หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) **นูนปลายแหลม (pointed-convex)** หนามผลรอบจุดศูนย์กลางบริเวณปลายผล (fruit spine at the center point of distal) **มีหนาม (present)** หนามปลายผล (fruit spine apex) **หนามตรง (vertical spine)** หนามรอบหัวผล (proximal spine) **หนามงุ้มเข้า (hooked)**

## ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) **ปานกลาง (intermediate)** การออกดอก (flowering) **น้อย (little)** การติดผล (fruit setting) **น้อย (little)** ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้ 15 ปี (fruit bearing) **60-70 ผล** สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) **YO 14 C** ลักษณะของเนื้อ (fruit texture) **ละเอียด (fine)** เส้นใยในเนื้อ (fibre) **มี (present)** ปริมาณน้ำในเนื้อ (fruit juiciness) **น้อย (scarce)** สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) **YG 147 B** รูปทรงของเมล็ด (shape of stone) **ขอบขนาน (oblong)** ฤดูกาลผลิต (fruiting season) **ตรงฤดูกาล (season)** อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) **100-115 วัน**


## บันทึกเพิ่มเติม (notes)

---

---

---

---



ชื่อพันธุ์ ก้านยาวสีนาค (Kanyao Si-nak)  
ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* Murray  
ประวัติ เกิดจากการเพาะเมล็ดก้านยาว  
แหล่งที่ค้นพบ สวนนายเลิศ แหสกุล  
คลองบางซื่อน จ.นนทบุรี

สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง

ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching)


ไม่เป็นระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปร่างของใบ

(leaf shape) ป้อมปลายใบ (oval-oblong) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute) ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) กลมรี (oval) ปลายผล (fruit apex) แหลม (pointed) ลักษณะฐานผล (fruit base) ป้าน (flattened) ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) ปานกลาง (intermediate) 5-11 เซนติเมตร รูปร่างก้านผล (fruit peduncle shape) เรียบ (uniform) หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) นูนปลายแหลม (pointed-convex) หนามผลรอบจุดศูนย์กลางบริเวณปลายผล (fruit spine at the center point of distal) มีหนาม (present) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนามตรง (vertical spine) หนามรอบขั้วผล (proximal spine) หนามงุ้มเข้า (hooked)

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) ปานกลาง (medium) การออกดอก (flowering) น้อย (little) การติดผล (fruit setting) น้อย (little) ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้ 15 ปี (fruit bearing) 60-70 ผล ความยาวผล 24.4 เซนติเมตร ความกว้างผล 21.5 เซนติเมตร เส้นรอบวงผล 60.8 เซนติเมตร น้ำหนักผล (fruit weight) 3.11 กิโลกรัม ความกว้างปากปลิง 2.2 เซนติเมตร ความยาวจากขั้วผลถึงปากปลิง 5.9 เซนติเมตร น้ำหนักเนื้อต่อผล (flesh weight) 720 กรัม ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 1.67 เซนติเมตร สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) YO 10 C-11 B กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) ปานกลาง (intermediate) รสชาติของเนื้อ (taste) หวานมันพอดี ลักษณะของเนื้อ (fruit texture) หยาบ (coarse) เส้นใยในเนื้อ (fibre) มี (present) ปริมาณน้ำในเนื้อ (fruit juiciness) มาก (juicy) น้ำหนักเปลือก (shell weight) 2,130 กรัม สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) YG 152 D ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกว้าง (width) 4.2 เซนติเมตร ความยาว 7 เซนติเมตร รูปทรงของเมล็ด (shape of stone) ขอบขนาน (oblong) น้ำหนักเมล็ด (weight of stone) 230 กรัม ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตรงฤดูกาล (season) อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) 100-115 วัน

บันทึกเพิ่มเติม (notes)



ชื่อพันธุ์ ก้านสั้น (Kansan) หรือ สวาน้อยเรื่อนงาม (Saonoi Rueanngam)

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* Murray

ประวัติ แหล่งที่ค้นพบ จ. ปราจีนบุรี จ.นนทบุรี บางกอกน้อย กรุงเทพฯ

สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง

#### ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) **ไม่เป็นระเบียบ (not orderly)** ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) **ยาวเรียวยาว (linear-oblong)** ปลายใบ (leaf apex) **ป้อมโคนใบ (ovate-lanceolate)** ฐานใบ (leaf base) **แหลม (acute)** ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) **กลมรี (oval)** ปลายผล (fruit apex) **แหลม (pointed)** ลักษณะฐานผล (fruit base) **ป้าน (flattened)** ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) **สั้น (short) < 5 เซนติเมตร** รูปร่างก้านผล (fruit peduncle shape) **นูนน้อย (lip)** หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) **นูน (cinvex)** หนามผลรอบจุดศูนย์กลางบริเวณปลายผล (fruit spine at the center point of distal) **มีหนาม (present)** หนามปลายผล (fruit spine apex) **หนามตรง (vertical spine)** หนามรอบขั้วผล (proximal spine) **หนามงุ้มเข้า (hooked)**


#### ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) **ปานกลาง (medium)** การออกดอก (flowering) **ปานกลาง (intermediate)** ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้ 15 ปี (fruit bearing) **120 ผล** ความยาวผล **25 เซนติเมตร** ความกว้างผล **22 เซนติเมตร** เส้นรอบวงผล **64 เซนติเมตร** น้ำหนักผล (fruit weight) **2.8 กิโลกรัม** ความกว้างปากปลิง **2.23 เซนติเมตร** ความยาวจากขั้วผลถึงปากปลิง **3.72 เซนติเมตร** ความหนาเนื้อ (flesh thickness) **1.29 เซนติเมตร** กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) **อ่อน (mild)** รสชาติของเนื้อ (taste) **หวานมันพอดี** ลักษณะของเนื้อ (fruit texture) **ปานกลาง (medium)** เส้นใยในเนื้อ (fibre) **มี (present)** ปริมาณน้ำในเนื้อ (fruit juiciness) **น้อย (scarce)** สีเมล็ด (seed colour) **Y 14 D** ฤดูกาลผลิต (fruiting season) **ตรงฤดูกาล (season)** อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) **130 วัน**

#### บันทึกเพิ่มเติม (notes)



ชื่อพันธุ์	กำปันเดิม (Kampan Doem) หรือ กำปันขาว (Kampan Khao)
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Durio zibethinus</i> Murray
ประวัติ	เป็นพันธุ์ดั้งเดิม แหล่งที่ค้นพบ จ.นนทบุรี จ.ระยอง
สถานภาพพันธุ์	พันธุ์พื้นเมือง



**ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)**

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) **ไม่เป็นระเบียบ (not orderly)** ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) **รูปไข่ขอบขนาน (oval-oblong)** ปลายใบ (leaf apex) **cuadate-acuminate** ฐานใบ (leaf base) **แหลม (acute)** ดอก (flower) รูปร่างของดอกตูม (flower shape at preblossom stage) **แหลม (acute)** ปลายดอกตูม (flower apex) **แหลม (acute)** ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) **กลมรี (oval)** ปลายผล (fruit apex) **ป้าน (flattened)** ลักษณะฐานผล (fruit base) **ป้าน (flattened)** ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) **ปานกลาง (intermediate)** 5-11 เซนติเมตร รูปร่างก้านผล (fruit peduncle shape) **ขอบนูน (lip)** หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) **แหลม (pointed)** หนามผลรอบจุดศูนย์กลางบริเวณปลายผล (fruit spine at the center point of distal) **มีหนาม (present)** หนามปลายผล (fruit spine apex) **หนามงุ้มเข้า (hooked spine)** หนามรอบขั้วผล (proximal spine) **หนามงุ้มเข้า (hooked)**

**ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors)**

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) **ปานกลาง (intermediate)** การออกดอก (flowering) **ปานกลาง (intermediate)** การติดผล (fruit setting) **ปานกลาง (intermediate)** ความยาวผล **24.94 เซนติเมตร** ความกว้างผล **20.26 เซนติเมตร** เส้นรอบวงผล **57.22 เซนติเมตร** น้ำหนักผล (fruit weight) **2.97 กิโลกรัม** ความกว้างปากปลิง **2.18 เซนติเมตร** ความยาวจากขั้วผลถึงปากปลิง **4.4 เซนติเมตร** น้ำหนักเนื้อต่อผล (flesh weight) **914 กรัม** ความหนาเนื้อ (flesh thickness) **1.06 เซนติเมตร** สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) **Y12D,8D,10D,11B** กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) **ปานกลาง (intermediate)** รสชาติของเนื้อ (taste) **หวานมันพอดี** ลักษณะของเนื้อ (fruit texture) **ละเอียด (fine)** เส้นใยในเนื้อ (fibre) **ไม่มี (present)** ปริมาณน้ำในเนื้อ (fruit juiciness) **ปานกลาง (intermediate)** น้ำหนักเปลือก (shell weight) **1,560 กรัม** สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) **YG152A,YG153D,11C** จำนวนเมล็ดดิบต่อเมล็ดเต็ม **31/69** ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกว้าง (width) **2.78 เซนติเมตร** ความยาว **4.92 เซนติเมตร** รูปทรงของเมล็ด (shape of stone) **ขอบขนาน (oblong)** น้ำหนักเมล็ด (weight of stone) **100 กรัม** ฤดูกาลผลิต (fruiting season) **ตรงฤดูกาล (season)**

**บันทึกเพิ่มเติม (notes)**

---



---



---



---

ชื่อพันธุ์ กำป็นเนื้อแดง (Kampan Doem)  
หรือ กำป็นดำ (Kampan Dam)

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* Murray


ประวัติ แหล่งที่ค้นพบ จ. ปราจีนบุรี

จ.นนทบุรี

บางกอกน้อย กรุงเทพฯ

สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง

ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)



การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) **ไม่เป็นระเบียบ (not orderly)** ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) **ยาวเรียว (linear-oblong)** ปลายใบ (leaf apex) **caudate-acuminate** ฐานใบ (leaf base) **แหลม (acute)** ดอก (flower) รูปร่างของดอกตูม (flower shape at preblossom stage) **แหลม (acute)** ปลายดอกตูม (flower apex) **แหลม (acute)** ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) **ขอบขนาน (oblong)** ปลายผล (fruit apex) **แหลม (pointed)** ลักษณะฐานผล (fruit base) **ป้าน (flattened)** ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) **ปานกลาง (intermediate)** 5-11 เซนติเมตร รูปร่างก้านผล (fruit peduncle shape) **ขอบนูน (lip)** หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) **แหลม (pointed-convex)** หนามผลรอบจุดศูนย์กลางบริเวณปลายผล (fruit spine at the center point of distal) **ไม่มีหนาม (absent)** หนามปลายผล (fruit spine apex) **หนามตรง (vertical spine)** หนามรอบขั้วผล (proximal spine) **หนามงุ้มเข้า (hooked)**

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) **ปานกลาง (medium)** การออกดอก (flowering) **น้อย (little)** การติดผล (fruit setting) **น้อย (little)** ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้ 15 ปี (fruit bearing) **60-70 ผล** ความยาวผล **25.5 เซนติเมตร** ความกว้างผล **22.5 เซนติเมตร** เส้นรอบวงผล **64.75 เซนติเมตร** น้ำหนักผล (fruit weight) **3.3 กิโลกรัม** ความกว้างปากปลิง **2.26 เซนติเมตร** ความยาวจากขั้วผลถึงปากปลิง **7.56 เซนติเมตร** น้ำหนักเนื้อต่อผล (flesh weight) **815 กรัม** ความหนาเนื้อ (flesh thickness) **0.98 เซนติเมตร** สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) **GO 165 C-11 B** กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) **ปานกลาง (intermediate)** รสชาติของเนื้อ (taste) **หวานมากกว่ามัน** ลักษณะของเนื้อ (fruit texture) **ละเอียด (fine)** เส้นใยในเนื้อ (fibre) **ไม่มี (present)** ปริมาณน้ำในเนื้อ (fruit juiciness) **น้อย (scarce)** น้ำหนักเปลือก (shell weight) **2,098 กรัม** สีเปลือกผลสุก (skin colour of ripe fruit) **Y 10 C** จำนวนเมล็ดลึบต่อเมล็ดเต็ม **37/63** ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกว้าง (width) **3.81 เซนติเมตร** ความยาว **6.03 เซนติเมตร** รูปทรงของเมล็ด (shape of stone) **ขอบขนาน (oblong)** น้ำหนักเมล็ด (weight of stone) **360 กรัม** ฤดูกาลผลิต (fruiting season) **ตรงฤดูกาล (season)** อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) **100-115 วัน**

บันทึกเพิ่มเติม (notes)

---

---

---

---

---

ชื่อพันธุ์ กำปันเนื้อเหลือง (Kampan Nucaleuang)  
หรือ เจ้ากรม (Chaokrom)

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* Murray


ประวัติ เพาะจากเมล็ดกำปันขาว ที่สวนวัด  
เสาวคนธ์

ต.บางยี่ขัน อ.บางกอกน้อย กรุงเทพฯ

แหล่งที่ค้นพบ ดลิ่งชัน กรุงเทพฯ

สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง

ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)



การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) **ไม่เป็นระเบียบ (not orderly)** ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) **ยาวเรียว (linear-oblong)** ปลายใบ (leaf apex) **caudate-acuminate** ฐานใบ (leaf base) **แหลม (acute)** ดอก (flower) รูปร่างของดอกตูม (flower shape at preblossom stage) **กลม (rounded)** ปลายดอกตูม (flower apex) **มน (obtuse)** ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) **ขอบขนาน (oblong)** ปลายผล (fruit apex) **แหลม (pointed)** ลักษณะฐานผล (fruit base) **ป้าน (flattened)** ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) **ปานกลาง (medium)** 5-11 เซนติเมตร รูปร่างก้านผล (fruit peduncle shape) **ขอบมน (lip)** หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) **แหลม (pointed)** หนามผลรอบจุดศูนย์กลางบริเวณปลายผล (fruit spine at the center point of distal) **ไม่มีหนาม (absent)** หนามปลายผล (fruit spine apex) **หนามตรง (vertical spine)** หนามรอบขั้วผล (proximal spine) **หนามตรง (vertical)**

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) **ปานกลาง (intermediate)** การออกดอก (flowering) **ปานกลาง (intermediate)** การติดผล (fruit setting) **น้อย (little)** ความยาวผล **23.61 เซนติเมตร** ความกว้างผล **19.04 เซนติเมตร** เส้นรอบวงผล **60.58 เซนติเมตร** น้ำหนักผล (fruit weight) **2.93 กิโลกรัม** ความกว้างปากปลิง **2.57 เซนติเมตร** ความยาวจากขั้วผลถึงปากปลิง **4.63 เซนติเมตร** น้ำหนักเนื้อต่อผล (flesh weight) **790 กรัม** ความหนาเนื้อ (flesh thickness) **1.87 เซนติเมตร** สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) **YG 4 D** กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) **มีกลิ่นอ่อน (mild)** รสชาติของเนื้อ (taste) **มันมากกว่าหวาน** ลักษณะของเนื้อ (fruit texture) **ละเอียด (fine)** เส้นใยในเนื้อ (fibre) **ไม่มี (absent)** ปริมาณน้ำในเนื้อ (fruit juiciness) **ปานกลาง (intermediate)** น้ำหนักเปลือก (shell weight) **1,800 กรัม** สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) **YG 147 C** จำนวนเมล็ดดิบ/เมล็ดเต็ม **48/52** ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกว้าง (width) **3.71 เซนติเมตร** ความยาว **5.31 เซนติเมตร** น้ำหนักเมล็ด (weight of stone) **210 กรัม** ฤดูกาลผลิต (fruiting season) **ตรงฤดูกาล (season)** อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) **140-150 วัน**

บันทึกเพิ่มเติม (notes)

---

---

---

---

ชื่อพันธุ์ กำปันทาเพ่ง (Kampan Taphang)  
ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* Murray  
ประวัติ เพาะจากเมล็ดกำปันทาเพ่ง  
แหล่งที่ค้นพบ จ. นนทบุรี จ. จันทบุรี  
สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง



#### ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไม่เป็นระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) ยาวเรียว (linear-oblong) ปลายใบ (leaf apex) caudate-acuminate ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute) ดอก (flower) รูปร่างของดอกตูม (flower shape at preblossom stage) ขอบขนาน (oblong) ปลายดอกตูม (flower apex) แหลม (acute) ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) ขอบขนาน (oblong) ปลายผล (fruit apex) แหลม (pointed) ลักษณะฐานผล (fruit base) ปาน (flattened) ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร รูปร่างก้านผล (fruit peduncle shape) ขอบนูน (lip) หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) แหลม (pointed) หนามผลรอบจุดศูนย์กลางบริเวณปลายผล (fruit spine at the center point of distal) มีหนาม (present) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนามตรง (vertical spine) หนามรอบขั้วผล (proximal spine) หนามงุ้มเข้า (hooked)

#### ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) ปานกลาง (intermediate) การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล (fruit setting) น้อย (little) กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) มีกลิ่นอ่อน (mild) รสชาติของเนื้อ (taste) หวานมันพอดี ลักษณะของเนื้อ (fruit texture) ละเอียด (fine) เส้นใยในเนื้อ (fibre) ไม่มี (absent) ปริมาณน้ำในเนื้อ (fruit juiciness) น้อย (scarce)

#### บันทึกเพิ่มเติม (notes)

---

ชื่อพันธุ์ กำปันทาบางสีทอง  
(Kampan Bangsithong)  
ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* Murray  
สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง

#### ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

---

#### ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล (fruit setting) มาก (abundant) ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้ 15 ปี (fruit bearing) 100-120 ผล ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตรงฤดูกาล (season) อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) 120 วัน

#### บันทึกเพิ่มเติม (notes)

---

ชื่อพันธุ์ กำป่วนพวง (Kampan Phuang)

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* Murray

สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง

### ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) **ไม่เป็นระเบียบ (not orderly)** ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) **ป้อมกลางใบ (elliptical)** ปลายใบ (leaf apex) **caudate -acuminate** ฐานใบ (leaf base) **แหลม (acute)** ดอก (flower) ปลายดอกตูม (flower apex) **แหลม (acute)** ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) **ขอบขนาน (oblong)** ปลายผล (fruit apex) **แหลม (point)** ลักษณะฐานผล (fruit base) **ป้าน (flattened)** ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) **ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร** หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) **แหลม (pointed)** หนามผลรอบจุดศูนย์กลางบริเวณปลายผล (fruit spine at the center point of distal) **ไม่มีหนาม (absent)** หนามปลายผล (fruit spine apex) **หนามตรง (vertical spine)** หนามรอบขั้วผล (proximal spine) **หนามงุ้มเข้า (hooked spine)**

### ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) **ปานกลาง (intermediate)** การออกดอก (flowering) **ปานกลาง (intermediate)** การติดผล (fruit setting) **น้อย (little)** กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) **มีกลิ่นอ่อน (mild)** รสชาติของเนื้อ (taste) **หวานมันพอดี** ลักษณะของเนื้อ (fruit texture) **ละเอียด (fine)** ปริมาณน้ำในเนื้อ (fruit juiciness) **น้อย (scarce)** ฤดูกาลผลิต (fruiting season) **ตรงฤดูกาล (season)**

### บันทึกเพิ่มเติม (notes)

---

---

---

---

---

---

---

---



ชื่อพันธุ์ ชุนนนท์ (Khun Non)  
 ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* Murray  
 สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง  
 ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)


ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) **ป้อมปลายใบ (obovate-lanceolate)** ปลายใบ (leaf apex) **เรียวแหลม (acuminate)**  
 ฐานใบ (leaf base) **มน (obtuse)** ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) **กลม (rounded)** ปลายผล (fruit apex) **ป้าน (flattened)** ลักษณะ  
 ฐานผล (fruit base) **ป้าน (flattened)** ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) **สั้น (short) <5 เซนติเมตร** รูปร่างก้านผล (fruit  
 peduncle shape) **ขอบนูน (lip)** หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) **เว้าปลายแหลม (pointed-concave)**  
 หนามผลรอบจุดศูนย์กลางบริเวณปลายผล (fruit spine at the center point of distal) **ไม่มีหนาม (absent)** หนามปลายผล (fruit  
 spine apex) **หนามตรง (vertical spine)** หนามรอบขั้วผล (proximal spine) **หนามตรง (vertical)**

**ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors)**

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) **เร็ว** การออกดอก (flowering) **ปานกลาง (intermediate)** การติดผล (fruit setting)  
**ปานกลาง (intermediate)** ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้ 15 ปี (fruit bearing) **100 ผล** ความยาวผล **16 เซนติเมตร** ความกว้างผล **16.6**  
**เซนติเมตร** เส้นรอบวงผล **51.33 เซนติเมตร** น้ำหนักผล (fruit weight) **1.48 กิโลกรัม** ความกว้างปากปลิง **1.45 เซนติเมตร** ความ  
 ยาวจากขั้วผลถึงปากปลิง **5.20 เซนติเมตร** น้ำหนักเนื้อต่อผล (flesh weight) **386.66 กรัม** ความหนาเนื้อ (flesh thickness) **0.86**  
**เซนติเมตร** สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) **Y 11 C** กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) **อ่อน (mild)** รสชาติของเนื้อ (taste) **หวาน**  
**มากกว่ามัน** ลักษณะของเนื้อ (fruit texture) **ปานกลาง (medium)** เส้นใยในเนื้อ (fibre) **มี (present)** ปริมาณน้ำในเนื้อ (fruit  
 juiciness) **น้อย (little)** น้ำหนักเปลือก (shell weight) **866.66 กรัม** สีเปลือก (shell colour) **YG 146 C** จำนวนเมล็ดต่อผล (seed count)  
**47/53** ความกว้างของเมล็ด **2.25 เซนติเมตร** ความยาวของเมล็ด **4.42 เซนติเมตร** รูปทรงของเมล็ด (shape of stone) **ขอบขนาน**  
**(oblong)** สีของเมล็ด (stone colour) **GO 164 B** น้ำหนักเมล็ด (weight of stone) **226.66 กรัม** ฤดูกาลผลิต (fruiting season) **ตรง**  
**ฤดูกาล (season)** อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) **120 วัน**

**บันทึกเพิ่มเติม (notes)**

-----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----



ชื่อพันธุ์	ขุนทอง (Khunthong)
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Durio zibethinus</i> Murray
ประวัติ	แหล่งที่ค้นพบ จ.จันทบุรี
สถานภาพพันธุ์	พันธุ์พื้นเมือง

**ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)**

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) **ไม่เป็นระเบียบ (not orderly)** ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) **ขอบขนาน (oblong)** ปลายใบ (leaf apex) **แหลมเรียว (acuminate-acute)** ฐานใบ (leaf base) **แหลม (acute)** ดอก (flower) รูปร่างของดอกตูม (flower shape at preblossom stage) **รูปไข่ (ovate)** ปลายดอกตูม (flower apex) **มน (obtus)** ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) **กลมแป้น (oblate)** ปลายผล (fruit apex) **ป้าน (flattened)** ลักษณะฐานผล (fruit base) **นูน (depressed)** ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) **ปานกลาง (medium)** 5-11 เซนติเมตร รูปร่างก้านผล (fruit peduncle shape) **ขอบนูน (lip)** หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) **นูนปลายแหลม (pointed)** หนามปลายผล (fruit spine apex) **หนามตรง (vertical spine)** หนามรอบขั้วผล (proximal spine) **หนามงุ้มเข้า (hooked)**

**ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors)**

การออกดอก (flowering) **น้อย (little)** การติดผล (fruit setting) **มาก (abundant)** ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุ 15 ปี 1 (fruit bearing) 100-120 ผล ความยาวผล 18.5 เซนติเมตร ความกว้างผล 16.4 เซนติเมตร เส้นรอบวงผล 56 เซนติเมตร น้ำหนักผล (fruit weight) 1.53 กิโลกรัม ความกว้างปากปลิง 2.06 เซนติเมตร ความยาวจากขั้วผลถึงปากปลิง 8.31 เซนติเมตร น้ำหนักเนื้อต่อผล (flesh weight) 356 กรัม ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 0.87 เซนติเมตร สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) **YO 10A, 11A** กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) **ปานกลาง (intermediate)** รสชาติของเนื้อ (taste) **หวานมันพอดี** ลักษณะของเนื้อ (fruit texture) **ละเอียด (fine)** เส้นใยในเนื้อ (fibre) **ไม่มี (absent)** ปริมาณน้ำในเนื้อ (fruit juiciness) **ปานกลาง (intermediate)** น้ำหนักเปลือก (shell weight) 955 กรัม สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) **YC 145 A** ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกว้าง (width) 2.6 เซนติเมตร ความยาว 4.6 เซนติเมตร รูปทรงของเมล็ด (shape of stone) **ขอบขนาน (oblong)** น้ำหนักเมล็ด (weight of stone) 223 กรัม ฤดูกาลผลิต (fruiting season) **ตรงฤดูกาล (season)** อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) 120 วัน

**บันทึกเพิ่มเติม (notes)**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....

.....

.....



ชื่อพันธุ์	เขี้ยวตำลึง (Khiaotamlueng)
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Durio zibethinus</i> Murray
ประวัติ	แหล่งที่ค้นพบ สวนนายจงบ เมทวัน จ.จันทบุรี
สถานภาพพันธุ์	พันธุ์พื้นเมือง

ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) **ไม่เป็นระเบียบ (not orderly)** ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) **รูปไข่ขอบขนาน (oval-oblong)** ปลายใบ (leaf apex) **แหลมเรียว (acuminate-acute)** ฐานใบ (leaf base) **แหลม (acute)** ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) **กลมรี (oval)** ปลายผล (fruit apex) **ป้าน (flattened)** ลักษณะฐานผล (fruit base) **ป้าน (flattened)** ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) **ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร** รูปร่างก้านผล (fruit peduncle shape) **ขอบนูน (lip)** หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) **นูนปลายแหลม (pointed-convex)** หนามผลรอบจุดศูนย์กลางปลายผล (fruit spine at the center point of distal) **ไม่มีหนาม (absent)** หนามปลายผล (fruit spine apex) **หนามตรง (vertical spine)** หนามรอบข้อผล (proximal spine) **หนามงุ้มเข้า (hooked)**

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors)

ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้ 15 ปี (fruit bearing) **100-120 ผล** อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) **100-120 วัน**

บันทึกเพิ่มเติม (notes)

---



---



---



---

ชื่อพันธุ์	จอกถอย (Chok-loi)
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Durio zibethinus</i> Murray
ประวัติ	แหล่งที่ค้นพบ จ.นนทบุรี จ.ระยอง
สถานภาพพันธุ์	พันธุ์พื้นเมือง

**ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)**

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) **ไม่เป็นระเบียบ (not orderly)** ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) **ขอบขนาน (oblong)** ปลายใบ (leaf apex) **เรียวแหลม (acuminate)** ฐานใบ (leaf base) **แหลม (acute)** ดอก (flower) รูปร่างของดอกตูม (flower shape at preblossom stage) **กลมรีขอบขนาน (oval-oblong)** ปลายดอกตูม (flower apex) **มน (obtuse)** ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) **ทรงรี (elliptic)** ปลายผล (fruit apex) **ป้าน (flattened)** ลักษณะฐานผล (fruit base) **ป้าน (flattened)** ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) **ปานกลาง (medium)** 5-11 เซนติเมตร รูปร่างก้านผล (fruit peduncle shape) **ขอบนูน (lip)** หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) **นูนปลายแหลม (pointed-convex)** หนามผลรอบจุดศูนย์กลางบริเวณปลายผล (fruit spine at the center point of distal) **มีหนาม (present)** หนามปลายผล (fruit spine apex) **หนามตรง (vertical spine)** หนามรอบขั้วผล (proximal spine) **หนามตรง (vertical)**

**ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors)**

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) **เร็ว** การออกดอก (flowering) **มาก (abundant)** การติดผล (fruit setting) **ปานกลาง (intermediate)** ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้ 15 ปี (fruit bearing) **100-120 ผล** ความยาวผล **18.7 เซนติเมตร** ความกว้างผล **13.5 เซนติเมตร** เส้นรอบวงผล **44.4 เซนติเมตร** น้ำหนักผล (fruit weight) **1.05 กิโลกรัม** ความกว้างปากปลิง **1.84 เซนติเมตร** ความยาวจากขั้วผลถึงปากปลิง **5.24 เซนติเมตร** น้ำหนักเนื้อต่อผล (flesh weight) **170 กรัม** ความหนาเนื้อ (flesh thickness) **0.81 เซนติเมตร** สีเนื้อผลดิบ (flesh colour of mature green fruit) **YG 165 B** กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) **มีกลิ่นอ่อน (mild)** รสชาติของเนื้อ (taste) **หวานมาก** ลักษณะของเนื้อ (fruit texture) **หยาบ (coarse)** เส้นใยในเนื้อ (fibre) **มี (present)** ปริมาณน้ำในเนื้อ (fruit juiciness) **มาก (juicy)** จำนวนพูต่อผล (carpel) **1/3** สีเปลือกผลสุก (skin colour of ripe fruit) **YO 16 C** ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกว้าง (width) **2.58 เซนติเมตร** ความยาว **5.56 เซนติเมตร** น้ำหนักเมล็ด (weight of stone) **80 กรัม** ฤดูกาลผลิต (fruiting season) **ตรงฤดูกาล (season)** อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) **100-120 วัน**

**บันทึกเพิ่มเติม (notes)**

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----



ชื่อพันธุ์ จำปา (Champa)  
 ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* Murray  
 ประวัติ เพาะจากเมล็ดกำป่น  
 แหล่งที่ค้นพบ จ.จันทบุรี จ.ระยอง  
 สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง

ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)


ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) **ป้อมปลายใบ (obovate- lanceolate)** ปลายใบ (leaf apex) **acuminate curve** ฐานใบ (leaf base) **เรียว (cuneate- acute)** ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) **กลม (rounded)** ปลายผล (fruit apex) **แหลม (pointed)** ลักษณะฐานผล (fruit base) **นูน (depressed)** ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) **สั้น (short) < 5 เซนติเมตร** รูปร่างก้านผล (fruit peduncle shape) **ขอบนูน (lip)** หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) **แหลม (pointed)** หนามผลรอบจุดศูนย์กลางบริเวณปลายผล (fruit spine at the center point of distal) **ไม่มีหนาม (absent)** หนามปลายผล (fruit spine apex) **หนามตรง (vertical spine)** หนามรอบขั้วผล (proximal spine) **หนามงุ้มเข้า (hooked)**

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) **ปานกลาง (medium)** การออกดอก (flowering) **ปานกลาง(intermediate)** ความยาวผล **23.5 เซนติเมตร** ความกว้างผล **20.5 เซนติเมตร** เส้นรอบวงผล **67.5 เซนติเมตร** น้ำหนักผล (fruit weight) **3.3 กิโลกรัม** ความกว้างปากปลิง **1.7 เซนติเมตร** ความยาวจากขั้วผลถึงปากปลิง **8.5 เซนติเมตร** น้ำหนักเนื้อ (flesh weight) **1,150 กรัม** ความหนาเนื้อ (flesh thickness) **1.0 เซนติเมตร** สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) **Y 14 B** กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) **กลิ่นแรง (strong)** รสชาติของเนื้อ (taste) **หวานมากกว่ามัน** ลักษณะของเนื้อ (flesh texture) **มีละเอียด (fine)** เส้นใยในเนื้อ (fiber) **ไม่มี (absent)** ปริมาณน้ำในเนื้อ (fruit juiciness) **น้อย (scarce)** น้ำหนักเปลือก **1,650 กรัม** สีเปลือกผลสุก (skin colour of ripe fruit) **GO 166 D** จำนวนเมล็ดต่อบต่อเมล็ดเต็ม **58/42** ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกว้าง (width) **2.5 เซนติเมตร** ความยาว **5.9 เซนติเมตร** รูปทรงของเมล็ด (shape of stone) **ขอบขนาน (oblong)** สีเมล็ด (stone colour) **GO 105 B** น้ำหนักเมล็ด (weight of stone) **500 กรัม** ฤดูกาลผลิต (fruiting season) **ตรงฤดูกาล (season)**

บันทึกเพิ่มเติม (notes)

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....



ชื่อพันธุ์	ฉัตร (Chat)
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Durio zibethinus</i> Murray
ประวัติ	ได้จากการเพาะเมล็ดทองฮ้อย
แหล่งที่ค้นพบ	จ.นนทบุรี จ.จันทบุรี จ.ระยอง
สถานภาพพันธุ์	พันธุ์พื้นเมือง

#### ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) **ไม่เป็นระเบียบ (not orderly)** ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) **ป้อมโคนใบ (ovate-lanceolate)** ปลายใบ (leaf apex) **เรียวแหลม (acuminate)** ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) **รูปไข่ (ovate)** ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) **ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร** หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) **นูนปลายแหลม (pointed-convex)** หนามรอบจุดศูนย์กลางบริเวณปลายผล (fruit spine at the center point of distal ) **ไม่มีหนาม (absent)** หนามปลายผล (fruit spine apex) **หนามตรง (vertical spine)** หนามรอบขั้วผล (proximal spine) **หนามงุ้มเข้า (hooked spine)**

#### ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) **เร็ว** การออกดอก (flowering) **ปานกลาง (intermediate)** การติดผล (fruit setting) **มาก (abundant)** ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้ 15 ปี (fruit bearing) **70-100 ผล** ลักษณะของเนื้อ (flesh texture) **ละเอียด (coarse)** เส้นใยในเนื้อ (fibre) **ไม่มี (absent)** ปริมาณน้ำในเนื้อ (fruit juiciness) **ปานกลาง (intermediate)** ฤดูกาลผลิต (fruiting season) **ตรงฤดูกาล (season)** อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) **100-110 วัน**

#### บันทึกเพิ่มเติม (notes)

---

ชื่อพันธุ์	ฉัตรสีนาค (Chat Si-ant)
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Durio zibethinus</i> Murray
ประวัติ	ได้จากการเพาะเมล็ดทองฮ้อย
แหล่งที่ค้นพบ	จ.นนทบุรี จ.จันทบุรี จ.ระยอง
สถานภาพพันธุ์	พันธุ์พื้นเมือง

#### ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) **ไม่เป็นระเบียบ (not orderly)** ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) **ป้อมโคนใบ (ovate-lanceolate)** ปลายใบ (leaf apex) **เรียวแหลม (acuminate)** ฐานใบ (leaf base) **มน (obtuse)** ผล (fruit ) ทรงผล (fruit shape) **รูปไข่ (ovate)** ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) **ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร** หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) **นูนปลายแหลม (pointed-convex)** หนามผลรอบจุดศูนย์กลางบริเวณปลายผล (fruit spine at the center point of distal) **ไม่มีหนาม (absent)** หนามปลายผล (fruit spine apex) **หนามตรง (vertical spine)** หนามรอบขั้วผล (proximal spine) **หนามงุ้มเข้า (hooked)**

#### ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) **เร็ว** การออกดอก (flowering) **ปานกลาง (intermediate)** การติดผล (fruit setting) **มาก (abundant)** ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้ 15 ปี (fruit bearing) **70-100 ผล** ฤดูกาลผลิต (fruiting season) **ตรงฤดูกาล (season)** อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) **100-110 วัน**

#### บันทึกเพิ่มเติม (notes)

---

ชื่อพันธุ์	ฉัตรสีทอง (Chat Sihong)
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Durio zibethinus</i> Murray
แหล่งที่ค้นพบ	จ.จันทบุรี และ จ.อุตรดิตถ์
สถานภาพพันธุ์	พันธุ์พื้นเมือง

**ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)**

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) **ไม่เป็นระเบียบ (not orderly)** ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) **ป้อมโคนใบ (ovate-lanceolate)** ปลายใบ (leaf apex) **เรียวแหลม (acuminate)** ฐานใบ (leaf base) **มน (obtuse)** ดอก (flower) รูปร่างของดอกตูม (flower shape at preblossom stage) **กลม (rounded)** ปลายดอกตูม (flower apex) **กลม (rounded)** ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) **รูปไข่ (ovate)** ปลายผล (fruit apex) **แหลม (pointed)** ลักษณะฐานผล (fruit base) **ป้าน (flattened)** ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) **ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร** รูปร่างก้านผล (fruit peduncle shape) **ขอบนูน (lip)** หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) **นูนปลายแหลม (pointed-convex)** หนามผลรอบจุดศูนย์กลางบริเวณปลายผล (fruit spine at the center point of distal) **ไม่มีหนาม (absent)** หนามปลายผล (fruit spine apex) **หนามตรง (vertical spine)** หนามรอบขั้วผล (proximal spine) **หนามงุ้มเข้า (hooked)**

**ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors)**

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) **เร็ว** การออกดอก (flowering) **ปานกลาง (intermediate)** การติดผล (fruit setting) **มาก (abundant)** ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้ 15 ปี (fruit bearing) **70-100 ผล** ความยาวผล **22.52 เซนติเมตร** ความกว้างผล **21.64 เซนติเมตร** เส้นรอบวงผล **67.64 เซนติเมตร** น้ำหนักผล (fruit weight) **3.15 กิโลกรัม** ความกว้างปากปลิง **2.43 เซนติเมตร** ความยาวจากขั้วผลถึงปากปลิง **5.07 เซนติเมตร** น้ำหนักเนื้อ (flesh weight) **956 กรัม** ความหนาเนื้อ (flesh thickness) **1.16 เซนติเมตร** สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) **YO15 BC** กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) **มีกลิ่นอ่อน (mild)** รสชาติของเนื้อ (taste) **ปานกลาง** ลักษณะของเนื้อ (flesh texture) **ละเอียด (fine)** เส้นใยในเนื้อ (fibre) **ไม่มี (absent)** ปริมาณน้ำในเนื้อ (fruit juiciness) **ปานกลาง (intermediate)** น้ำหนักเปลือก (shell weight) **1,772 กรัม** เปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) **YG146B** จำนวนเมล็ดดิบต่อเมล็ดเต็ม **18/82** ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกว้าง (width) **3.71 เซนติเมตร** ความยาว **4.71 เซนติเมตร** รูปทรงของเมล็ด (shape of stone) **ขอบขนาน (oblong)** น้ำหนักเมล็ด (weight of stone) **422 กรัม** ฤดูกาลผลิต (fruiting season) **ตรงฤดูกาล (season)** อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) **100-110 วัน**

**บันทึกเพิ่มเติม (notes)**

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----


-----

-----

-----

-----

-----



ชื่อพันธุ์	ชมพูปาน (Chomphu Phan)
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Durio zibethinus</i> Murray
แหล่งที่ค้นพบ	จ.จันทบุรี จ.ระยอง
สถานภาพพันธุ์	พันธุ์พื้นเมือง

#### ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) **ไม่เป็นระเบียบ (not orderly)** ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) **ยาวเรียว (linear-oblong)** ปลายใบ (leaf apex) **caudate-acuminate** ฐานใบ (leaf base) **แหลม (acute)** ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) **ขอบขนาน (oblong)** ปลายผล (fruit apex) **แหลม (pointed)** ลักษณะฐานผล (fruit base) **ป้าน (flattened)** ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) **ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร** รูปร่างก้านผล (fruit peduncle shape) **ขอบนูน (lip)** หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) **แหลม (pointed)** หนามผลรอบจุดศูนย์กลางปลายผล (fruit spine at the center point of distal) **มีหนาม (present)** หนามปลายผล (fruit spine apex) **หนามตรง (vertical spine)** หนามรอบขั้วผล (proximal spine) **หนามตรง (vertical)**

#### ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors)

#### บันทึกเพิ่มเติม (notes)

ชื่อพันธุ์	ชมพूसรี (Chomphu Sri)
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Durio zibethinus</i> Murray
ประวัติ	เพาะจากเมล็ดคลวง แหล่งที่ค้นพบ จ.จันทบุรี
สถานภาพพันธุ์	พันธุ์พื้นเมือง

#### ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) **ไม่เป็นระเบียบ (not orderly)** ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) **รูปขอบขนาน (oblong)** ปลายใบ (leaf apex) **แหลมเรียว (acuminate-acute)** ฐานใบ (leaf base) **แหลม (acute)** ดอก (flower) รูปร่างของดอกตูม (flower shape at preblossom stage) **กลม (rounded)** ปลายดอกตูม (flower apex) **แหลม (acute)** ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) **ทรงกระบอก (cylindrical)** ปลายผล (fruit apex) **ป้าน (flattened)** ลักษณะฐานผล (fruit base) **ป้าน (flattened)** ความยาวก้านผล (peduncle length) **ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร** รูปร่างก้านผล (fruit peduncle shape) **ขอบนูน (lip)** หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) **เว้า (concave)** หนามผลรอบจุดศูนย์กลางปลายผล (fruit spine at the center point of distal) **ไม่มีหนาม (absent)** หนามปลายผล (fruit spine apex) **หนามงุ้มเข้า (hooked spine)** หนามรอบขั้วผล (proximal spine) **หนามงุ้มเข้า (hooked)**

#### ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) **เร็ว** การออกดอก (flowering) **ปานกลาง (intermediate)** การติดผล (fruit setting) **ปานกลาง (intermediate)** ความยาวผล **28 เซนติเมตร** ความกว้างผล **23 เซนติเมตร** เส้นรอบวงผล **69 เซนติเมตร** น้ำหนักผล (fruit weight) **3.8 กิโลกรัม** ลักษณะของเนื้อ (flesh texture) **หยาบ (coarse)** เส้นใยในเนื้อ (fibre) **มี (present)** ปริมาณน้ำในเนื้อ (fruit juiciness) **มาก (abundant)** สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) **YG 152 C** ฤดูกาลผลิต (fruiting season) **ตรงฤดูกาล (season)**

#### บันทึกเพิ่มเติม (notes)



ชื่อพันธุ์	ชะนี (Chani)
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Durio zibethinus</i> Murray
ประวัติ	เพาะจากเมล็ดหลวง แหล่งที่ค้นพบ จ. จันทบุรี และ จ.ระยอง
สถานภาพพันธุ์	พันธุ์พื้นเมือง

**ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)**

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) **ไม่เป็นระเบียบ (not orderly)** ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) **รูปไข่ขอบขนาน (oval-oblong)** ปลายใบ (leaf apex) **เรียวแหลม (acuminate)** ฐานใบ (leaf base) **แหลม (acute)** ดอก (flower) รูปร่างของดอกตูม (flower shape at preblossom stage) **รูปไข่กลับ (obovate)** ปลายดอกตูม (flower apex) **แหลม (acute)** ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) **กลมรี (oval)** ปลายผล (fruit apex) **ป้าน (flattened)** ลักษณะฐานผล (fruit base) **ป้าน (flattened)** ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) **ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร** รูปร่างก้านผล (fruit peduncle shape) **ขอบมน (lip)** หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) **มนปลายแหลม (pointed-convex)** หนามผลรอบจุดศูนย์กลางปลายผล (fruit spine at the center point of distal) **ไม่มีหนาม (absent)** หนามปลายผล (fruit spine apex) **หนามตรง (vertical spine)** หนามรอบขั้วผล (proximal spine) **หนามตรง (vertical)**

**ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors)**

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) **เร็ว** การออกดอก (flowering) **มาก (abundant)** การติดผล (fruit setting) **ปานกลาง (intermediate)** ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้ 15 ปี (fruit bearing) **100-110 ผล** ความยาวผล **24 เซนติเมตร** ความกว้างผล **17 เซนติเมตร** เส้นรอบวงผล **55 เซนติเมตร** น้ำหนักผล (fruit weight) **3 กิโลกรัม** ความกว้างปากปลิง **2.5 เซนติเมตร** ความยาวจากขั้วผลถึงปากปลิง **5.5 เซนติเมตร** น้ำหนักเนื้อ (flesh weight) **740 กรัม** ความหนาเนื้อ (flesh thickness) **1.66 เซนติเมตร** สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) **YO16 B** กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) **มีกลิ่นอ่อน (mild)** รสชาติของเนื้อ (taste) **หวานมาก** ลักษณะของเนื้อ (flesh texture) **ละเอียด (fine)** เส้นใยในเนื้อ (fibre) **ไม่มี (absent)** ปริมาณน้ำในเนื้อ (fruit juiciness) **ปานกลาง (intermediate)** น้ำหนักเปลือก (shell weight) **1,480 กรัม** สีเปลือกผลสุก (skin colour of ripe fruit) **Y146 D** จำนวนเมล็ดต่อบทผลัดเต็ม **70/30** ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกว้าง (width) **3.65 เซนติเมตร** ความยาว **5.5 เซนติเมตร** รูปทรงของเมล็ด (shape of stone) **ขอบขนาน (oblong)** น้ำหนักเมล็ด (weight of stone) **180 กรัม** ฤดูกาลผลิต (fruiting season) **ตรงฤดูกลาง (season)** อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) **117 วัน**

**บันทึกเพิ่มเติม (notes)**

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----



ชื่อพันธุ์ ชะนีก้านยาว (Chani Kanyao)

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* Murray

สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง

ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไม่เป็นระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) ข้อมโคนใบ (ovate lanceolate) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute) ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) กลมแป้น (oblate) ปลายผล (fruit apex) ป้าน (flattened) ลักษณะฐานผล (fruit base) ป้าน (flattened) ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร รูปร่างก้านผล (fruit peduncle shape) ขอบนูน (lip) หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) เว้าปลายแหลม (pointed concave) หนามผลรอบจุดศูนย์กลางปลายผล (fruit spine at the center point of distal) ไม่มีหนาม (absent) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนามตรง (vertical spine) หนามรอบขั้วผล (proximal spine) หนามตรง (vertical)

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) ปานกลาง (medium) การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate) การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate) ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้ 15 ปี (fruit bearing) 120 ผล ความยาวผล 18.66 เซนติเมตร ความกว้างผล 16.33 เซนติเมตร เส้นรอบวงผล 50.66 เซนติเมตร น้ำหนักผล (fruit weight) 1.52 กิโลกรัม ความกว้างปากปลิง 1.56 เซนติเมตร ความยาวจากขั้วผลถึงปากปลิง 7.8 เซนติเมตร น้ำหนักเนื้อ (flesh weight) 483.33 กรัม ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 0.05 เซนติเมตร สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) Y 10 C กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) มีกลิ่นอ่อน (mild) รสชาติของเนื้อ (taste) มันมากกว่าหวาน ลักษณะของเนื้อ (flesh texture) ปานกลาง (medium) เส้นใยในเนื้อ (fiber) น้อย (less) ปริมาณน้ำในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate) น้ำหนักเปลือก (flesh weight) 686.66 กรัม สีเปลือกผลสุก (skin colour of ripe fruit) GO 152 C จำนวนเมล็ดตีสต่อเมล็ดเต็ม 5/95 ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกว้าง (width) 3.28 เซนติเมตร ความยาว 5.36 เซนติเมตร รูปทรงของเมล็ด (shape of stone) ขอบขนาน (oblong) สีของเมล็ด (stone colour) GO 165 B น้ำหนักเมล็ด (weight of stone) 350 กรัม ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตรงฤดูกาล (season) อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) 130 วัน

บันทึกเพิ่มเติม (notes)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



ชื่อพันธุ์	ชะนีกิ่งม้วน (Chani Kingmuan)
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Durio zibethinus</i> Murray
ประวัติ	เพาะจากเมล็ดหลวง แหล่งที่ค้นพบ จ.จันทบุรี จ.ระยอง
สถานภาพพันธุ์	พันธุ์พื้นเมือง

#### ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) **ไม่เป็นระเบียบ (not orderly)** ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) **ขอบขนาน (oblong)** ปลายใบ (leaf apex) **แหลมเรียว (acuminate-acute)** ฐานใบ (leaf base) **แหลม (acute)** ดอก (flower) รูปร่างดอกตูม (flower shape at preblossom stage) **รูปไข่กลับ (obovate)** ปลายดอกตูม (flower apex) **แหลม (acute)** ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) **กลมรี (oval)** ปลายผล (fruit apex) **ป้าน (flattened)** ลักษณะฐานผล (fruit base) **ป้าน (flattened)** ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) **ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร** รูปร่างก้านผล (fruit peduncle shape) **ขอบนูน (lip)** หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) **เว้า (concave)** หนามผลรอบจุดศูนย์กลางปลายผล (fruit spine at the center point of distal) **ไม่มีหนาม (absent)** หนามปลายผล (fruit spine apex) **หนามตรง (vertical spine)** หนามรอบขั้วผล (proximal spine) **หนามตรง (vertical)**

#### ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) **เร็ว** การออกดอก (flowering) **มาก (abundant)** การติดผล (fruit setting) **ปานกลาง (intermediate)** ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้ 15 ปี (fruit bearing) **100-110 ผล** กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) **มีกลิ่นอ่อน (mild)** รสชาติของเนื้อ (taste) **หวานมากกว่ามัน** ลักษณะของเนื้อ (flesh texture) **ละเอียด (fine)** เส้นใยในเนื้อ (fiber) **ไม่มี (absent)** ปริมาณน้ำในเนื้อ (fruit juiciness) **ปานกลาง (intermediate)** ฤดูกาลผลิต (fruiting season) **ตรงฤดูกาล (season)** อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) **117 วัน**

#### บันทึกเพิ่มเติม (notes)

---



---



---



---

ชื่อพันธุ์ ชะนีน้ำตาลทราย (Chani Namtansai)

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* Murray

สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง

### ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไม่เป็นระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) ป้อมปลายใบ (obovate-lanceolate) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute) ดอก (flower) รูปร่างของดอกตูม (flower shape at preblossom stage) ขอบขนาน (oblong) ปลายดอกตูม (flower apex) แหลม (acute) ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) กลมรี (oval) ปลายผล (fruit apex) ป้าน (flattened) ลักษณะฐานผล (fruit base) ป้าน (flattened) ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร รูปร่างก้านผล (fruit peduncle shape) เรียบ (uniform) หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) นูน (convex) หนามผลรอบจุดศูนย์กลางปลายผล (fruit spine at the center point of distal) มีหนาม (present) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนามงุ้มเข้า (hooked spine) หนามรอบข้อผล (proximal spine) หนามงุ้มเข้า (hooked spine)

### ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate) กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) ปานกลาง (medium) รสชาติของเนื้อ (taste) ปานกลาง (intermediate) ลักษณะของเนื้อ (flesh texture) ละเอียด (fine) เส้นใยในเนื้อ (fiber) ไม่มี (absent) ปริมาณน้ำในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate) ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตรงฤดูกาล (season)

### บันทึกเพิ่มเติม (notes)

---

---

---

---

ชื่อพันธุ์ ชายมะไฟ (Chai Mafai)  
 ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* Murray  
 ประวัติ เพาะจากเมล็ดกำปันทวี แหล่งที่ค้นพบ จ.จันทบุรี จ.ปราจีนบุรี  
 สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง

ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) **ไม่เป็นระเบียบ (not orderly)** ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) **ยาวรี (linear-oblong)** ปลายใบ (leaf apex) **caudate -acuminate** ฐานใบ (leaf base) **แหลม (acute)** ดอก (flower) รูปร่างของดอกตูม (flower shape at preblossom stage) **แหลม (acute)** ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) **ขอบขนาน (oblong)** ปลายผล (fruit apex) **ป้าน (flattened)** ลักษณะฐานผล (fruit base) **ป้าน (flattened)** ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) **ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร** รูปร่างก้านผล (fruit peduncle shape) **ขอบนูน (lip)** หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) **นูน (convex)** หนามผลรอบจุดศูนย์กลางปลายผล (fruit spine at the center point of distal) **ไม่มีหนาม (absent)** หนามปลายผล (fruit spine apex) **หนามตรง (vertical spine)** หนามรอบขั้วผล (proximal spine) **หนามงุ้มเข้า (hooked spine)**

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) **เร็ว** การออกดอก (flowering) **มาก (abundant)** การติดผล (fruit setting) **มาก (abundant)** ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้ 15 ปี (fruit bearing) **80-100 ผล** ความยาวผล **24.13 เซนติเมตร** ความกว้างผล **20 เซนติเมตร** เส้นรอบวงผล **63 เซนติเมตร** น้ำหนักผล (fruit weight) **3 กิโลกรัม** ความกว้างปากปลิง **2.30 เซนติเมตร** ความยาวจากขั้วผลถึงปากปลิง **8 เซนติเมตร** น้ำหนักเนื้อ (flesh weight) **117 กรัม** ความหนาเนื้อ (flesh thickness) **1.56 เซนติเมตร** สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) **Y138,25C23B** กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) **มีกลิ่นแรง (strong)** รสชาติของเนื้อ (taste) **ปานกลาง** ลักษณะของเนื้อ (flesh texture) **ละเอียด (fine)** เส้นใยในเนื้อ (fiber) **ไม่มี (absent)** ปริมาณน้ำในเนื้อ (fruit juiciness) **ปานกลาง (intermediate)** น้ำหนักเปลือก (shell weight) **2,057 กรัม** สีเปลือกผลสุก (skin colour of ripe fruit) **Y164B** จำนวนเมล็ดติดต่อเมล็ดเต็ม **36/64** ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกว้าง **3.95 เซนติเมตร** ความยาว **6.66 เซนติเมตร** รูปทรงของเมล็ด (shape of stone) **ขอบขนาน (oblong)** น้ำหนักเมล็ด (weight of stone) **213 กรัม** ฤดูกาลผลิต (fruiting season) **ตรงฤดูกาล (season)** อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) **120 วัน**

บันทึกเพิ่มเติม (notes)

ผลค่อนข้างสีออกน้ำตาล  
 แดงในเวลาแก่จัด



ชื่อพันธุ์ ชายมังคุด (Chai MungKhut)  
 ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* Murray  
 ประวัติ แหล่งที่ค้นพบ นายทองสุข รอดพันธ์  
 จ.จันทบุรี จ.ปราจีนบุรี  
 สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง

**ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)**

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) **ไม่เป็นระเบียบ (not orderly)** ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) **ป้อมกลางใบ (elliptical)** ปลายใบ (leaf apex) **เรียวแหลม (acuminate)** ฐานใบ (leaf base) **แหลม (acute)** ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) **กลมรี (oval)** ปลายผล (fruit apex) **ป้าน (flattened)** ลักษณะฐานผล (fruit base) **ป้าน (flattened)** ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) **สั้น (short) < 5 เซนติเมตร** รูปร่างก้านผล (fruit peduncle shape) **ขอบนูน (lip)** หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) **นูน (convex)** หนามผลรอบจุดศูนย์กลางปลายผล (fruit spine at the center point of distal) **ไม่มีหนาม (absent)** หนามปลายผล (fruit spine apex) **หนามตรง (vertical spine)** หนามรอบขั้วผล (proximal spine) **หนามตรง (vertical)**

**ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors)**

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) **เร็ว** การออกดอก (flowering) **ปานกลาง (intermediate)** การติดผล (fruit setting) **ปานกลาง (intermediate)** ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้ **15 ปี (fruit bearing) 100-120 ผล** ความยาวผล **29.9 เซนติเมตร** ความกว้างผล **20.95 เซนติเมตร** เส้นรอบวงผล **68.05 เซนติเมตร** น้ำหนักผล (fruit weight) **4.78 กิโลกรัม** ความกว้างปากปลิง **2.4 เซนติเมตร** ความยาวจากขั้วผลถึงปากปลิง **4.3 เซนติเมตร** น้ำหนักเนื้อ (flesh weight) **1,030 กรัม** ความหนาเนื้อ (flesh thickness) **2.14 เซนติเมตร** สีเนื้อผลดิบ (flesh colour of mature green fruit) **YG10B** กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) **มีกลิ่นอ่อน (mild)** รสชาติของเนื้อ (taste) **มันมากกว่าหวาน** ลักษณะของเนื้อ (flesh texture) **หยาบ (coarse)** เส้นใยในเนื้อ (fiber) **ปานกลาง (intermediate)** ปริมาณน้ำในเนื้อ (fruit juiciness) **ปานกลาง (intermediate)** น้ำหนักเปลือก (shell weight) **3,660 กรัม** สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) **YG147C** จำนวนเมล็ดต่อบ่อเมล็ดเต็ม **-/100** ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกว้าง (width) **2.45 เซนติเมตร** ความยาว **4.75 เซนติเมตร** รูปร่างของเมล็ด (shape of stone) **ขอบขนาน (oblong)** น้ำหนักเมล็ด (weight of stone) **90 กรัม** ฤดูกาลผลิต (fruiting season) **ตรงฤดูกาล (season)** อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) **100-120 วัน**

**บันทึกเพิ่มเติม (notes)**

-----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----



ชื่อพันธุ์ ชอนกลิ้น (Chon klin)  
ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* Murray  
สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง  
ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) **ป้อมปลายใบ (obolanceolate)** ปลายใบ (leaf apex) **เรียวแหลม(acuminate)**  
ฐานใบ (leaf base) **แหลม (acute)** ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape)  
**รูปไข่กลับ (obovate)** ปลายผล (fruit apex) **แหลม (pointed)**


ลักษณะฐานผล (fruit base) **ป้าน (flattened)** ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) **ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร**  
หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) **ขอบนูน (lip)** รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) **เว้าปลายแหลม (pointed concave)** หนามผลรอบจุดศูนย์กลางปลายผล (fruit spine at the center point of distal) **มีหนาม (present)** หนามปลายผล (fruit spine apex) **หนามตรง (vertical spine)** หนามรอบขั้วผล (proximal spine) **หนามงุ้มเข้า (hooked)**

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) **ปานกลาง (medium)** การออกดอก (flowering) **ปานกลาง(intermediate)** เส้นใยในเนื้อ (fiber) **มี (present)**

บันทึกเพิ่มเติม (notes)

เป็นพันธุ์ที่ไม่มีกลิ้นฟุ้งกระจาย



ชื่อพันธุ์ ดาวกระจาย (Daokrachai)  
ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* Murray  
ประวัติ เพาะจากเมล็ด พันธุ์กำปั่นขาว แหล่งที่ค้นพบ ต.บางบัวรุ่ง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี  
สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง  
ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)


การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) **ไม่เป็นระเบียบ (not orderly)** ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) **ป้อมกลางใบ (elliptical)**

ปลายใบ (leaf apex) **caudate-acuminate** ฐานใบ (leaf base) **กลมมน (roundedobtuse)** ดอก (flower) รูปร่างของดอกตูม (flower shape at preblossom stage) **รูปไข่กลับ (obovate)** ปลายดอกตูม (flower apex) **แหลม (acute)** ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) **รูปไข่ (ovate)** ปลายผล (fruit apex) **นูน(depressed)** ลักษณะฐานผล (fruit base) **ป้าน (flattened)** ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) **ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร** รูปร่างก้านผล (fruit peduncle shape) **ขอบนูน (lip)** หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) **แหลม (pointed)** หนามผลรอบจุดศูนย์กลางปลายผล (fruit spine at the center point of distal) **ไม่มีหนาม (absent)** หนามปลายผล (fruit spine apex) **หนามงุ้มเข้า (hooked)** หนามรอบขั้วผล (proximal spine) **หนามตรง (vertical)**

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors)

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors)

บันทึกเพิ่มเติม (notes)



ชื่อพันธุ์ แดงข้างเขียน (Deang Changkhian)

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* Murray

ประวัติ แหล่งที่ค้นพบ สวนนายชอง ศศิผลิน  
บางกอกน้อย จ.กรุงเทพฯ

สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง

#### ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) **ไม่เป็นระเบียบ (not orderly)** ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) **รูปไข่ขอบขนาน (oval-oblong)** ปลายใบ (leaf apex) **แหลมเรียว (acuminate-acute)** ฐานใบ (leaf base) **แหลม (acute)** ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) **ทรงกระบอก (cyindroidal)** ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) **ปานกลาง (short) 5-11 เซนติเมตร** หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) **นูนปลายแหลม (point convex)**

#### ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) **เร็ว** การออกดอก (flowering) **มาก (abundant)** การติดผล (fruit setting) **ปานกลาง (intermediate)** ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้ 15 ปี (fruit bearing) **100-120 ผล** ฤดูกาลผลิต (fruiting season) **ตรงฤดูกาล (season)** อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) **100-120 วัน**

#### บันทึกเพิ่มเติม (notes)

---

---

ชื่อพันธุ์ แดงตาน้อย (Deang Tanoi)

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* Murray

ประวัติ แหล่งที่ค้นพบ สวนนายไพสิต หิรัญศิริ  
บางกอกน้อย จ. กรุงเทพฯ

สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง

#### ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) **ไม่เป็นระเบียบ (not orderly)** ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) **สั้น (short) < 5 เซนติเมตร** ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) **ป้อมปลายใบ (obovate-lanceolate)** ปลายใบ (leaf apex) **แหลมเรียว (acuminate acute)** ฐานใบ (leaf base) **กลมมน (rounded- obtuse)** ผล (fruit) ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) **ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร** รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) **นูนปลายแหลม (pointed-convex)**

#### ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) **เร็ว** การออกดอก (flowering) **มาก (abundant)** การติดผล (fruit setting) **ปานกลาง (intermediate)** ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้ 15 ปี (fruit bearing) **100-120 ผล** ฤดูกาลผลิต (fruiting season) **ตรงฤดูกาล (season)** อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) **100-120 วัน**

#### บันทึกเพิ่มเติม (notes)

---

---



ชื่อพันธุ์ แดงตาเดือน (Deang Taphuean)  
ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* Murray  
ประวัติ แหล่งที่ค้นพบ สวนนายทองสุข รอดพัน จ.นนทบุรี  
สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง

ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไม่เป็นระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) ไข่ม  
กลางใบ (elliptical) ปลายใบ (leaf apex) cuspidate-acuminate ฐานใบ (leaf base) กลมมน (rounded-obtuse) ผล (fruit) ความยาว  
ก้านผล (fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape)  
นูนปลายแหลม (pointed-convex)

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล (fruit setting) ปาน  
กลาง (intermediate) ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้ 15 ปี (fruit bearing) 100-120 ผล ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตรงฤดูกาล  
(season) อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) 100-120 วัน

บันทึกเพิ่มเติม (notes)

---

---

---

---

ชื่อพันธุ์ แดงรัศมี (Deang Ratsami)  
ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* Murray  
ประวัติ ได้จากการเพาะเมล็ดพันธุ์หลวง  
แหล่งที่ค้นพบ จ.นนทบุรี  
สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง

ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไม่เป็นระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) ไข่ม  
ใบ (ovate-lanceolate) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ฐานใบ (leaf base) มน (obtuse) ผล (fruit) ทรงผล (fruit  
shape) รูปไข่ (ovate) ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร หนามผล (fruit spine)  
รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) นูนปลายแหลม (pointed-convex)

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate) การติดผล (fruit setting)  
ปานกลาง (intermediate) ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้ 15 ปี (fruit bearing) 100-120 ผล ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตรงฤดูกาล  
(season) อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) 100-120 วัน

บันทึกเพิ่มเติม (notes)

---

---

---

---

ชื่อพันธุ์ แดงสาวน้อย (Deang Sanoi)  
 ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* Murray  
 ประวัติ แหล่งที่ค้นพบ สวนนายชอง ศศิผลิน  
 บางกอกน้อย จ. กรุงเทพฯ  
 สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง

ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไม่เป็นระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) ปลายใบ (obovate-lanceolate) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ฐานใบ (leaf base) เรียว (cuneate-acute) ดอก (flower) รูปร่างของดอกตูม (flower shape at preblossom stage) กลมรี (oval) ปลายดอกตูม (flower apex) มน (obtuse) ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) รูปไข่กลับ (obovate) ปลายผล (fruit apex) ป้าน (flattened) ลักษณะฐานผล (fruit base) บุ่ม (depressed) ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร รูปร่างก้านผล (fruit peduncle shape) ขอบนูน (lip) หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) นูนปลายแหลม (pointed-convex) หนามผลรอบจุดศูนย์กลางปลายผล (fruit spine at the center point of distal) ไม่มีหนาม (absent) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนามตรง (vertical spine) หนามรอบขั้วผล (proximal spine) หนามงุ้มเข้า (hooked)

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors)


การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate) ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้ 15 ปี (fruit bearing) 100-120 ผล ความยาวผล 24.24 เซนติเมตร ความกว้างผล 21.74 เซนติเมตร เส้นรอบวงผล 67.48 เซนติเมตร น้ำหนักผล (fruit weight) 3.67 กิโลกรัม ความกว้างปากปลิง 2.74 เซนติเมตร ความยาวจากขั้วผลถึงปากปลิง 4.25 เซนติเมตร น้ำหนักเนื้อ (flesh weight) 990 กรัม ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 1.98 เซนติเมตร สีเนื้อผลดิบ (flesh colour of mature green fruit) YOG 16C กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) มีกลิ่นอ่อน (mild) รสชาติของเนื้อ (taste) หวานมันพอดี ลักษณะของเนื้อ (flesh texture) หยาบ (coarse) เส้นใยในเนื้อ (fiber) มี (present) ปริมาณน้ำในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate) น้ำหนักเปลือก (shell weight) 2,280 กรัม สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green) YG 145C จำนวนเมล็ดดิบต่อเมล็ดเต็ม 39/61 ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกว้าง (width) 3.75 เซนติเมตร ความยาว 6.6 เซนติเมตร รูปทรงของเมล็ด (shape of stone) ขอบขนาน (oblong) น้ำหนักเมล็ด (weight of stone) 270 กรัม ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตรงฤดูกาล (season) อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) 100-120 วัน

บันทึกเพิ่มเติม (notes)

-----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----



ชื่อพันธุ์ ดันใหญ่ (Ton yai)  
ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* Murray  
สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง  
ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)



ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) รูปไข่กลับ (obovate) ปลายผล (fruit apex) แหลม (pointed) ลักษณะฐานผล (fruit base) ปาน (flattened) ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร รูปร่างก้านผล (fruit peduncle shape) นูนน้อย (lip) หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) นูน (convex) หนามผลรอบจุดศูนย์กลางปลายผล (fruit spine at the center point of distal) มีหนาม (present) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนามตรง (vertical spine) หนามรอบหัวผล (proximal spine) หนามงุ้มเข้า (hooked)

#### ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล (fruit setting) มาก (abundant) ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้ 15 ปี (fruit bearing) 100-120 ผล ความยาวผล 22 เซนติเมตร ความกว้างผล 15 เซนติเมตร เส้นรอบวงผล 47 เซนติเมตร น้ำหนักผล (fruit weight) 1.2 กิโลกรัม ความกว้างปากปลิง 1.49 เซนติเมตร ความยาวจากหัวผลถึงปากปลิง 4.60 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 0.89 เซนติเมตร กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) มีกลิ่นอ่อน (mild) รสชาติของเนื้อ (taste) หวานมันพอดี ลักษณะของเนื้อ (flesh texture) ละเอียด (fine) เส้นใยในเนื้อ (fiber) ไม่มี (absent) ปริมาณน้ำในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate) สีเปลือกผลสุก (skin colour of ripe fruit) Y 14 D ฤดูการผลิต (fruiting season) ในฤดูหนาว (season) อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) 120 วัน

#### บันทึกเพิ่มเติม (notes)

---

ชื่อพันธุ์ ตะโก (Tako) หรือ ทองแดง (Thong daeng)  
ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* Murray  
ประวัติ แหล่งที่ค้นพบ จ.ระยอง จ.นนทบุรี  
สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง  
ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไม่เป็นระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) รูปไข่ขอบขนาน (oval-oblong) ปลายใบ (leaf apex) caudate-acuminate ฐานใบ (leaf base) กลมมน (rounded-obtuse) ดอก (flower) รูปร่างของดอกตูม (flower shape at preblossom stage) ขอบขนาน (oblong) ปลายดอกตูม (flower apex) แหลม (acute) ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) กลมรี (oval) ปลายผล (fruit apex) แหลม (pointed) ลักษณะฐานผล (fruit base) ปาน (flattened) ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร รูปร่างก้านผล (fruit peduncle shape) ขอบวงแหวน (funnel) หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) นูนปลายแหลม (pointed-convex) หนามผลรอบจุดศูนย์กลางปลายผล (fruit spine at the center point of distal) ไม่มีหนาม (absent) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนามตรง (vertical spine) หนามรอบหัวผล (proximal spine) หนามตรง (vertical)

#### ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors)

#### บันทึกเพิ่มเติม (notes)

---



ชื่อพันธุ์ คุ้มทอง (Tumthong)  
ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* Murray  
ประวัติ แหล่งที่ค้นพบ สวนนายไพสิต หิรัญศิริ  
บางกอกน้อย จ.กรุงเทพฯ  
สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง

ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (Arrangement of branching) **ไม่เป็นระเบียบ (not orderly)** ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) **ป้อมกลางใบ (elliptical)** ปลายใบ (leaf apex) **cuspidate-acuminate** ฐานใบ (leaf base) **กลมมน (rounded-obtuse)** ดอก (flower) รูปร่างของดอกตูม (flower shape at preblossom stage) **กลมรีขอบขนาน (ovaloblong)** ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) **ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร**

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor)

บันทึกเพิ่มเติม (notes)

ชื่อพันธุ์ ทศพิน (Thosapin)  
ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* Murray  
ประวัติ แหล่งที่ค้นพบ บางกอกน้อย จ.กรุงเทพฯ จ.นนทบุรี  
สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง

ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) **ไม่เป็นระเบียบ (not orderly)** ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) **ป้อมกลางใบ (elliptical)** ปลายใบ (leaf apex) **cuspidate-acuminate** ฐานใบ (leaf base) **แหลม (acute)** ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) **กลมแป้น (oblate)** ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) **ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร** หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) **นูนปลายแหลม (pointed-convex)**

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) **เร็ว** การออกดอก (flowering) **มาก (abundant)** การติดผล (fruit setting) **ปานกลาง (intermediate)** ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้ 15 ปี (fruit bearing) **100-120 ผล** ฤดูกาลผลิต (fruiting season) **ตรงฤดูกาล (season)** อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) **100-120 วัน**

บันทึกเพิ่มเติม (notes)

ชื่อพันธุ์ ทองคำพรวด (Thong Tapruat)  
หรือ ทองคำพรวด (Thongkam Pruat)

ชื่อวิทยาศาสตร์ Durio zibethinus Murray

ประวัติ แหล่งที่ค้นพบ จ.นนทบุรี

สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง

#### ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) **ไม่เป็นระเบียบ (not orderly)** ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) **ป้อมปลายใบ (obovate-lanceolate)** ปลายใบ (leaf apex) **เรียวแหลม (acuminate)** ฐานใบ (leaf base) **เรียว (cauneate-acute)** ดอก (flower) รูปร่างของดอกตูม (flower shape at preblossom stage) **กลมรีขอบขนาน (oval-oblong)** ปลายดอกตูม (flower apex) **แหลม (acute)** ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) **กลมแป้น (oblate)** ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) **ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร** หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) **นูนปลายแหลม (pointed convex)**

#### ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) **เร็ว** การออกดอก (flowering) **มาก (abundant)** การติดผล (fruit setting) **ปานกลาง (intermediate)** ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้ 15 ปี (fruit bearing) **100-120 ผล** ความยาวผล **27.37 เซนติเมตร** ความกว้างผล **20.23 เซนติเมตร** เส้นรอบวงผล **62.83 เซนติเมตร** น้ำหนักผล (fruit weight) **2.03 กิโลกรัม** ความกว้างปากปลิง **2.26 เซนติเมตร** ความยาวจากขั้วผลถึงปากปลิง **6.59 เซนติเมตร** น้ำหนักเนื้อ (flesh weight) **582 กรัม** ความหนาเนื้อ (flesh thickness) **1.22 เซนติเมตร** สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) **YO 14D** กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) **ปานกลาง (intermediate)** รสชาติของเนื้อ (taste) **หวานมันพอดี** ลักษณะของเนื้อ (flesh texture) **ละเอียด (fine)** เส้นใยในเนื้อ (fiber) **ไม่มี (absent)** ปริมาณน้ำในเนื้อ (fruit juiciness) **ปานกลาง (intermediate)** น้ำหนักเปลือก (shell weight) **2,453 กรัม** สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) **YG 52B,C** จำนวนเมล็ดสีต่อเมล็ดเต็ม **20/80** ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกว้าง (width) **3.08 เซนติเมตร** ความยาว **5.06 เซนติเมตร** รูปทรงของเมล็ด (shape of stone) **ขอบขนาน (oblong)** น้ำหนักเมล็ด (weight of stone) **95 กรัม** ฤดูกาลผลิต (fruiting season) **ตรงฤดูกาล (season)** อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) **100-120 วัน**

#### บันทึกเพิ่มเติม (notes)

---

---

---

ชื่อพันธุ์ ทองนพคุณ (Thongnoppakun)

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* Murr.

สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง

#### ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) **ไม่เป็นระเบียบ (not orderly)**

#### ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) **เร็ว** การออกดอก (flowering) **มาก (abundant)** การติดผล (fruit setting) **มาก (abundant)** ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้ 15 ปี (fruit bearing) **100-120 ผล** ฤดูกาลผลิต (fruiting season) **ตรงฤดูกาล (season)** อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) **120 วัน**

บันทึกเพิ่มเติม (notes).....

ชื่อพันธุ์ ทองม้วน (Thongmuan)

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* Murray

ประวัติ แหล่งที่ค้นพบสวนของนายจจน เมทวัน จ. จันทบุรี

สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง



#### ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) **ไม่เป็นระเบียบ**

**(not orderly)** ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) **รูปไข่ขอบขนาน (oval-oblong)** ปลายใบ (leaf apex) **เรียวแหลม (acuminate)** ฐานใบ (leaf base) **แหลม (acute)** ดอก (flower) รูปร่างของดอกตูม (flower shape at preblossom stage) **กลมรีขอบขนาน (oval-oblong)** ปลายดอกตูม (flower apex) **แหลม (acute)** ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) **กลมรี (oval)** ปลายผล (fruit apex) **บุ๋ม (depressed)** ลักษณะฐานผล (fruit base) **แบน (flattened)** ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) **ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร** รูปร่างก้านผล (fruit peduncle shape) **ขอบวงแหวน (funnel)** หนามผล (fruit spine)รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) **แหลม (pointed)** หนามผลรอบจุดศูนย์กลางปลายผล (fruit spine at the center point of distal) **ไม่มีหนาม (absent)** หนามปลายผล (fruit spine apex) **หนามตรง (vertical spine)** หนามรอบขั้วผล (proximal spine) **หนามตรง (vertical)**

#### ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) **เร็ว** การออกดอก (flowering) **มาก (abundant)** การติดผล (fruit setting) **ปานกลาง (intermediate)** ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้ 15 ปี (fruit bearing) **100-120 ผล** ความยาวผล **23.1 เซนติเมตร** ความกว้างผล **18.62 เซนติเมตร** เส้นรอบวงผล **57.85 เซนติเมตร** น้ำหนักผล (fruit weight) **2.49 กิโลกรัม** ความกว้างปากปลิง **2.17 เซนติเมตร** ความยาวจากขั้วผลถึงปากปลิง **5.32 เซนติเมตร** น้ำหนักเนื้อ (flesh weight) **550 กรัม** ความหนาเนื้อ (flesh thickness) **1.78 เซนติเมตร** สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) **YO17D** กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) **มีกลิ่นแรง (strong)** รสชาติของเนื้อ (taste) **หวานมากกว่ามัน** ลักษณะของเนื้อ (flesh texture) **ละเอียด (fine)** เส้นใยในเนื้อ (fiber) **ไม่มี (absent)** ปริมาณน้ำในเนื้อ (fruit juiciness) **ปานกลาง (intermediate)** น้ำหนักเปลือก (shell weight) **1,830 กรัม** จำนวนเมล็ดลึบต่อเมล็ดเต็ม **76/24** ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกว้าง (width) **3.5 เซนติเมตร** ความยาว **5.75 เซนติเมตร** รูปทรงของเมล็ด (shape of stone) **ขอบขนาน (oblong)** น้ำหนักเมล็ด (weight of stone) **140 กรัม** ฤดูกาลผลิต (fruiting season) **ตรงฤดูกาล (season)** อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) **100-120 วัน**

บันทึกเพิ่มเติม (notes) .....

ชื่อพันธุ์ ทองย้อยฉัตร (Thongyoichat)  
 ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* Murray  
 ประวัติ ได้จากการเพาะเมล็ดทองย้อยเดิม  
 แหล่งที่ค้นพบ จ.นนทบุรี จ.จันทบุรี จ.ระยอง  
 สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง

ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) **ไม่เป็นระเบียบ (not orderly)** ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) **ป้อมปลายใบ (obvate-lanceolate)** ปลายใบ (leaf apex) **เรียวแหลม (acuminate)** ฐานใบ (leaf base) **มน (obtuse)** ดอก (flower) รูปร่างของดอกตูม (flower shape at preblossom stage) **กลม (rounded)** ปลายดอกตูม (flower apex) **มน (obtuse)** ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) **รูปไข่ (ovate)** ปลายผล (fruit apex) **แหลม (pointed)** ลักษณะฐานผล (fruit base) **ป้าน (flattened)** ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) **ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร** รูปร่างก้านผล (fruit peduncle shape) **ขอบนูน (lip)** หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) **นูนปลายแหลม (pointed-convex)** หนามผลรอบจุดศูนย์กลางปลายผล (fruit spine at the center point of distal) **ไม่มีหนาม (absent)** หนามปลายผล (fruit spine apex) **หนามตรง (vertical spine)** หนามรอบขั้วผล (proximal spine) **หนามตรง (vertical)**

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) **เร็ว** การออกดอก (flowering) **มาก (abundant)** การติดผล (fruit setting) **มาก (abundant)** ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้ 15 ปี (fruit bearing) **120-130 ผล** ความยาวผล **23 เซนติเมตร** ความกว้างผล **20 เซนติเมตร** เส้นรอบวงผล **60 เซนติเมตร** น้ำหนักผล (fruit weight) **2.5 กิโลกรัม** ความกว้างปากปลิง **1.5 เซนติเมตร** ความยาวจากขั้วผลถึงปากปลิง **5.6 เซนติเมตร** น้ำหนักเนื้อ (flesh weight) **600 กรัม** ความหนาเนื้อ (flesh thickness) **0.55 เซนติเมตร** สีเนื้อผลดิบ (flesh colour of mature green fruit) **GOG 163 A** กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) **ปานกลาง (medium)** รสชาติของเนื้อ (taste) **หวานมันพอดี** ลักษณะของเนื้อ (flesh texture) **หยาบ (coarse)** เส้นใยในเนื้อ (fiber) **มี (present)** ปริมาณน้ำในเนื้อ (fruit juiciness) **ปานกลาง (intermediate)** น้ำหนักเปลือก (shell weight) **1,400 กรัม** สีเปลือกผลสุก (skin colour ripe fruit) **YOG 22 B** ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกว้าง (width) **2.8 เซนติเมตร** ความยาว **4.2 เซนติเมตร** รูปทรงของเมล็ด (shape of stone) **ขอบขนาน (oblong)** สีเมล็ด (stone colour) **GGG 191 B** น้ำหนักเมล็ด (weight of stone) **500 กรัม** ฤดูกาลผลิต (fruiting season) **ในฤดูกาล (season)** อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) **130 วัน**

บันทึกเพิ่มเติม (notes)

-----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----





ชื่อพันธุ์ ทองย้อยเดิม (Thongyoidoem)  
ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* Murray  
ประวัติ เป็นพันธุ์ดั้งเดิม  
แหล่งที่ค้นพบ จ.กรุงเทพฯ จ.จันทบุรี

สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง

ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)


การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไม่เป็น  
ระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape)  
ป้อมโคนใบ (ovate-lanceolate) ปลายใบ (leaf apex) เรียว

แหลม (acuminate) ฐานใบ (leaf base) มน (obtuse) ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) รูปไข่ (ovate) ปลายผล (fruit apex) แหลม (pointed) ลักษณะฐานผล (fruit base) ป้าน (flattened) ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร รูปร่างก้านผล (fruit peduncle shape) นูนน้อย (lip) หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) นูนปลายแหลม (pointed-convex) หนามผลรอบจุดศูนย์กลางปลายผล (fruit spine at the center point of distal) ไม่มีหนาม (absent) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนามตรง (vertical spine) หนามรอบขั้วผล (proximal spine) หนามตรง (vertical)

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล (fruit setting) มาก (abundant) ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้ 15 ปี (fruit bearing) 120-130 ผล ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตรงฤดูกาล (season) อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) 130 วัน

บันทึกเพิ่มเติม (notes)



ชื่อพันธุ์ ทองสุก (Thongsuk)  
ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* Murray  
ประวัติ แหล่งที่ค้นพบ จ.จันทบุรี กรุงเทพฯ  
สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง

ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไม่เป็นระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) รูปไข่ขอบขนาน (oval-oblong) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute) ดอก (flower) ปลายดอกตูม (flower apex) แหลม (acute) ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) รูปรี (elliptic) ปลายผล (fruit apex) แหลม (pointed) ลักษณะฐานผล (fruit base) ป้าน (flattened) ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) รูปหนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) เว้า (concave)

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor)

บันทึกเพิ่มเติม (notes)

ชื่อพันธุ์ ทองหยอด (Thongyot)  
ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* Murray  
สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง  
ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

รูปร่างก้านผล (fruit peduncle shape) **นูนน้อย (lip)** หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) **เว้าปลายแหลม (pointed concave)** หนามผลรอบจุดศูนย์กลางปลายผล (fruit spine at the center point of distal) **มีหนาม (present)** หนามปลายผล (fruit spine apex) **หนามตรง (vertical spine)** หนามรอบขั้วผล (proximal spine) **หนามงุ้มเข้า (hooked)**

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor)


การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) **เร็ว** การออกดอก (flowering) **มาก (abundant)** การติดผล (fruit setting) **มาก (abundant)** ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้ 15 ปี (fruit bearing) **100-120 ผล** ความยาวผล **21 เซนติเมตร** ความกว้างผล **17.5 เซนติเมตร** เส้นรอบวงผล **55 เซนติเมตร** น้ำหนักผล (fruit weight) **2.03 กิโลกรัม** ความกว้างปากปลิง **1.66 เซนติเมตร** ความยาวจากขั้วผลถึงปากปลิง **5.28 เซนติเมตร** น้ำหนักเนื้อ (flesh weight) **690 กรัม** ความหนาเนื้อ (flesh thickness) **0.71 เซนติเมตร** สีเนื้อผลดิบ (flesh colour of mature green fruit) **YG 152 B** กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) **มีกลิ่นอ่อน (mild)** รสชาติของเนื้อ (taste) **มันมากกว่าหวาน** ลักษณะของเนื้อ (flesh texture) **ปานกลาง (intermediate)** เส้นใยในเนื้อ (fiber) **มี (present)** ปริมาณน้ำในเนื้อ (fruit juiciness) **น้อย (scarce)** น้ำหนักเปลือก (shell weight) **960 กรัม** สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) **YG 152 B** จำนวนเมล็ดดิบต่อเมล็ดเต็ม **26/74** ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกว้าง (width) **3.27 เซนติเมตร** ความยาว **5.07 เซนติเมตร** รูปทรงของเมล็ด (shape of stone) **ขอบขนาน (oblong)** สีเมล็ด (stone colour) **GO 165 C** น้ำหนักเมล็ด (weight of stone) **380 กรัม** ฤดูกาลผลิต (fruiting season) **ตรงฤดูกาล (season)** อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) **120 วัน**

บันทึกเพิ่มเติม (notes)

---

---

---



ชื่อพันธุ์ ทองหยิบ (Thongyip)  
ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* Murray  
สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง  
ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) **ป้อมกลางใบ (elliptical)** ปลายใบ (leaf apex) **แหลมเรียว (acuminate acute)** ฐานใบ (leaf base) **กลมมน (rounded- obtuse)** ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) **กลม (rounded)** ปลายผล (fruit apex) **ป้าน (flattened)** ลักษณะฐานผล (fruit base) **ป้าน (flattened)** ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) **ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร** รูปร่างก้านผล (fruit peduncle shape) **ขอบนูน (lip)** หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) **แหลม (pointed)** หนามผลรอบจุดศูนย์กลางปลายผล (fruit spine at the center point of distal) **มีหนาม (present)** หนามปลายผล (fruit spine apex) **หนามงุ้มเข้า (hooked spine)** หนามรอบขั้วผล (proximal spine) **หนามตรง (hooked)**

#### ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) **เร็ว** การออกดอก (flowering) **มาก (abundant)** การติดผล (fruit setting) **มาก (abundant)** ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้ 15 ปี (fruit bearing) **100-120 ผล** ความยาวผล **16 เซนติเมตร** ความกว้างผล **15 เซนติเมตร** เส้นรอบวงผล **46 เซนติเมตร** น้ำหนักผล (fruit weight) **1.16 กิโลกรัม** ความกว้างปากปลิง **1.18 เซนติเมตร** ความยาวจากขั้วผลถึงปากปลิง **8.27 เซนติเมตร** น้ำหนักเนื้อ (flesh weight) **361.25 กรัม** ความหนาเนื้อ (flesh thickness) **0.65 เซนติเมตร** สีเนื้อ (flesh colour of mature green fruit) **Y 10 D** กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) **มีกลิ่นอ่อน (mild)** รสชาติของเนื้อ (taste) **หวานมากกว่ามัน** ลักษณะของเนื้อ (flesh texture) **ละเอียด (fine)** เส้นใยในเนื้อ (fiber) **ไม่มี (absent)** ปริมาณน้ำในเนื้อ (fruit juiciness) **ปานกลาง (intermediate)** น้ำหนักเปลือก (shell weight) **605 กรัม** สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) **Y 152 C** จำนวนเมล็ดดิบต่อเมล็ดเต็ม **56/44** ความกว้าง **3.13 เซนติเมตร** ความยาว **4.40 เซนติเมตร** รูปทรงของเมล็ด **ขอบขนาน (oblong)** สีของเมล็ด (stone colour) **GO 164 C** น้ำหนักเมล็ด (weight of stone) **193.75 กรัม** ฤดูกาลผลิต (fruiting season) **ตรงฤดูกาล (season)** อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) **120 วัน**

#### บันทึกเพิ่มเติม (notes)

---

---



ชื่อพันธุ์ ทองไหม (Thongmai)  
ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* Murray  
สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง  
ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) รูปไข่ขอบขนาน (oval- oblong) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ฐานใบ (leaf base) มน (obtuse) ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) รูปไข่ (ovate) ปลายผล (fruit apex) แหลม (pointed) ลักษณะฐานผล (fruit base) ป้าน (flattened) ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร รูปร่างก้านผล (fruit peduncle shape) ขอบนูน (lip) หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) นูน (convex) หนามผลรอบจุดศูนย์กลางปลายผล (fruit spine at the center point of distal) ไม่มีหนาม (absent) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนามตรง (vertical spine) หนามรอบขั้วผล (proximal spine) หนามงุ้มเข้า (hooked)

#### ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) ปานกลาง (medium) การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate) ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้ 15 ปี (fruit bearing) 120 ผล ความยาวผล 27.5 เซนติเมตร ความกว้างผล 18 เซนติเมตร เส้นรอบวงผล 64 เซนติเมตร น้ำหนักผล (fruit weight) 3.38 กิโลกรัม ความกว้างปากปลิง 1.72 เซนติเมตร ความยาวจากขั้วผลถึงปากปลิง 5.86 เซนติเมตร น้ำหนักเนื้อ (flesh weight) 640 กรัม ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 1.44 เซนติเมตร สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) Y 16 B กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) มีกลิ่นอ่อน (mild) รสชาติของเนื้อ (taste) หวานมันพอดี ลักษณะของเนื้อ (flesh texture) ละเอียด (fine) เส้นใยในเนื้อ (fiber) ไม่มี (absent) ปริมาณน้ำในเนื้อ (fruit juiciness) น้อย (scarce) น้ำหนักเปลือก (husk weight) 2,500 กรัม สีเปลือกผลสุก (skin colour of ripe fruit) GO 152 B จำนวนเมล็ดต่อบลูต่อเมล็ดเต็ม 20/80 ขนาดของเมล็ด (seed size) ความกว้าง (width) 3.18 เซนติเมตร ความยาว (length) 5.08 เซนติเมตร รูปทรงของเมล็ด (seed shape) ขอบขนาน (oblong) สีของเมล็ด (stone colour) GO 165 B น้ำหนักเมล็ด (seed weight) 240 กรัม ฤดูกาลเก็บเกี่ยว (harvesting season) ฤดูร้อน (season) อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) 130 วัน

#### บันทึกเพิ่มเติม (notes)

-----  
-----  
-----



ชื่อพันธุ์ ทับทิม (Taptim)  
 ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* Murray  
 ประวัติ แหล่งที่ค้นพบ จ. จันทบุรี และ จ.ระยอง  
 สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง

ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) **ไม่เป็นระเบียบ (not orderly)** ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) **ป้อมโคนใบ (ovate-lanceolate)** ปลายใบ (leaf apex) **เรียวแหลม (acuminate)** ฐานใบ (leaf base) **มน (obtuse)** ดอก (flower) รูปร่างของดอกตูม (flower shape at preblossom stage) **ขอบขนาน (oblong)** ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) **รูปไข่ (ovate)** ปลายผล (fruit apex) **แหลม (pointed)** ลักษณะฐานผล (fruit base) **บุ๋ม (depressed)** ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) **ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร** รูปร่างก้านผล (fruit peduncle shape) **ขอบมน (lip)** หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) **มนปลายแหลม (pointed-convex)** หนามผลรอบจุดศูนย์กลางปลายผล (fruit spine at the center point of distal) **ไม่มีหนาม (absent)** หนามปลายผล (fruit spine apex) **หนามงุ้มเข้า (hooked spine)** หนามรอบขั้วผล (proximal spine) **หนามงุ้มเข้า (hooked spine)**



ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) **เร็ว** การออกดอก (flowering) **ปานกลาง (intermediate)** การติดผล (fruit setting) **ปานกลาง (intermediate)** ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้ 15 ปี (fruit bearing) **80 ผล** ความยาวผล **26.19 เซนติเมตร** ความกว้างผล **19.15 เซนติเมตร** เส้นรอบวงผล **59 เซนติเมตร** น้ำหนักผล (fruit weight) **2.53 กิโลกรัม** ความกว้างปากปลิง **1.95 เซนติเมตร** ความยาวจากขั้วผลถึงปากปลิง **5.51 เซนติเมตร** น้ำหนักเนื้อ (flesh weight) **470 กรัม** ความหนาเนื้อ (flesh thickness) **1.05 เซนติเมตร** สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) **YO15A** กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) **มีกลิ่นอ่อน (mild)** รสชาติของเนื้อ (taste) **หวานมันพอดี** ลักษณะของเนื้อ (flesh texture) **ละเอียด** เส้นใยในเนื้อ (fibre) **ไม่มี (absent)** ปริมาณน้ำในเนื้อ (fruit juiciness) **ปานกลาง (intermediate)** น้ำหนักเปลือก (shell weight) **1,956 กรัม** สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) **YG152** จำนวนเมล็ดดิบต่อเมล็ดเต็ม **30/70** ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกว้าง (width) **3.27 เซนติเมตร** ความยาว **5.13 เซนติเมตร** รูปทรงของเมล็ด (shape of stone) **ขอบขนาน (oblong)** น้ำหนักเมล็ด (weight of stone) **189.33 กรัม** ฤดูกาลผลิต (fruiting season) **ตรง ฤดูกาล (season)** อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) **120 วัน**

บันทึกเพิ่มเติม (notes)

-----

-----

-----

-----

ชื่อพันธุ์ ธรณีไหว (Thoraniwai)  
ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* Murray  
สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง  
ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไม่เป็นระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) ไข่ขอบขนาน (oval oblong) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ฐานใบ (leaf base) มน (obtuse) ดอก (flower) รูปร่างของดอกตูม (flower shape at preblossom stage) กลม (rounded) ปลายดอกตูม (flower apex) แหลม (acute) ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) รูปไข่ (ovate) ปลายผล (fruit apex) แหลม (pointed) ลักษณะฐานผล (fruit base) ป้าน (flattened) ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) ยาว (long) > 11 เซนติเมตร รูปร่างก้านผล (fruit peduncle shape) ขอบนูน (lip) หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) นูนปลายแหลม (pointed convex) หนามผลรอบจุดศูนย์กลางปลายผล (fruit spine at the center point of distal) ไม่มีหนาม (absent) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนามตรง (vertical spine) หนามรอบข้อผล (proximal spine) หนามงุ้มเข้า (hooked spine)

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor)

ความยาวผล 18.68 เซนติเมตร ความกว้างผล 18.56 เซนติเมตร เส้นรอบวงผล 59.16 เซนติเมตร น้ำหนักผล (fruit weight) 2.14 กิโลกรัม ความยาวจากข้อผลถึงปากปลิง 8.5 เซนติเมตร น้ำหนักเนื้อ (flesh weight) 552 กรัม ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 1.17 เซนติเมตร สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) YO 20 B กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) มีกลิ่นอ่อน (mild) รสชาติของเนื้อ (taste) หวานมันพอดี ลักษณะของเนื้อ (flesh texture) ละเอียดย (fine) เส้นใยในเนื้อ (fiber) ไม่มี (absent) ปริมาณน้ำในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate) น้ำหนักเปลือก (shell weight) 1,176 กรัม สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) YG 148 ABC, YG 152 CB จำนวนเมล็ดต่อบต่อเมล็ดเต็ม 31/69 ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกว้าง (width) 3.18 เซนติเมตร ความยาว 5.68 เซนติเมตร รูปทรงของเมล็ด (shape of stone) ขอบขนาน (oblong) น้ำหนักเมล็ด (weight of stone) 244 กรัม

บันทึกเพิ่มเติม (notes)



ชื่อพันธุ์ นกกระจิบ (Nokkrachip)  
ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* Murray  
ประวัติ แหล่งที่ค้นพบ สวนนายอรุณ บุญแถม จ.จันทบุรี  
สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง

ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไม่เป็นระเบียบ (not orderly) ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) กลมรี (oval) ปลายผล (fruit apex) ป้าน (flattened) ลักษณะฐานผล (fruit base) ป้าน (flattened) ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร รูปร่างก้านผล (fruit peduncle shape) ขอบนูน (lip) หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) นูนปลายแหลม (pointed-convex) หนามผลรอบจุดศูนย์กลางปลายผล (fruit spine at the center point of distal) มีหนาม (present) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนามตรง (vertical spine) หนามรอบขั้วผล (proximal spine) หนามตรง (vertical)

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล (fruit setting) มาก (abundant) ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้ 15 ปี (fruit bearing) 100-120 ผล ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตรงฤดูกาล (season) อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) 100-120 วัน

บันทึกเพิ่มเติม (notes)

---

---

---


ชื่อพันธุ์ นกหยิบ (Nokyip)  
ชื่อวิทยาศาสตร์ Durio zibethinus Murray  
สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง  
ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) **ไม่เป็นระเบียบ (not orderly)** ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) **ป้อมโคนใบ (ovate lanceolate)** ปลายใบ (leaf apex) **เรียวแหลม (acuminate)** ฐานใบ (leaf base) **มน (obtuse)** ดอก (flower) รูปร่างของดอกตูม (at preblossom stage) **ขอบขนาน (oblong)** ปลายดอกตูม (flower apex) **แหลม (acute)** ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) **รูปไข่ (ovate)** ปลายผล (fruit apex) **แหลม (pointed)** ลักษณะฐานผล (fruit base) **ป้าน (flattened)** ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) **สั้น (short) < 5 เซนติเมตร** รูปร่างก้านผล (fruit peduncle shape) **ขอบนูน (lip)** หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) **นูนปลายแหลม (pointed convex)** หนามผลรอบจุดศูนย์กลางปลายผล (fruit spine at the center point of distal) **ไม่มีหนาม (absent)** หนามปลายผล (fruit spine apex) **หนามตรง (vertical spine)** หนามรอบขั้วผล (proximal spine) **หนามงุ้มเข้า (hooked spine)**

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) **เร็ว** การติดดอก (flowering) **ปานกลาง (intermediate)** การติดผล (fruit setting) **ปานกลาง (intermediate)** ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้ 15 ปี (fruit bearing) **80 ผล** ขนาดผล (fruit size) ความยาวผล **24 เซนติเมตร** ความกว้างผล **20 เซนติเมตร** เส้นรอบวงผล **61 เซนติเมตร** น้ำหนักผล (fruit weight) **3 กิโลกรัม** ความกว้างปากปลิง **2.06 เซนติเมตร** ความยาวจากขั้วผลถึงปากปลิง **3.30 เซนติเมตร** น้ำหนักเนื้อต่อผล (flesh weight) **710 กรัม** ความหนาเนื้อ (flesh thickness) **1.73 เซนติเมตร** สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) **YO 16 B** กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) **มีกลิ่นปานกลาง (intermediate)** รสชาติของเนื้อ (taste) **หวานมันพอดี** ลักษณะของเนื้อ (flesh texture) **ละเอียด (fine)** เส้นใยในเนื้อ (fiber) **ไม่มี (absent)** ปริมาณน้ำในเนื้อ (fruit juiciness) **ปานกลาง (intermediate)** น้ำหนักเปลือก (husk weight) **1,700 กรัม** สีเปลือก (husk colour) **YG 148 C** จำนวนเมล็ดตลบต่อเมล็ดเต็ม **-/100** ขนาดของเมล็ด (seed size) ความกว้าง (width) **3.6 เซนติเมตร** ความยาว (length) **5.43 เซนติเมตร** รูปทรงของเมล็ด (seed shape) **ขอบขนาน (oblong)** น้ำหนักเมล็ด (seed weight) **210 กรัม** ฤดูกาลผลิต (fruit season) **ตรงฤดูกาล (season)** อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) **102 วัน**

บันทึกเพิ่มเติม (notes)





ชื่อพันธุ์ นมสด (Nomsot)  
ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* Murray  
สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง  
ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

ดอก (flower) รูปร่างของดอกตูม (flower shape) กลมรีขอบขนาน (oval ob long) ปลายดอกตูม (flower apex) มน (obtus) ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) ป้อมปลายใบ (obovate lanceolate) ปลายใบ (lea apex) cuspibate acuminate ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute)


ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) เร็ว การติดดอก (flowering) มาก (abadant) การติดผล (fruit setting) มาก (abadant) ฤดูกาลผลิต (fruit season) ในฤดูกาล (mid season) อายุการเก็บเกี่ยว 130 วัน

ลักษณะพิเศษ (notes)

ทรงผลและทรงต้นคล้ายกับพันธุ์หมอนทองมากแต่หนามผลจะมีขนาดเล็กกว่า-และขนาดผลจะเล็กกว่าพันธุ์หมอนทอง เนื้อมีสีขาว เนื้อละเอียดคล้ายพันธุ์กำป็น เมล็ดโต แข็งแรง ลักษณะเด่นของพันธุ์นี้คือเนื้อมีสีขาวคล้ายนมสด มีลายเส้นแบ่งพูชัดเจน และมีหนามผลเป็นหนามคู่ตรงบริเวณกลางพูเห็นเด่นชัดมาก เป็นทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองที่ทนแล้งมากที่สุดพันธุ์หนึ่ง

บันทึกเพิ่มเติม (notes)



ชื่อพันธุ์	นมสวรรค์ (Nonsawan)
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Durio zibethinus</i> Murray
ประวัติ	ได้จากการเพาะเมล็ดทองฮ้อย แหล่งที่ค้นพบ จ.จันทบุรี
สถานภาพพันธุ์	พันธุ์พื้นเมือง



### ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) **ไม่เป็นระเบียบ (not orderly)** ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) **ยาวเรียว (linear-oblong)** ปลายใบ (leaf apex) **caudate-acuminate** ฐานใบ (leaf base) **แหลม (acute)** ดอก (flower) รูปร่างของดอกตูม (flower shape at preblossom stage) **รูปไข่กลับ (obovate)** ปลายดอกตูม (flower apex) **มน (obtuse)** ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) **รูปรี (elliptic)** ปลายผล (fruit apex) **ป้าน (flattened)** ลักษณะฐานผล (fruit base) **ป้าน (flattened)** ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) **ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร** รูปร่างก้านผล (fruit peduncle shape) **ขอบมน (lip)** หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) **มนปลายแหลม (pointed-convex)** หนามผลรอบจุดศูนย์กลางปลายผล (fruit spine at the center point of distal) **มีหนาม (present)** หนามปลายผล (fruit spine apex) **หนามตรง (vertical spine)** หนามรอบขั้วผล (proximal spine) **หนามตรง (vertical)**

### ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) **ปานกลาง (medium)** การออกดอก (flowering) **ปานกลาง (intermediate)** การติดผล (fruit setting) **ปานกลาง (intermediate)** ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้ 15 ปี (fruit bearing) **70 ผล** ความยาวผล **22.64 เซนติเมตร** ความกว้างผล **19 เซนติเมตร** เส้นรอบวงผล **59 เซนติเมตร** น้ำหนักผล (fruit weight) **2.08 กิโลกรัม** ความกว้างปากปลิง **1.84 เซนติเมตร** ความยาวจากขั้วผลถึงปากปลิง **5.7 เซนติเมตร** น้ำหนักเนื้อ (flesh weight) **385 กรัม** ความหนาเนื้อ (flesh thickness) **0.86 เซนติเมตร** สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) **Y 10AB** กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) **ปานกลาง (medium)** รสชาติของเนื้อ (taste) **หวานมันพอดี** ลักษณะของเนื้อ (flesh texture) **ละเอียด (fine)** เส้นใยในเนื้อ (fiber) **ไม่มี (absent)** ปริมาณน้ำในเนื้อ (fruit juiciness) **ปานกลาง (intermediate)** น้ำหนักเปลือก (shell weight) **1,520 กรัม** สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) **YG 153 C,D** จำนวนเมล็ดต่อบลูต่อเมล็ดเต็ม **8/92** ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกว้าง (width) **2.61 เซนติเมตร** ความยาว **5.76 เซนติเมตร** รูปทรงของเมล็ด (shape of stone) **ขอบขนาน (oblong)** น้ำหนักเมล็ด (weight of stone) **175 กรัม**

### บันทึกเพิ่มเติม (notes)

---



---



---

ชื่อพันธุ์ บางขุนนนท์ (Bangkhunnon)

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* Murray

สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง

### ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) **ไม่เป็นระเบียบ (not orderly)** ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) **ป้อมกลางใบ (elliptical)** ปลายใบ (leaf apex) **แหลมเรียว (acuminate-acute)** ฐานใบ (leaf base) **แหลม (acute)** ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) **กลมแป้น (oblate)** ปลายผล (fruit apex) **ป้าน (flattened)** ลักษณะฐานผล (fruit base) **ป้าน (flattened)** ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) **สั้น (short) < 5 เซนติเมตร** รูปร่างก้านผล (fruit peduncle shape) **ขอบนูน (lip)** หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) **เว้าปลายแหลม (pointed-concave)** หนามผลรอบจุดศูนย์กลางบริเวณปลายผล (fruit spine at the center point of distal) **มีหนาม (present)** หนามปลายผล (fruit spine apex) **หนามตรง (vertical spine)** หนามรอบขั้วผล (proximal spine) **หนามตรง (vertical)**

### ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) **เร็ว** การออกดอก (flowering) **มาก (abundant)** การติดผล (fruit setting) **มาก (abundant)** ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้ 15 ปี (fruit bearing) **100-120 ผล** กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) **ปานกลาง (medium)** รสชาติของเนื้อ (taste) **มันมากกว่าหวาน** ลักษณะของเนื้อ (fruit texture) **ละเอียด (fine)** เส้นใยในเนื้อ (fibre) **ไม่มี (absent)** ปริมาณน้ำในเนื้อ (fruit juiciness) **ปานกลาง (intermediate)**

### บันทึกเพิ่มเติม (notes)

---

---

---

ชื่อพันธุ์ บาตรทองคำ (อีบาตร) (Batthongkamm (E-bat))  
ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* Murray  
ประวัติ แหล่งที่ค้นพบ สวนนายจรรยา ภูเก็ต ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ  
สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง

ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไม่เป็นระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) รูปไข่ขอบขนาน (oval-oblong) ปลายใบ (leaf apex) acuminate-curve ฐานใบ (leaf base) กลมมน (rounded-obtuse) ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) กลมรี (oval) ความยาวความยาวก้านผล (fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) หนูปปลายแหลม (pointedconvex)

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate) การติด ผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate) ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้ 15 ปี (fruit bearing) 100-120 ผล ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตรงฤดูกาล (season) อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) 100-120 วัน


บันทึกเพิ่มเติม (notes)

---

---

---

ชื่อพันธุ์	ปิ่นทอง (Pinthong)
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Durio zibethinus</i> Murray
ประวัติ	เกิดจากการเพาะพันธุ์กำปิ่น แหล่งที่ค้นพบ จ.จันทบุรี จ.ระยอง
สถานภาพพันธุ์	พันธุ์พื้นเมือง



### ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) **ไม่เป็นระเบียบ (not orderly)** ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) **ยาวเรียว (linear-oblong)** ปลายใบ (leaf apex) **caudate-acuminate** ฐานใบ (leaf base) **แหลม (acute)** ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) **ขอบขนาน (oblong)** ปลายผล (fruit apex) **แหลม (pointed)** ลักษณะฐานผล (fruit base) **ป้าน (flattened)** ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) **ปานกลาง (medium)** 5-11 เซนติเมตร รูปร่างก้านผล (fruit peduncle shape) **ขอบนูน (lip)** หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) **นูนปลายแหลม (pointed-convex)** หนามผลรอบจุดศูนย์กลางปลายผล (fruit spine at the center point of distal) **ไม่มีหนาม (absent)** หนามปลายผล (fruit spine apex) **หนามตรง (vertical spine)** หนามรอบขั้วผล (proximal spine) **หนามตรง (vertical)**

### ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) **ปานกลาง (medium)** การออกดอก (flowering) **ปานกลาง (intermediate)** ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้ 15 ปี (fruit bearing) **80-100 ผล** ความยาวผล **22 เซนติเมตร** ความกว้างผล **19 เซนติเมตร** เส้นรอบวงผล **59 เซนติเมตร** น้ำหนักผล (fruit weight) **1.97 กิโลกรัม** ความกว้างปากปลิง **2.30 เซนติเมตร** ความยาวจากขั้วผลถึงปากปลิง **8 เซนติเมตร** น้ำหนักเนื้อ (flesh weight) **717 กรัม** ความหนาเนื้อ (flesh thickness) **1.56 เซนติเมตร** สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) **Y 138** กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) **มีกลิ่นแรง (strong)** รสชาติของเนื้อ (taste) **หวานมันพอดี** ลักษณะของเนื้อ (flesh texture) **ละเอียด (fine)** เส้นใยในเนื้อ (fiber) **ไม่มี (absent)** ปริมาณน้ำในเนื้อ (fruit juiciness) **ปานกลาง (intermediate)** น้ำหนักเปลือก (shell weight) **2,057 กรัม** สีเปลือกผลสุก (skin colour of ripe fruit) **Y 164 B** จำนวนเมล็ดต่อบทผลเต็ม **36/64** ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกว้าง (width) **3.93 เซนติเมตร** ความยาว **6.67 เซนติเมตร** รูปทรงของเมล็ด **ขอบขนาน (oblong)** น้ำหนักเมล็ด (weight of stone) **213 กรัม** ฤดูกาลผลิต (fruiting season) **ตรงฤดูกาล (season)** อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) **120 วัน**

### บันทึกเพิ่มเติม (notes)

---



---



---



---

ชื่อพันธุ์	ฝอยทอง (Foithong)
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Durio zibethinus</i> Murray
ประวัติ	แหล่งที่ค้นพบ จ.จันทบุรี
สถานภาพพันธุ์	พันธุ์พื้นเมือง



### ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) **ไม่เป็นระเบียบ (not orderly)** ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) **ยาวเรียว (linear-oblong)** ปลายใบ (leaf apex) **เรียวแหลม (acuminate)** ฐานใบ (leaf base) **มน (obtus)** ดอก (flower) ปลายดอกตูม (fruit apex) **มน (obtus)** ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) **รูปรี (elliptic)** ปลายผล (fruit apex) **ป้าน (flattened)** ลักษณะฐานผล (fruit base) **ป้าน (flattened)** ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) **ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร** รูปร่างก้านผล (fruit peduncle shape) **ขอบมน (lip)** หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) **นูนปลายแหลม (pointed-convex)** หนามผลรอบจุดศูนย์กลางปลายผล (fruit spine at the center point of distal) **มีหนาม (present)** หนามปลายผล (fruit spine apex) **หนามตรง (vertical spine)** หนามรอบขั้วผล (proximal spine) **หนามตรง (vertical)**

### ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) **เร็ว** การออกดอก (flowering) **มาก (abundant)** การติดผล (fruit setting) **มาก (abundant)** ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้ 15 ปี (fruit bearing) **110-120 ผล** ความยาวผล **19 เซนติเมตร** ความกว้างผล **14.12 เซนติเมตร** เส้นรอบวงผล **46 เซนติเมตร** น้ำหนักผล (fruit weight) **1.23 กิโลกรัม** ความกว้างปากปลิง **1.8 เซนติเมตร** ความยาวจากขั้วผลถึงปากปลิง **4.6 เซนติเมตร** น้ำหนักเนื้อ (flesh weight) **282 กรัม** ความหนาเนื้อ (flesh thickness) **0.93 เซนติเมตร** สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) **Y 12B,C** กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) **มีกลิ่นอ่อน (mild)** รสชาติของเนื้อ (taste) **หวานมันพอดี** ลักษณะของเนื้อ (flesh texture) **ละเอียด (coarse)** เส้นใยในเนื้อ (fiber) **ไม่มี (absent)** ปริมาณน้ำในเนื้อ (fruit juiciness) **ปานกลาง (intermediate)** น้ำหนักเปลือก (shell weight) **894 กรัม** สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) **YG 152B,C,D** จำนวนเมล็ดดิบต่อเมล็ดเต็ม **78/22** ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกว้าง (width) **1.86 เซนติเมตร** ความยาว **3.78** รูปทรงของเมล็ด (shape of stone) **ขอบขนาน (oblong)** น้ำหนักเมล็ด (weight of stone) **63 กรัม** ฤดูกาลผลิต (fruiting season) **ตรงฤดูกาล (season)** อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) **95 วัน**

### บันทึกเพิ่มเติม (notes)

---



---



---

ชื่อพันธุ์ เป็ดลม (Petthop)  
ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* Murray  
ประวัติ เกิดจากการเพาะพันธุ์กำป็น  
แหล่งที่ค้นพบ จ.จันทบุรี จ.ระยอง  
สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง

ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไม่เป็นระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) ป้อม  
กลางใบ (elliptical) ปลายใบ (leaf apex) caudate-acuminate ฐานใบ (leaf base) กลมมน (rounded-obtuse) ผล (fruit) ทรงผล  
(fruit shape) กลมรี (oval) ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor)

---

---

---

บันทึกเพิ่มเติม (notes)

---

---

---

ชื่อพันธุ์ พวงฉัตร (Phuang Chat)  
ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* Murray  
ประวัติ ได้จากการเพาะเมล็ดทองฮ้อย  
แหล่งที่ค้นพบ จ.จันทบุรี จ.ระยอง  
สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง

ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไม่เป็นระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) ป้อม  
โคนใบ (ovate-lanceolate) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ฐานใบ (leaf base) มน (obtuse) ผล (fruit) ทรงผล  
(fruit shape) รูปไข่ (ovate) ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร หนามผล (fruit  
spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) หนูปปลายแหลม (pointed-convex)

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor)

---

---

---

บันทึกเพิ่มเติม (notes)

---

---

---

ชื่อพันธุ์	พวงมณี (Phaung Mani)
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Durio zibethinus</i> Murray
ประวัติ	แหล่งที่ค้นพบ จ. จันทบุรี และ จ.ระยอง
สถานภาพพันธุ์	พันธุ์พื้นเมือง



### ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) **ไม่เป็นระเบียบ (not orderly)** ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) **รูปไข่ขอบขนาน (oval-oblong)** ปลายใบ (leaf apex) **เรียวแหลม (acuminate)** ฐานใบ (leaf base) **แหลม (acute)** ดอก (flower) รูปร่างของดอกตูม (flower shape at preblossom stage) **กลมรี (oval)** ปลายดอกตูม (flower apex) **มน (obtuse)** ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) **รูปรี (elliptic)** ปลายผล (fruit apex) **แหลม (pointed)** ลักษณะฐานผล (fruit base) **ป้าน (flattened)** ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) **ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร** รูปร่างก้านผล (fruit peduncle shape) **ขอบนูน (lip)** หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) **นูนปลายแหลม (pointed-convex)** หนามผลรอบจุดศูนย์กลางปลายผล (fruit spine at the center point of distal) **มีหนาม (absent)** หนามปลายผล (fruit spine apex) **หนามตรง (vertical spine)** หนามรอบขั้วผล (proximal spine) **หนามตรง (vertical)**

### ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) **เร็ว** การออกดอก (flowering) **มาก (abundant)** การติดผล (fruit setting) **มาก (abundant)** ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้ 15 ปี (fruit bearing) **110-120 ผล** ความยาวผล **18.38 เซนติเมตร** ความกว้างผล **14.88 เซนติเมตร** เส้นรอบวงผล **48.16 เซนติเมตร** น้ำหนักผล (fruit weight) **1.36 กิโลกรัม** ความกว้างปากปลิง **1.87 เซนติเมตร** ความยาวจากขั้วผลถึงปากปลิง **6.92 เซนติเมตร** น้ำหนักเนื้อ (flesh weight) **253 กรัม** ความหนาเนื้อ (flesh thickness) **0.67 เซนติเมตร** สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) **YO24B,D** กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) **มีกลิ่นอ่อน (mild)** รสชาติของเนื้อ (taste) **หวานมันพอดี** ลักษณะของเนื้อ (flesh texture) **ละเอียด (fine)** เส้นใยในเนื้อ (fiber) **ไม่มี (absent)** ปริมาณน้ำในเนื้อ (fruit juiciness) **ปานกลาง (intermediate)** น้ำหนักเปลือก (shell weight) **948 กรัม** สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) **YG153B,C** จำนวนเมล็ดดิบต่อเมล็ดเต็ม **39/61** ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกว้าง (width) **1.98 เซนติเมตร** ความยาว **5.26 เซนติเมตร** รูปทรงของเมล็ด (stone shape) **ขอบขนาน (oblong)** น้ำหนักเมล็ด (weight of stone) **159 กรัม** ฤดูกาลผลิต (fruiting season) **ตรงฤดูกาล (season)** อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) **120 วัน**

### บันทึกเพิ่มเติม (notes)

---



---



---



ชื่อพันธุ์ พวงมาลัย (Phuang Malai)  
 ชื่อวิทยาศาสตร์ Durio zibethinus Murray  
 ประวัติ แหล่งที่ค้นพบ สวนนายไพสิต หิรัญศิริ  
 บางกอกน้อย จ.กรุงเทพฯ  
 สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง

ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) **ไม่เป็นระเบียบ (not orderly)** ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) **ยาวเรียว (linear-oblong)** ปลายใบ (leaf apex) **เรียวแหลม (acuminate)** ฐานใบ (leaf base) **กลมมน (rounded-obtuse)** ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) **กลมรี (oval)** หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) **นูนปลายแหลม (pointed convex)** ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) **ปานกลาง (short) 5-11 เซนติเมตร**

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor)

บันทึกเพิ่มเติม (notes)

ชื่อพันธุ์ พันธุ์เมืองเกาะช้าง (Phuenmueang Kochang)  
 ชื่อวิทยาศาสตร์ Durio zibethinus Murray  
 สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง



ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) **กลมรี (oval)** ปลายผล (fruit apex) **แหลม (pointed)** ลักษณะฐานผล (fruit base) **บุ๋ม (depressed)** ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) **ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร** รูปร่างก้านผล (fruit peduncle shape) **ขอบนูน (lip)** หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) **นูน (convex)** หนามผลรอบจุดศูนย์กลางปลายผล (fruit spine at the center point of distal) **มีหนาม (present)** หนามปลายผล (fruit spine apex) **หนามตรง (vertical spine)** หนามรอบขั้วผล (proximal spine) **หนามงุ้มเข้า (hooked)**

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor)

บันทึกเพิ่มเติม (notes)

ชื่อพันธุ์ ฟักข้าว (Fakkhao)  
ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* Murray  
สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง

#### ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) **ไม่เป็นระเบียบ (not orderly)** ใบ (leaf) กิ่งรูปร่างของใบ (leaf shape) **ป้อมกลางใบ (elliptical)** ปลายใบ (leaf apex) **caudate- acuminate** ฐานใบ (leaf base) **กลมมน (rounded - obtuse)** ดอก (flower) รูปร่างของดอกตูม (flower shape at preblossom stage) **กลมรี (oval)** ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) **กลม (rounded)** ปลายผล (fruit apex) **ป้าน (flattened)** ลักษณะฐานผล (fruit base) **ป้าน (flattened)** ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) **ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร** รูปร่างก้านผล (fruit peduncle shape) **ขอบนูน (lip)** หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) **เว้าปลายแหลม (pointed concave)** หนามผลรอบจุดศูนย์กลางปลายผล (fruit spine at the center point of distal) **ไม่มีหนาม (present)** หนามปลายผล (fruit spine apex) **หนามตรง (vertical spine)** หนามรอบขั้วผล (proximal spine) **หนามตรง (vertical)**



#### ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) **เร็ว** การออกดอก (flowering) **มาก (abundant)** การติดผล (fruit setting) **มาก (abundant)** ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้ 15 ปี (fruit bearing) **100-120 ผล** ความยาวผล **16 เซนติเมตร** ความกว้างผล **16 เซนติเมตร** เส้นรอบวงผล **52 เซนติเมตร** น้ำหนักผล (fruit weight) **1.4 กิโลกรัม** ความกว้างปากปลิง **1.72 เซนติเมตร** ความยาวจากขั้วผลถึงปากปลิง **7.11 เซนติเมตร** น้ำหนักเนื้อ (flesh weight) **500 กรัม** ความหนาเนื้อ (flesh thickness) **1.15 เซนติเมตร** สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) **Y 11 B** กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) **มีกลิ่นอ่อน (mild)** รสชาติของเนื้อ (taste) **มันมากกว่าหวาน** ลักษณะของเนื้อ (flesh texture) **ปานกลาง (medium)** เส้นใยในเนื้อ (fiber) **มี (present)** ปริมาณน้ำในเนื้อ (fruit juiciness) **ปานกลาง (intermediate)** น้ำหนักเปลือก (shell weight) **720 กรัม** สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) **YG 152 C** จำนวนเมล็ดต่อบต่อเมล็ดเต็ม **31/69** ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกว้าง (width) **3.33 เซนติเมตร** ความยาว **4.80 เซนติเมตร** รูปทรงของเมล็ด (shape of stone) **ขอบขนาน (oblong)** น้ำหนักเมล็ด (weight of stone) **180 กรัม** ฤดูกาลผลิต (fruiting season) **ตรงฤดูกาล (season)** อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) **120 วัน**

ชื่อพันธุ์ มดแดง (Motdaeng)  
ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* Murray  
สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง

#### ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) **รูปรี (elliptic)** ปลายผล (fruit apex) **ป้าน (flattened)** ลักษณะฐานผล (fruit base) **ป้าน (flattened)** ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) **ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร** รูปร่างก้านผล (fruit peduncle shape) **ขอบนูน (lip)** หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) **เว้า (concave)** หนามผลรอบจุดศูนย์กลางปลายผล (fruit spine at the center point of distal) **ไม่มีหนาม (absent)** หนามปลายผล (fruit spine apex) **หนามตรง (vertical spine)** หนามรอบขั้วผล (proximal spine) **หนามงุ้มเข้า (hooked)**



#### ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor)

ชื่อพันธุ์ เม็ดในกระดุม (Metnai Kradum)

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* Murray

สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง


### ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) **ป้อมโคนใบ (ovate-lanceolate)** ปลายใบ (leaf apex) **เรียวแหลม (acuminate)**  
ฐานใบ (leaf base) **แหลม (acute)** ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) **กลมรี (oval)** ปลายผล (fruit apex) **ป้าน (flattened)** ลักษณะ  
ฐานผล (fruit base) **ป้าน (flattened)** ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) **สั้น (short) < 5 เซนติเมตร** รูปร่างก้านผล (fruit  
peduncle shape) **ขอบนูน (lip)** หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) **เว้าปลายแหลม (pointed concave)**  
หนามผลรอบจุดศูนย์กลางปลายผล (fruit spine at the center point of distal) **ไม่มีหนาม (absent)** หนามปลายผล (fruit spine  
apex) **หนามตรง (vertical spine)** หนามรอบขั้วผล (proximal spine) **หนามงุ้มเข้า (hooked)**

### ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) **ปานกลาง (medium)** การออกดอก (flowering) **ปานกลาง (intermediate)**  
ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้ 15 ปี (fruit bearing) **120 ผล** ความยาวผล **20 เซนติเมตร** ความกว้างผล **16 เซนติเมตร** เส้นรอบวงผล  
**52 เซนติเมตร** น้ำหนักผล (fruit weight) **1.82 กิโลกรัม** ความกว้างปากปลิง **1.74 เซนติเมตร** ความยาวจากขั้วผลถึงปากปลิง  
**4.76 เซนติเมตร** น้ำหนักเนื้อ (flesh weight) **585 กรัม** ความหนาเนื้อ (flesh thickness) **0.77 เซนติเมตร** สีเนื้อผลสุก (flesh  
colour of ripe fruit) **Y 10 C** กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) **มีกลิ่นอ่อน (mild)** รสชาติของเนื้อ (taste) **หวานมันพอดี** ลักษณะของ  
เนื้อ (flesh texture) **ปานกลาง (intermediate)** เส้นใยในเนื้อ (fiber) **มี (present)** ปริมาณน้ำในเนื้อ (fruit juiciness) **ปานกลาง  
(intermediate)** น้ำหนักเปลือก (shell weight) **800 กรัม** สีเปลือกผลสุก (skin colour of green fruit) **GO 152 C** จำนวนเมล็ดดิบ  
ต่อเมล็ดเต็ม **22/78** ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกว้าง (width) **3.69 เซนติเมตร** ความยาว **5.22 เซนติเมตร** รูปทรงของเมล็ด  
(seed shape) **ขอบขนาน (oblong)** สีของเมล็ด (stone colour) **GO 164 B** น้ำหนักเมล็ด (weight of stone) **435 กรัม** ฤดูกาลผลิต  
(fruiting season) **ตรงฤดูภาค (season)** อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting setting) **90 วัน**

### บันทึกเพิ่มเติม (notes)



ชื่อพันธุ์ เม็ดในก้านยาว (Matnai Kanyao)

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* Murray

สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง

#### ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) **ป้อมโคนใบ (ovate-lanceolate)** ปลายใบ (leaf apex) **เรียวแหลม (acuminate)** ฐานใบ (leaf base) **แหลม (acute)** ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) **กลมรี (oval)** ปลายผล (fruit apex) **แหลม (pointed)** ลักษณะฐานผล (fruit base) **นูน (depressed)** ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) **ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร** รูปร่างก้านผล (fruit peduncle shape) **ขอบนูน (lip)** หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) **เว้า (concave)** หนามผลรอบจุดศูนย์กลางปลายผล (fruit spine at the center point of distal) **ไม่มีหนาม (absent)** หนามปลายผล (fruit spine apex) **หนามตรง (vertical spine)** หนามรอบขั้วผล (proximal spine) **หนามตรง (vertical spine)**



#### ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor)

ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้ 15 ปี (fruit bearing) 100 ผล ความยาวผล **25.5 เซนติเมตร** ความกว้างผล **21 เซนติเมตร** เส้นรอบวงผล **62.5 เซนติเมตร** น้ำหนักผล (fruit weight) **3.02 กิโลกรัม** ความกว้างปากปลิง **1.5 เซนติเมตร** ความยาวจากขั้วผลถึงปากปลิง **4.5 เซนติเมตร** น้ำหนักเนื้อ (flesh weight) **820 กรัม** ความหนาเนื้อ (flesh thickness) **1.2 เซนติเมตร** สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) **Y 10 A** กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) **มีกลิ่นอ่อน (mild)** รสชาติของเนื้อ (taste) **มันมากกว่าหวาน** ลักษณะของเนื้อ (flesh texture) **ละเอียด (coarse)** เส้นใยในเนื้อ (fiber) **ไม่มี (absent)** ปริมาณน้ำในเนื้อ (fruit juiciness) **ปานกลาง (intermediate)** น้ำหนักเปลือก (shell weight) **1,900 กรัม** สีเปลือกผลสุก (skin colour of ripe fruit) **GO 177 C** จำนวนเมล็ดดิบต่อเมล็ดเต็ม **17/83** ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกว้าง (width) **2.23 เซนติเมตร** ความยาว **5.30 เซนติเมตร** รูปทรงของเมล็ด (shape of stone) **ขอบขนาน (oblong)** สีของเมล็ด (stone colour) **GO 165 B** น้ำหนักเมล็ด (weight of stone) **300 กรัม** ฤดูกาลผลิต (fruiting season) **ตรงฤดูกาล (season)** อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) **130 วัน**

#### บันทึกเพิ่มเติม (notes)

ชื่อพันธุ์ เม็ดในกำปัน (Matnai Kampan)

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* Murray

ประวัติ แหล่งที่ค้นพบ จ.ปราจีนบุรี

สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง

#### ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) **ไม่เป็นระเบียบ (not orderly)** ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) **ป้อมกลางใบ (elliptical)** ปลายใบ (leaf apex) **(caudate-acuminate)** ฐานใบ (leaf base) **แหลม (acute)** ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) **ขอบขนาน (oblong)** หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) **แหลม (pointed)**

#### ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor)

#### บันทึกเพิ่มเติม (notes)

ชื่อพันธุ์ เม็ดในบางขุนนนท์ (Metnai Bangkhunnon)

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* Murray

ประวัติ แหล่งที่ค้นพบ จ.นนทบุรี จ.ปราจีนบุรี

สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง

#### ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไม่เป็นระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) รูปไข่ขอบขนาน (ova-oblond) ปลายใบ (leaf apex) cuspidate-acuminate ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute) ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) กลมแป้น (oblate) ปลายผล (fruit apex) ป้าน (flattened) ลักษณะฐานผล (fruit base) ป้าน (flattened) ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร รูปร่างก้านผล (fruit peduncle shape) ขอบนูน (lip) หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) เว้าปลายแหลม (pointed-concave) หนามผลรอบจุดศูนย์กลางปลายผล (fruit spine at the center point of distal) ไม่มีหนาม (absent) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนามตรง (vertical spine) หนามรอบข้อผล (proximal spine) หนามตรง (vertical)

#### ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor)

#### บันทึกเพิ่มเติม (notes)

ชื่อพันธุ์ เม็ดในยายปราง (Matnai Yaiprang)

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* Murray

แหล่งที่ค้นพบ สวนนายเสริม ฉิมชาญเวช จ.นนทบุรี

สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง

#### ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไม่เป็นระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) ไข่กลางใบ (elliptical) ปลายใบ (leaf apex) cuspidate-acuminate ฐานใบ (leaf base) กลมมน (rounded-obtuse) ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) กลมแป้น (oblate) ปลายผล (fruit apex) ป้าน (flattened) ลักษณะฐานผล (fruit base) ป้าน (flattened) ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร รูปร่างก้านผล (fruit peduncle shape) ขอบนูน (lip) หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) นูนปลายแหลม (pointed-convex) หนามผลรอบจุดศูนย์กลางปลายผล (fruit spine at the center point of distal) มีหนาม (present) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนามตรง (vertical spine) หนามรอบข้อผล (proximal spine) หนามงุ้มเข้า (hooked)

#### ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor)

#### บันทึกเพิ่มเติม (notes)

ชื่อพันธุ์ เม็ดในหลวง (Metnai Luang)

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* Murray

สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง

ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

---

---

---

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) ปานกลาง (medium) การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate)

---

---

บันทึกเพิ่มเติม (notes)

---

---

ชื่อพันธุ์ ย่อมแม่หวาด (Yammaewat)

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* Murray

สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง

ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

---

---

---



ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล (fruit setting) มาก (abundant) ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้ 15 ปี (fruit bearing) 100-120 ผล ความยาวผล 24 เซนติเมตร ความกว้างผล 19 เซนติเมตร เส้นรอบวงผล 66 เซนติเมตร น้ำหนักผล (fruit weight) 4.18 กิโลกรัม ความกว้างปากปลิง 1.76 เซนติเมตร ความยาวจากขั้วผลถึงปากปลิง 5.07 เซนติเมตร น้ำหนักเนื้อ (flesh weight) 1,507.5 กรัม ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 1.50 เซนติเมตร สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) Y 11 C กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) มีกลิ่นอ่อน (mild) รสชาติของเนื้อ (taste) มันมากกว่าหวาน ลักษณะของเนื้อ (flesh texture) หยาบ (coarse) เส้นใยในเนื้อ (fiber) มี (present) ปริมาณน้ำในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate) น้ำหนักเปลือก (shell weight) 2,260 กรัม สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) YG 146 C จำนวนเมล็ดลึบต่อเมล็ดเต็ม 61/39 ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกว้าง (width) 2.82 เซนติเมตร ความยาว 5.97 เซนติเมตร รูปทรงของเมล็ด (stone shape) ขอบขนาน (oblong) สีของเมล็ด (stone colour) GO 146 B น้ำหนักเมล็ด (weight of stone) 412 กรัม ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตรงฤดูกาล (season) อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) 130 วัน

บันทึกเพิ่มเติม (notes)

---

---

ชื่อพันธุ์ ย่ำมะหวาด (Yummawat)  
ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* Murray  
ประวัติ เกิดจากเพาะเมล็ดหลวง  
แหล่งที่ค้นพบ จ.จันทบุรี จ.ปราจีนบุรี  
สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง

#### ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) เป็นระเบียบ (orderly) ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) ไข่ปลายใบ (obovate-lanceolate) ปลายใบ (Leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute) ดอก (flower) รูปร่างของดอกตูม (flower shape at preblossom stage) กลมรีขอบขนาน (oval-oblong) ปลายดอกตูม (flower apex) แหลม (acute) ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) รูปรี (elliptic) ปลายผล (fruit apex) ปาน (flattened) ลักษณะฐานผล (fruit base) ปาน (flattened) ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร รูปร่างก้านผล (fruit peduncle shape) ขอบนูน (lip) หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) เว้า (concave) หนามผลรอบจุดศูนย์กลางปลายผล (fruit spine at the center point of distal) มีหนาม (present) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนามตรง (vertical spine) หนามรอบขั้วผล (proximal spine) หนามตรง (vertical)

#### ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) ปานกลาง (medium) การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate) การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate) ความยาวผล 27.31 เซนติเมตร ความกว้างผล 18.72 เซนติเมตร เส้นรอบวงผล 56.78 เซนติเมตร น้ำหนักผล (fruit weight) 2.94 กิโลกรัม ความกว้างปากปลิง 1.79 เซนติเมตร ความยาวจากขั้วผลถึงปากปลิง 5.41 เซนติเมตร น้ำหนักเนื้อ (flesh weight) 750 กรัม ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 2.15 เซนติเมตร สีเนื้อผลดิบ (flesh colour of mature green fruit) YG 9D น้ำหนักเปลือก (shell weight) 1,790 กรัม สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) YG 146D จำนวนเมล็ดต่อบทเมล็ดเต็ม 100/100 ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกว้าง (width) 2.48 เซนติเมตร ความยาว 6.26 เซนติเมตร น้ำหนักเมล็ด (weight of stone) 180 กรัม ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตรงฤดูกาล (season) อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) 103-105 วัน

#### บันทึกเพิ่มเติม (notes)

---

---

---



ชื่อพันธุ์ ยินดี (Yindi)  
 ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* Murray  
 ประวัติ แหล่งที่ค้นพบ จ. จันทบุรี จ.ระยอง  
 และ จ. อุตรดิตถ์



ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) **ไม่เป็นระเบียบ (not orderly)** ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) **รูปไข่ขอบขนาน (oval-oblong)** ปลายใบ (leaf apex) **เรียวแหลม (acuminate)** ฐานใบ (leaf base) **แหลม (acute)** ดอก (flower) รูปร่างของดอกตูม (flower shape at preblossom stage) **ขอบขนาน (oblong)** ปลายดอกตูม (flower apex) **แหลม (acute)** ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) **กลมแป้น (oblate)** ปลายผล (fruit apex) **ป้าน (flattened)** ลักษณะฐานผล (fruit base) **ป้าน (flattened)** ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) **ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร** รูปร่างก้านผล (fruit peduncle shape) **ขอบวงแหวน (funnel)** หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) **นูนปลายแหลม (pointed-convex)** หนามผลรอบจุดศูนย์กลางปลายผล (fruit spine at the center point of distal) **ไม่มีหนาม (absent)** หนามปลายผล (fruit spine apex) **หนามงุ้มเข้า (hooked spine)** หนามรอบขั้วผล (proximal spine) **หนามงุ้มเข้า (hooked)**

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) **ปานกลาง (medium)** การออกดอก (flowering) **มาก (abundant)** การติดผล (fruit setting) **ปานกลาง (intermediate)** ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้ 15 ปี (fruit bearing) **100 ผล** ความยาวผล **14.32 เซนติเมตร** ความกว้างผล **16.45 เซนติเมตร** เส้นรอบวงผล **54.02 เซนติเมตร** น้ำหนักผล (fruit weight) **1.50 กิโลกรัม** ความกว้างปากปลิง **1.42 เซนติเมตร** ความยาวจากขั้วผลถึงปากปลิง **10.56 เซนติเมตร** น้ำหนักเนื้อ (flesh weight) **340 กรัม** ความหนาเนื้อ (flesh thickness) **0.91 เซนติเมตร** สีเนื้อผลดิบ (flesh colour of mature green fruit) **YOG46AB** กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) **มีกลิ่นอ่อน (mild)** รสชาติของเนื้อ (taste) **หวานมันพอดี** ลักษณะของเนื้อ (flesh texture) **ละเอียด (fine)** เส้นใยในเนื้อ (fiber) **ไม่มี (absent)** ปริมาณน้ำในเนื้อ (fruit juiciness) **ปานกลาง (intermediate)** น้ำหนักเปลือก (shell weight) **1,084 กรัม** สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) **YG146B,C** จำนวนเมล็ดดิบต่อเมล็ดเต็ม **8/92** ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกว้าง (width) **2.99 เซนติเมตร** ความยาว **4.97 เซนติเมตร** รูปทรงของเมล็ด (stone shape) **ขอบขนาน (oblong)** น้ำหนักเมล็ด (weight of stone) **116 กรัม** ฤดูกาลผลิต (fruiting season) **ตรงฤดูกาล (season)** อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) **102 วัน**

บันทึกเพิ่มเติม (notes)

---



---



---



ชื่อพันธุ์	หลวง/หลวงทอง (Luang/Luang Thong)
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Durio zibethinus</i> Murray
ประวัติ	เพาะจากเมล็ดหลวง แหล่งที่ค้นพบ จ.จันทบุรี จ.ระยอง
สถานภาพพันธุ์	พันธุ์พื้นเมือง



### ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) **ไม่เป็นระเบียบ (not orderly)** ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) **รูปไข่ขอบขนาน (oval-oblong)** ปลายใบ (leaf apex) **เรียวแหลม (acuminate)** ฐานใบ (leaf base) **แหลม (acute)** ดอก (fruit) รูปร่างของดอกตูม (flower shape at preblossom stage) **ขอบขนาน (oblong)** ปลายดอกตูม (flower apex) **แหลม (acute)** ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) **รูปรี (elliptic)** ปลายผล (fruit apex) **ป้าน (flattened)** ลักษณะฐานผล (fruit base) **ป้าน (flattened)** ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) **ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร** รูปร่างก้านผล (fruit peduncle shape) **นูนน้อย (lip)** หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) **เว้า (concave)** หนามผลรอบจุดศูนย์กลางปลายผล (fruit spine at the center point of distal) **ไม่มีหนาม (absent)** หนามปลายผล (fruit spine apex) **หนามตรง (vertical spine)** หนามรอบขั้วผล (proximal spine) **หนามตรง (vertical)**

### ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) **เร็ว** การออกดอก (flowering) **ปานกลาง (intermediate)** การติดผล (fruit setting) **ปานกลาง (intermediate)** ความยาวผล **23.8 เซนติเมตร** ความกว้างผล **18.63 เซนติเมตร** เส้นรอบวงผล **65.23 เซนติเมตร** ความกว้างปากปลิง **2.06 เซนติเมตร** ความยาวจากขั้วผลถึงปากปลิง **6.38 เซนติเมตร** น้ำหนักเนื้อ (flesh weight) **740 กรัม** ความหนาเนื้อ (flesh thickness) **2.17 เซนติเมตร** สีเนื้อผลดิบ (flesh colour of mature green fruit) **YOG 14D** กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) **มีกลิ่นอ่อน (mild)** รสชาติของเนื้อ (taste) **มันมากกว่าหวาน** ลักษณะของเนื้อ (fruit texture) **ละเอียด (coarse)** เส้นใยในเนื้อ (fiber) **ไม่มี (absent)** ปริมาณน้ำในเนื้อ (fruit juiciness) **ปานกลาง (intermediate)** น้ำหนักเปลือก (shell weight) **1,400 กรัม** สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) **YG 146 D** ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกว้าง (width) **3.13 เซนติเมตร** ความยาว **6.26 เซนติเมตร** รูปทรงของเมล็ด (shape of stone) **ขอบขนาน (oblong)** น้ำหนักเมล็ด (weight of stone) **120 กรัม** ฤดูกาลผลิต (fruiting season) **ตรงฤดูกาล (season)**

### บันทึกเพิ่มเติม (notes)

---



---



---



---

ชื่อพันธุ์ ลวงพะาะเมล็ด (Luang Pomalet)

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* Murray

สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง

ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) ป้อม โคนใบ (ovate - lanceolate) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ฐานใบ (leaf base) มน (obtuse)

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล (fruit setting) มาก (abundant) ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้ 15 ปี (fruit bearing) 100-120 ผล ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตรงฤดูกาล (season) อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) 120 วัน

บันทึกเพิ่มเติม (notes)

---

---

---

ชื่อพันธุ์ ลวงมะรุม (Luang Marum)

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* Murray

ประวัติ เพาะจากลวง  
แหล่งที่ค้นพบ ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง

ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไม่เป็นระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) รูปไข่ขอบขนาน (linear-oblong) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ฐานใบ (leaf base) มน (obtuse) ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) รูปรี (elliptic) ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) ปานกลาง (intermediate) หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) เว้า (concave)

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor)

---

---

---

บันทึกเพิ่มเติม (notes)

---

---

---

ชื่อพันธุ์ ลุงเกตุ (Lungket)  
ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* Murray  
สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง  
ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) ยาวเรียว (linear-oblong) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute)

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล (fruit setting) มาก (abundant) ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตรงฤดูกาล (season)

บันทึกเพิ่มเติม (notes)

---

---

---

ชื่อพันธุ์ ลุงไหล (Lunglai)  
ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* Murray  
สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง



ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) กลมรี (oval) ปลายผล (fruit apex) แหลม (pointed) ลักษณะฐานผล (fruit base) ปาน (flattened) ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร รูปร่างก้านผล (fruit peduncle shape) ขอบนูน (lip) หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) แหลม (pointed) หนามผลรอบจุดศูนย์กลางปลายผล (fruit spine at the center point of distal) มีหนาม (present) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนามตรง (vertical spine) หนามรอบขั้วผล (proximal spine) หนามงุ้มเข้า (hooked)

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล (fruit setting) มาก (abundant) ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้ 15 ปี (fruit bearing) 100-120 ผล ความยาวผล 16.5 เซนติเมตร ความกว้างผล 14.5 เซนติเมตร เส้นรอบวงผล 39 เซนติเมตร น้ำหนักผล (fruit weight) 0.8 กิโลกรัม ความกว้างปากปลิง 1.50 เซนติเมตร ความยาวจากขั้วผลถึงปากปลิง 5.12 เซนติเมตร สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) YG146 C ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตรงฤดูกาล (season) อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) 120 วัน

บันทึกเพิ่มเติม (notes)

---

---

---

ชื่อพันธุ์ ลูกหนัก (Luknak)  
ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* Murray  
สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง


#### ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไม่เป็นระเบียบ (not orderly) ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) รูปรี (elliptic) ปลายผล (fruit apex) แหลม (pointed) ลักษณะฐานผล (fruit base) ปาน (flattened) ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร รูปร่างก้านผล (fruit peduncle shape) ขอบนูน (lip) หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) เว้าปลายแหลม (pointed concave) หนามผลรอบจุดศูนย์กลางปลายผล (fruit spine at the center point of distal) ไม่มีหนาม (absent) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนามตรง (vertical spine) หนามรอบขั้วผล (proximal spine) หนามตรง (vertical spine)

#### ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) ปานกลาง (medium) การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate) ความยาวผล 30 เซนติเมตร ความกว้างผล 20.5 เซนติเมตร เส้นรอบวงผล 63.5 เซนติเมตร น้ำหนักผล (fruit weight) 3.5 กิโลกรัม ความกว้างปากปลิง 1.6 เซนติเมตร ความยาวจากขั้วผลถึงปากปลิง 6 เซนติเมตร น้ำหนักเนื้อ (flesh weight) 1,180 กรัม ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 0.91 เซนติเมตร สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) Y 12 B กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) มีกลิ่นอ่อน (mild) รสชาติของเนื้อ (taste) มันมากกว่าหวาน ลักษณะของเนื้อ (flesh texture) ละเอียด (coarse) เส้นใยในเนื้อ (fiber) ไม่มี (absent) ปริมาณน้ำในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate) น้ำหนักเปลือก (shell weight) 2,100 กรัม สีเปลือกผลสุก (skin colour of ripe fruit) GO 152 C จำนวนเมล็ดดิบต่อเมล็ดเต็ม 69/31 ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกว้าง (width) 2.82 เซนติเมตร ความยาว 4.72 เซนติเมตร รูปร่างของเมล็ด (shape of stone) ขอบขนาน (oblong) สีของเมล็ด (stone colour) GO 165 A น้ำหนักเมล็ด (weight of stone) 220 กรัม ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตรงฤดูกาล (season)

#### บันทึกเพิ่มเติม (notes)



ชื่อพันธุ์	สายหยุด (Saiyut)
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Durio zibethinus</i> Murray
ประวัติ	เพาะจากเมล็ดลวง แหล่งที่ค้นพบ จ.นนทบุรี
สถานภาพพันธุ์	พันธุ์พื้นเมือง

#### ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) **ไม่เป็นระเบียบ (not orderly)** ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) **ขอบขนาน (oblong)** ปลายใบ (leaf apex) **แหลมเรียว (acuminate-acute)** ฐานใบ (leaf base) **แหลม (acute)** ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) **รูปรี (elliptic)** ปลายผล (fruit apex) **ป้าน (flattened)** ลักษณะฐานผล (fruit base) **ป้าน (flattened)** ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) **ปานกลาง (medium)** 5-11 เซนติเมตร หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) **เว้า (concave)**

#### ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor)

#### บันทึกเพิ่มเติม (notes)

ชื่อพันธุ์	สาวชมฟ้าทอง (ฟ้าทอง) (Saochom Fakthong (Fakthong))
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Durio zibethinus</i> Murray
ประวัติ	แหล่งที่ค้นพบ สวนนางสาว ทศนีย์เวช จ.นนทบุรี
สถานภาพพันธุ์	พันธุ์พื้นเมือง

#### ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) **ไม่เป็นระเบียบ (not orderly)** ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) **รูปไข่ขอบขนาน (oval-oblong)** ปลายใบ (leaf apex) **เรียวแหลม (acuminate)** ฐานใบ (leaf base) **แหลม (acute)** ดอก (flower) รูปร่างของดอกตูม (flower shape at preblossom stage) **กลมรี (oval)** ปลายดอกตูม (flower apex) **แหลม (acute)** ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) **กลมรี (oval)** ปลายผล (fruit apex) **บุ๋ม (depressed)** ลักษณะฐานผล (fruit base) **บุ๋ม (depressed)** ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) **ปานกลาง (medium)** 5-11 เซนติเมตร รูปร่างก้านผล (fruit peduncle shape) **ขอบมน (lip)** หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) **เว้าปลายแหลม (pointed-concave)** หนามผลรอบจุดศูนย์กลางปลายผล (fruit spine at the center point of distal) **ไม่มีหนาม (absent)** หนามปลายผล (fruit spine apex) **หนามงุ้มเข้า (hooked spine)** หนามรอบข้อผล (proximal spine) **หนามตรง (vertical spine)**

#### ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor)

#### บันทึกเพิ่มเติม (notes)

ชื่อพันธุ์

สาวชมเห็ด (Saochomhet)

ชื่อวิทยาศาสตร์

*Durio zibethinus* Murray

แหล่งที่ค้นพบ สวนนายเสริม ฉิมชาญเวช จ.นนทบุรี

สถานภาพพันธุ์

พันธุ์พื้นเมือง


ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) **ไม่เป็นระเบียบ (not orderly)** ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) **รูปไข่ขอบขนาน (oval-oblong)** ปลายใบ (leaf apex) **acuminate-curve** ฐานใบ (leaf base) **แหลม (acute)** ดอก (flower) รูปร่างของดอกตูม (flower shape at preblossom stage) **กลมรีขอบขนาน (oval-oblong)** ปลายดอก ตูม (flower apex) **มน (obtuse)** ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) **รูปไข่กลับ (obovate)** ปลายผล (fruit apex) **แหลม (pointed)** ลักษณะฐานผล (fruit base) **ป้าน (flattened)** ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) **ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร** หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) **นูนปลายแหลม (pointed concave)** หนามผลรอบจุดศูนย์กลางปลายผล (fruit spine at the center point of distal) **มีหนาม (present)** หนามปลายผล (fruit spine apex) **หนามตรง (vertical spine)** หนามรอบขั้วผล (proximal spine) **หนามตรง (vertical)**


ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor)

ความยาวผล **22.56 เซนติเมตร** ความกว้างผล **17.58 เซนติเมตร** เส้นรอบวงผล **54.70 เซนติเมตร** น้ำหนักผล **1.97 กิโลกรัม** ความกว้างปากปลิง **2.02 เซนติเมตร** ความยาวจากขั้วผลถึงปากปลิง **6.34 เซนติเมตร** น้ำหนักเนื้อ (flesh weight) **432 กรัม** ความหนาเนื้อ (flesh thickness) **0.96 เซนติเมตร** สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) **Y 16D** กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) **มีกลิ่นอ่อน (mild)** รสชาติของเนื้อ (taste) **หวานมันพอดี** ลักษณะของเนื้อ (fruit texture) **ละเอียด (fine)** เส้นใยในเนื้อ (fiber) **ไม่มี (absent)** ปริมาณน้ำในเนื้อ (fruit juiciness) **ปานกลาง (intermediate)** น้ำหนักเปลือก (shell weight) **1,284 กรัม** สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) **YG 146 B** จำนวนเมล็ดติดต่อเมล็ดเต็ม **36/64** ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกว้าง (width) **3.18 เซนติเมตร** ความยาว **5.19 เซนติเมตร** รูปทรงของเมล็ด (stone shape) **ขอบขนาน (oblong)** สีเมล็ด (stone colour) **GO 164 A** น้ำหนักเมล็ด (weight of stone) **258 กรัม** ฤดูกาลผลิต (fruiting season) **ตรงฤดูกาล (season)**

บันทึกเพิ่มเติม (notes)



ชื่อพันธุ์	สีทอง (Sithong)
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Durio zibethinus</i> Murr
ประวัติ	แหล่งที่ค้นพบ สวนนายชอง ศศิผลิน อ.บางกอกน้อย กรุงเทพฯ
สถานภาพพันธุ์	พันธุ์พื้นเมือง



### ลักษณะประจำพันธุ์(characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) **ไม่เป็นระเบียบ (not orderly)** การทำมุมกับลำต้น **มุมตั้งฉาก, มุมแคบ, มุมกว้าง** รูปร่างของใบ (leaf shape) **ยาวเรียว (linear-oblong)** ปลายใบ (leaf apex) **caudateacuminate** ฐานใบ (leaf base) **แหลม (acute)** รูปร่างของดอกตูม (flower shape at preblossom stage) **กลมรีขอบขนาน (oval-oblong)** ปลายดอกตูม (flower apex) **แหลม (acute)** ทรงผล (fruit shape) **กลมแป้น (oblate)** ปลายผล (fruit apex) **บุ๋ม (depressed)** ลักษณะฐานผล (fruit base) **บุ๋ม (depressed)** ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) **สั้น (short) 5 เซนติเมตร** รูปร่างก้านผล (fruit peduncle shape) **ขอบนูน (lip)** หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) **แหลม (pointed)** หนามผลรอบจุดศูนย์กลางปลายผล (fruit spine at the center point of distal) **ไม่มีหนาม (absent)** หนามปลายผล (fruit spine apex) **หนามงุ้มเข้า (hooked spine)** หนามรอบขั้วผล (proximal spine) **หนามงุ้มเข้า (hooked)**

### ลักษณะทางการเกษตร(agricultural descriptors)

ความยาวผล **24.79 เซนติเมตร** ความกว้างผล **22.19 เซนติเมตร** เส้นรอบวงผล **68.11 เซนติเมตร** น้ำหนักผล (fruit weight) **4.21 กิโลกรัม** ความกว้างปากปลิง **2.3 เซนติเมตร** ความยาวจากขั้วผลถึงปากปลิง **3.06 เซนติเมตร** น้ำหนักเนื้อ (flesh weight) **350 กรัม** ความหนาเนื้อ (flesh thickness) **1.73 เซนติเมตร** สีเนื้อผลดิบ (flesh colour of mature green fruit) **YG14C** กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) **มีกลิ่นอ่อน (mild)** รสชาติของเนื้อ (taste) **หวานมันพอดี** ลักษณะของเนื้อ (flesh texture) **ละเอียด (coarse)** เส้นใยในเนื้อ (fibre) **ไม่มี (absent)** ปริมาณน้ำในเนื้อ (fruit juiciness) **ปานกลาง (intermediate)** น้ำหนักเปลือก (shell weight) **3,250 กรัม** สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) **YG147C** จำนวนเมล็ดต่อบทต่อเมล็ดเต็ม **78/22** ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกว้าง (width) **3.22 เซนติเมตร** ความยาว **6.08 เซนติเมตร** รูปทรงของเมล็ด (shape of stone) **ขอบขนาน (oblong)** น้ำหนักเมล็ด (stone of weight) **60 กรัม**

### บันทึกเพิ่มเติม (notes)

---



---



---

ชื่อพันธุ์ ลิเทา (Sithao)  
หรือ นายฉลุย (Naichaluai)/หอยโข่ง  
(Hoikhong)

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* Murr.

สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง

ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) ทรงกระบอก (cylindrical)

ปลายผล (fruit apex) บุ่ม (depressed) ลักษณะฐานผล (fruit base)

บุ่ม (depressed) ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร รูปร่างก้านผล (fruit peduncle shape)

ขอบนูน (lip) หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) เว้าปลายแหลม (pointed-concave) หนามผล

รอบจุดศูนย์กลางปลายผล (fruit spine at the center point of distal) ไม่มีหนาม (absent) หนามปลายผล (fruit spine apex)

หนามงุ้มเข้า (hooked spine) หนามรอบขั้วผล (proximal spine) หนามงุ้มเข้า (hooked)

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล (fruit setting) มาก (abundant)

ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้ 15 ปี (fruit bearing) 100-120 ผล ความยาวผล 18.5 เซนติเมตร ความกว้างผล 15.5 เซนติเมตร เส้น

รอบวงผล 43 เซนติเมตร น้ำหนักผล (fruit weight) 1.3 กิโลกรัม ความกว้างปากปลิง 1.38 เซนติเมตร ความยาวจากขั้วผลถึง

ปากปลิง 5.03 เซนติเมตร สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) YG148 B ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ในฤดูกาล

(season) อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) 120 วัน

บันทึกเพิ่มเติม (notes)

ชื่อพันธุ์ ลิไพร (Siprai)

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* Murr.

ประวัติ แหล่งที่ค้นพบ สวนนายเสริม ฉิมชาญเวช จ.นนทบุรี

สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง

ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไม่เป็นระเบียบ (not orderly) การทำมุมกับลำต้น มุมตั้งฉาก, มุมแคบ, มุม

กว้าง ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) ขอบขนาน (oblong) ปลายใบ (leaf apex) cuspidateacuminate ฐานใบ (leaf base)

แหลม (acute) ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) กลมรี (oval) ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11

เซนติเมตร หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit

spine shape) นูนปลายแหลม (pointed convex)


ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors)

บันทึกเพิ่มเติม (notes)





ชื่อพันธุ์ หมอนข้าง (Monkhang)  
ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* Murr.  
สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง



ลักษณะประจำพันธุ์(characteristics)

---

---

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors)

---

---

บันทึกเพิ่มเติม (notes)

---

---

ชื่อพันธุ์ หมอนเดิม (Mondoem)  
ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* Murr.  
ประวัติ เกิดจากการเพาะเมล็ดกำป็น  
แหล่งที่ค้นพบ จ.ระยอง จ.จันทบุรี  
สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง

ลักษณะประจำพันธุ์(characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไม่เป็นระเบียบ (not orderly) การทำมุมกับลำต้น มุมตั้งฉาก,มุมแคบ,มุมกว้าง ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) ป้อมกลางใบ (elliptical) ปลายใบ (leaf apex) caudate-acuminate ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute) ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) ขอบขนาน (oblong) ปลายผล (fruit apex) แหลม (pointed) ลักษณะฐานผล (fruit base) ป้าน (flattened) ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) แหลม (pointed)

ลักษณะทางการเกษตร(agricultural descriptors)


การเจริญเติบโตของต้น(growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล (fruit setting) น้อย (scarce) ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้ 15 ปี (fruit bearing) 70-80 ผล

บันทึกเพิ่มเติม (notes)

---

---

ชื่อพันธุ์	หมอนทอง (Monthong)
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Durio zibethinus</i> Murr.
ประวัติ	เพาะจากเมล็ดกำป็น แหล่งที่ค้นพบ จ.จันทบุรี จ.ระยอง
สถานภาพพันธุ์	พันธุ์พื้นเมือง



### ลักษณะประจำพันธุ์(characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไม่เป็นระเบียบ (not orderly) การทำมุมกับลำต้น มุมตั้งฉาก,มุมแคบ,มุมกว้าง ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) ยาวเรียว (linear-oblong) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม(acuminate) ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute) ดอก (flower) รูปร่างของดอกตูม (flower shape at preblossomstage) ขอบขนาน (oblong) ปลายดอกตูม (flower apex) แหลม (acute) ผล (fruit) ปลายผล (fruit apex) แหลม (pointed) ลักษณะฐานผล (fruit base) ป้าน (flattened) ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร รูปร่างก้านผล (fruit peduncle shape) ขอบนูน (lip) หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) แหลม (pointed) หนามผลรอบจุดศูนย์กลางปลายผล (fruit spine at the center point of distal) มีหนาม (present) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนามตรง (vertical spine) หนามรอบขั้วผล (proximal spine) หนามงุ้มเข้า (hooked)

### ลักษณะทางการเกษตร(agricultural descriptors)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล (fruit setting) มาก (abundant) ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้ 15 ปี (fruit bearing) 70-80 ผล ความยาวผล 26 เซนติเมตร ความกว้างผล 21 เซนติเมตร เส้นรอบวงผล 65 เซนติเมตร น้ำหนักผล (fruit weight) 4 กิโลกรัม ความกว้างปากปลิง 2.5 เซนติเมตร ความยาวจากขั้วผลถึงปากปลิง 16.5 เซนติเมตร น้ำหนักเนื้อ (flesh weight) 1,140 กรัม ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 2.21 เซนติเมตร สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) Y8C กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) มีกลิ่นอ่อน (mild) รสชาติของเนื้อ (taste) หวานมันพอดี ลักษณะของเนื้อ (flesh texture) หยาบ (coarse) เส้นใยในเนื้อ (fibrous) มี (present) ปริมาณน้ำในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate) น้ำหนักเปลือก (shell weight) 2,300 กรัม สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) YG160D จำนวนเมล็ดต่ิบต่อเมล็ดเต็ม 76/24 ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกว้าง (width) 3 เซนติเมตร ความยาวเมล็ด 5.5 เซนติเมตร รูปทรงของเมล็ด (shape of stone) ขอบขนาน (oblong) น้ำหนักเมล็ด (weight of stone) 140 กรัม ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตรงฤดูกาล (season) อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) 130 วัน

### บันทึกเพิ่มเติม (notes)

---



---



---

ชื่อพันธุ์


หมอนละอองฟ้า (Monla-ongfa)

ชื่อวิทยาศาสตร์

*Durio zibethinus* Murr.

สถานภาพพันธุ์

พันธุ์พื้นเมือง



### ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) รูปไข่ขอบขนาน (oval-oblong) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ฐานใบ (leaf base) มน (obtuse) ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) รูปไข่กลับ (obovate) ปลายผล (fruit apex) แหลม (pointed) ลักษณะฐานผล (fruit base) ป้าน (flattened) ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร รูปร่างก้านผล (fruit peduncle shape) ขอบนูน (lip) หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) เว้าปลายแหลม (pointed-concave) หนามผลรอบจุดศูนย์กลางปลายผล (fruit spine at the center point of distal) ไม่มีหนาม (absent) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนามตรง (vertical spine) หนามรอบขั้วผล (proximal spine) หนามงุ้มเข้า (hooked)

### ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล (fruit setting) มาก (abundant) ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้ 15 ปี (fruit bearing) 100-120 ผล ความยาวผล 23.5 เซนติเมตร ความกว้างผล 17.5 เซนติเมตร เส้นรอบวงผล 54.5 เซนติเมตร น้ำหนักผล (fruit weight) 2 กิโลกรัม ความกว้างปากปลิง 1.6 เซนติเมตร ความยาวจากขั้วผลถึงปากปลิง 6.5 เซนติเมตร น้ำหนักเนื้อ (flesh weight) 500 กรัม ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 1.3 เซนติเมตร สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) Y 13 C กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) มีกลิ่นอ่อน (mild) รสชาติของเนื้อ (taste) หวานมากกว่ามัน ลักษณะของเนื้อ (flesh texture) ละเอียด (fine) เส้นใยในเนื้อ (fibre) ไม่มี (absent) น้ำหนักเปลือก (shell weight) 1,300 กรัม สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) GB 199 A จำนวนเมล็ดดิบต่อเมล็ดเต็ม 77/23 ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกว้าง (width) 1.88 เซนติเมตร ความยาว 4.90 เซนติเมตร รูปทรงของเมล็ด (stone of shape) ขอบขนาน (oblong) สีของเมล็ด (stone colour) GO 165 B น้ำหนักเมล็ด (stone weight) 150 กรัม ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตรงฤดูกาล (season) อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) 130 วัน

### บันทึกเพิ่มเติม (notes)

---

---

---

---

---

ชื่อพันธุ์ หลงลับแล (Longlap-lae)

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* Murr.

สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง

ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไม่เป็นระเบียบ (not orderly) การทำมุมกับลำต้น มุมตั้งฉาก, มุมแคบ, มุมกว้าง

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล (fruit setting) มาก (abundant) ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้ 15 ปี (fruit bearing) 100-120 ผล ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตรงฤดูกาล (season) อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) 120 วัน

บันทึกเพิ่มเติม (notes)

---

---

---

ชื่อพันธุ์ หางสิงห์ (Hangsing)

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* Murr.

ประวัติ แหล่งค้นพบ สวนนายพ่อง สุกุล จ.ระยอง

สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง

ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไม่เป็นระเบียบ (not orderly) การทำมุมกับลำต้น มุมตั้งฉาก, มุมแคบ, มุมกว้างใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) ยาวเรียว (linear-oblong) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ดอก (flower) รูปร่างของดอกตูม (flower shape at preblossomstage) กลมมน (rounded-obtuse) ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) กลมรี (oval) ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors)

---

---

---

บันทึกเพิ่มเติม (notes)

---

---

---

ชื่อพันธุ์

ห้าลูกไม่ถึงฝัว(Halukmaithuengphua)

ชื่อวิทยาศาสตร์

*Durio zibethinus* Murr.

สถานภาพพันธุ์

พันธุ์พื้นเมือง



### ลักษณะประจำพันธุ์(characteristics)

ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) รูปรี (elliptic) ปลายผล (fruit apex) แหลม (pointed) ลักษณะฐานผล (fruit base) ป้าน (flattened) ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) สั้น (short) < 5 เซนติเมตร รูปร่างก้านผล (fruit peduncle shape) ขอบนูน (lip) หนามผล (fruit) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) แหลม (pointed) หนามผลรอบจุดศูนย์กลางปลายผล (fruit spine at the center point of distal) มีหนาม (present) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนามงุ้มเข้า (hooked spine) หนามรอบขั้วผล (proximal spine) หนามงุ้มเข้า (hooked)

### ลักษณะทางการเกษตร(agricultural descriptors)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล (fruit setting) มาก (abundant) ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้ 15 ปี (fruit bearing) 100-120 ผล ความยาวผล 18 เซนติเมตร ความกว้างผล 14 เซนติเมตร เส้นรอบวงผล 47 เซนติเมตร น้ำหนักผล (fruit weight) 1.1 กิโลกรัม ความกว้างปากปลิง 1.52 เซนติเมตร ความยาวจากขั้วผลถึงปากปลิง 4.55 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 0.38 เซนติเมตร สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) Y 13 D กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) มีกลิ่นอ่อน (mild) รสชาติของเนื้อ (taste) หวานมากกว่ามัน ลักษณะของเนื้อ (flesh texture) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร เส้นใยในเนื้อ (fibre) มี (present) ปริมาณน้ำในเนื้อ (fruit juiciness) น้อย (scarce) ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตรงฤดูกาล (season) อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) 100 วัน

### บันทึกเพิ่มเติม (notes)

---

---

---

---

ชื่อพันธุ์


เหมราซ (Hammarat)

ชื่อวิทยาศาสตร์

*Durio zibethinus* Murr.

สถานภาพพันธุ์

พันธุ์พื้นเมือง



### ลักษณะประจำพันธุ์(characteristics)

ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) รูปไข่กลับ (obovate) ปลายผล (fruit apex) แหลม (pointed) ลักษณะฐานผล (fruit base) ปาน (flattened) ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร รูปร่างก้านผล (fruit peduncle shape) ขอบนูน (lip) หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) แหลม (pointed) หนามผลรอบจุดศูนย์กลางปลายผล (fruit spine at the center point of distal) ไม่มีหนาม (absent) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนามตรง (vertical spine) หนามรอบขั้วผล (proximal spine) หนามงุ้มเข้า (hooked)

### ลักษณะทางการเกษตร(agricultural descriptors)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล (fruit setting) มาก (abundant) ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้ 15 ปี (fruit bearing) 100-120 ผล ความยาวผล 24 เซนติเมตร ความกว้างผล 20 เซนติเมตร เส้นรอบวงผล 64 เซนติเมตร น้ำหนักผล (fruit weight) 2.9 กิโลกรัม ความกว้างปากปลิง 2.06 เซนติเมตร ความยาวจากขั้วผลถึงปากปลิง 7.33 เซนติเมตร น้ำหนักเนื้อ (flesh weight) 773 กรัม ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 0.99 เซนติเมตร สีเนื้อผลดิบ (flesh colour of mature green fruit) OG 24 C กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) มีกลิ่นอ่อน (mild) รสชาติของเนื้อ (taste) มันมากกว่าหวาน ลักษณะของเนื้อ (flesh texture) ละเอียดย (fine) เส้นใยในเนื้อ (fibre) ไม่มี (absent) ปริมาณน้ำในเนื้อ (fruit juiciness) น้อย (little) น้ำหนักเปลือก (shell weight) 1,867 กรัม สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) YG 153 C จำนวนเมล็ดดิบต่อเมล็ดเต็ม 38/62 ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกว้าง (width) 3.06 เซนติเมตร ความยาว 4.99 เซนติเมตร รูปทรงของเมล็ด (shape of stone) ขอบขนาน (oblong) สีของเมล็ด (stone colour) GO 162 C น้ำหนักเมล็ด (weight of stone) 267 กรัม ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตรงฤดูกาล (season) อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) 120 วัน

### บันทึกเพิ่มเติม (notes)

---

---

---

---

ชื่อพันธุ์ เหว-รา (He-ra)

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* Murr.

แหล่งที่ค้นพบ จ.ปราจีนบุรี

สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง

ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไม่เป็นระเบียบ (not orderly) การทำมุมกับลำต้น มุมตั้งฉาก, มุมแคบ, มุมกว้าง ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) ยาวเรียว (linear-oblong) ปลายใบ (leaf apex) cuspidate-acuminate ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute) ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) ขอบขนาน (oblong) หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) แหลม (pointed)

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors)

บันทึกเพิ่มเติม (notes)

---

---

---

ชื่อพันธุ์ เหวริญทอง (Rianthong)

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* Murr.

ประวัติ แหล่งที่ค้นพบ สวนนายสุริน ประภักดี จ.ปราจีนบุรี

สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง

ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไม่เป็นระเบียบ (not orderly) การทำมุมกับลำต้น มุมตั้งฉาก, มุมแคบ, มุมกว้าง ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) ป้อมกลางใบ (elliptical) ปลายใบ (leaf apex) acuminate-curve ฐานใบ (leaf base) กลมมน (rounded-obtuse) ผล (fruit) ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors)

---

---

---

บันทึกเพิ่มเติม (notes)

---

---

---

ชื่อพันธุ์ เหลืองทอง (Lueangthong)

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* Murr.

สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง

ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) ป้อมคคนใบ (ovate-lanceolate) ฐานใบ (leaf base) แหลมเรียว (acuminate-acute)

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors)

---

---

---

บันทึกเพิ่มเติม (notes)

---

---

---

ชื่อพันธุ์ อินทรชิต (Inthorachit)

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* Murr.

ประวัติ แหล่งที่ค้นพบ สวนนายทองสุข รอดพัน จ.นนทบุรี

สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง

ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไม่เป็นระเบียบ (not orderly) การทำมุมกับลำต้น มุมตั้งฉาก, มุมแคบ, มุมกว้าง ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) รูปไข่ขอบขนาน (oval-oblong) ปลายใบ (leaf apex) acuminate-curve ฐานใบ (leaf base) กลมมน (rounded-obtuse) ผล (fruit) ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors)

---

---

---

บันทึกเพิ่มเติม (notes)

---

---

---



ชื่อพันธุ์ อีทุย (E-tui)  
ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* Murr.  
สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง



ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) รูปไข่ (ovate) ปลายผล (fruit apex) ป้าน (flattened) ลักษณะฐานผล (fruit base) ป้าน (flattened) ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร รูปปร่างก้านผล (fruit peduncle shape) ขอบนูน (lip) หนามผล (fruit spine) รูปปร่างหนามผล (fruit spine shape) นูน (convex) หนามผลรอบจุดศูนย์กลางปลายผล (fruit spine at the center point of distal) ไม่มีหนาม (absent) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนามตรง (vertical spine) หนามรอบขั้วผล (proximal spine) หนามตรง (vertical)

บันทึกเพิ่มเติม (notes)

ชื่อพันธุ์ อียักซ์ (E-yak)  
ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* Murr.  
ประวัติ แหล่งที่ค้นพบ สวนนายชอง ศศิผลิน  
บางกอกน้อย จ.กรุงเทพฯ  
สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง

ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไม่เป็นระเบียบ (not orderly) การทำมุมกับลำต้น มุมตั้งฉาก, มุมแคบ, มุมกว้าง ใบ (leaf) รูปปร่างของใบ (leaf shape) รูปไข่ขอบขนาน (oval-oblong) ปลายใบ (leaf apex) caudate-acuminate ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute) ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) กลมรี (oval) ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors)

บันทึกเพิ่มเติม (notes)

ชื่อพันธุ์	อีล่า (E-La)
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Durio zibethinus</i> Murr.
แหล่งที่ค้นพบ	สวนนายชอง ศศิผลิน บางกอกน้อย จ.กรุงเทพฯ
สถานภาพพันธุ์	พันธุ์พื้นเมือง

#### ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไม่เป็นระเบียบ (not orderly) การทำมุมกับลำต้น มุมตั้งฉาก, มุมแคบ, มุมกว้าง ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) รูปไข่ขอบขนาน (oval-oblong) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ฐานใบ (leaf base) กลมมน (rounded- obtuse) ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) กลมรี (oval) ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร

#### ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors)

---

---

---

#### บันทึกเพิ่มเติม (notes)

---

---

---

ชื่อพันธุ์	อีลิป (E-Lip)
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Durio zibethinus</i> Murr.
แหล่งที่ค้นพบ	จ. จันทบุรี
สถานภาพพันธุ์	พันธุ์พื้นเมือง



### ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) **ไม่เป็นระเบียบ (not orderly)** การทำมุมกับลำต้น **มุมตั้งฉาก, มุมแคบ, มุมกว้าง** ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) **รูปไข่ขอบขนาน (oval-oblong)** ปลายใบ (leaf apex) **caudate-acuminate** ฐานใบ (leaf base) **แหลม (acute)** รูปร่างของดอกตูม (flower shape at preblossom stage) **กลม (rounded)** ปลายดอกตูม (flower apex) **มน (obtus)** ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) **ขอบขนาน (oblong)** ปลายผล (fruit apex) **แหลม (pointed)** ลักษณะฐานผล (fruit base) **ป้าน (flattened)** ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) **ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร** รูปร่างก้านผล (fruit peduncle shape) **ขอบมน (lip)** หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) **มนปลายแหลม (pointed-convex)** หนามผลรอบจุด ศูนย์กลางปลายผล (fruit spine at the center point of distal) **ไม่มีหนาม (absent)** หนามปลายผล (fruit spine apex) **หนามตรง (vertical spine)** หนามรอบขั้วผล (proximal spine) **หนามตรง (vertical)**

### ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) **ปานกลาง (intermediate)** การออกดอก (flowering) **ปานกลาง (intermediate)** การติดผล (fruit setting) **ปานกลาง (intermediate)** ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้ 15 ปี (fruit bearing) **70 ผล** ความยาวผล **19.4 เซนติเมตร** ความกว้างผล **16 เซนติเมตร** เส้นรอบวงผล **50 เซนติเมตร** น้ำหนักผล (fruit weight) **1.42 กิโลกรัม** ความกว้างปากปลิง **1.50 เซนติเมตร** ความยาวจากขั้วผลถึงปากปลิง **4.80 เซนติเมตร** น้ำหนักเนื้อ (flesh weight) **491 กรัม** ความหนาเนื้อ (flesh thickness) **1.12 เซนติเมตร** สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) **YO16BC** กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) **มีกลิ่นแรง (strong)** รสชาติของเนื้อ (taste) **หวานมันพอดี** ลักษณะของเนื้อ (flesh texture) **ละเอียด (fine)** เส้นใยในเนื้อ (fibre) **ไม่มี (absent)** ปริมาณน้ำในเนื้อ (fruit juiciness) **ปานกลาง (intermediate)** น้ำหนักเปลือก (shell weight) **780 กรัม** สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) **YG152B,C** จำนวนเมล็ดดิบต่อเมล็ดเต็ม **53/47** ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกว้าง (width) **2.48 เซนติเมตร** ความยาว **5.13 เซนติเมตร** รูปทรงของเมล็ด (shape of stone) **ขอบขนาน (oblong)** น้ำหนักเมล็ด (weight of stone) **157 กรัม** ฤดูกาลผลิต (fruiting season) **ในฤดูกาล (season)** อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) **110 วัน**

### บันทึกเพิ่มเติม (notes)

---



---



---

ชื่อพันธุ์ อีลิบนายทิพย์ (E-lipnaithip)

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* Murr.

สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง

#### ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) เรียวแหลม (acuminate) ฐานใบ (leaf base) cuspidate-acuminate

#### ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) ปานกลาง (intermediate) การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate) การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate) ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้ 15 ปี (fruit bearing) 70 ผล ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตรงฤดูกาล (season) อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) 110 วัน

#### บันทึกเพิ่มเติม (notes)

---

---

---

ชื่อพันธุ์ อีอิ่ง (E-eueng)

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* Murr.

แหล่งที่ค้นพบ บางกอกน้อย

สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง

#### ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไม่เป็นระเบียบ (not orderly) การทำมุมกับลำต้น มุมตั้งฉาก, มุมแคบ, มุมกว้าง ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) ป้อมโคนใบ (ovate-lanceolate) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ฐานใบ (leaf base) มน (obtus) ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) รูปไข่ (ovate) ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) หนูปปลายแหลม (pointed-convex)

#### ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate) การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate) ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้ 15 ปี (fruit bearing) 100-120 ผล ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ในฤดูกาล (season) อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) 100-120 วัน

#### บันทึกเพิ่มเติม (notes)

---

---

---

ชื่อพันธุ์	อีหนัก (E-nak)
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Durio zibethinus</i> Murr.
แหล่งที่ค้นพบ	จ. จันทบุรี
สถานภาพพันธุ์	พันธุ์พื้นเมือง



### ลักษณะประจำพันธุ์(characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) **ไม่เป็นระเบียบ (not orderly)** การทำมุมกับลำต้น **มุมตั้งฉาก, มุมแคบ, มุมกว้าง** ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) **ป้อมโคนใบ (ovate-lanceolate)** ปลายใบ (leaf apex) **caudate-acuminate** ฐานใบ (leaf base) **กลมมน (rounded-obtuse)** ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) **รูปไข่ (ovate)** ปลายผล (fruit apex) **ป้าน (flattened)** ลักษณะฐานผล (fruit base) **ป้าน (flattened)** ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) **ปานกลาง (medium)** 5-11 เซนติเมตร รูปร่างก้านผล (fruit peduncle shape) **ขอบนูน (lip)** หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) **นูนปลายแหลม (pointed-convex)** หนามผลรอบจุด ศูนย์กลางปลายผล (fruit spine at the center point of distal) **ไม่มีหนาม (absent)** หนามปลายผล (fruit spine apex) **หนามตรง (vertical spine)** หนามรอบขั้วผล (proximal spine) **หนามตรง (vertical)**

### ลักษณะทางการเกษตร(agricultural descriptors)

การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) **เร็ว** การออกดอก (flowering) **มาก (abundant)** การติดผล (fruit setting) **มาก (abundant)** ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้ 15 ปี (fruit bearing) **100-120 ผล** ความยาวผล **36 เซนติเมตร** ความกว้างผล **19 เซนติเมตร** เส้นรอบวงผล **63 เซนติเมตร** น้ำหนักผล (fruit weight) **3.7 กิโลกรัม** ความกว้างปากปลิง **1.5 เซนติเมตร** ความยาวจากขั้วผลถึงปากปลิง **6 เซนติเมตร** น้ำหนักเนื้อ (flesh weight) **1,000 กรัม** ความหนาเนื้อ (flesh thickness) **0.6 เซนติเมตร** สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) **YO 16 B** กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) **มีกลิ่นอ่อน (mild)** รสชาติของเนื้อ (taste) **หวานมากกว่ามัน** ลักษณะของเนื้อ (flesh texture) **ละเอียด (fine)** เส้นใยในเนื้อ (fibre) **ไม่มี (absent)** ปริมาณน้ำในเนื้อ (fruit juiciness) **ปานกลาง (intermediate)** น้ำหนักเปลือก (shell weight) **2,200 กรัม** สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) **GB 199 A,C** จำนวนเมล็ดดิบต่อเมล็ดเต็ม **48/52** ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกว้าง (width) **2.6 เซนติเมตร** ความยาว **2.7 เซนติเมตร** รูปทรงของเมล็ด (shape of stone) **ไข่กลับ (obovate)** สีเมล็ด (stone colour) **GO 167 B** น้ำหนักเมล็ด (weight of stone) **500 กรัม** ฤดูกาลผลิต (fruiting season) **ตรงฤดูกาล (season)** อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) **130 วัน**

### บันทึกเพิ่มเติม (notes)

---



---



---

ชื่อพันธุ์ ไข่เข้ (Eai-Khe) หรือ ตะเข้ (Ta-khe)

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* Murr.

ประวัติ แหล่งที่ค้นพบ สวนนายเสริม ฉิมชาญเวช จ.นนทบุรี

สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง

#### ลักษณะประจำพันธุ์(characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไม่เป็นระเบียบ (not orderly) การทำมุมกับลำต้น มุมตั้งฉาก, มุมแคบ, มุมกว้าง รูปร่างของใบ (leaf shape) ป้อมกลางใบ (elliptical) ใบ (leaf) ปลายใบ (leaf apex) cuspidate-acuminate ฐานใบ (leaf base) กลมมน (rounded-obtuse) ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) กลมรี (oval) ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร

#### ลักษณะทางการเกษตร(agricultural descriptors)

#### บันทึกเพิ่มเติม (notes)

## คำนิยม

คณะผู้จัดทำขอแสดงความขอบคุณคณะบุคคลผู้มีรายนามต่อไปนี้ที่ให้ความสนับสนุนทั้งทางด้านข้อมูล พันธุ์ทุเรียน รูปภาพสไลด์ สถานที่ศึกษา ความคิดเห็น คำปรึกษา ตลอดจนกำลังใจในการจัดทำเอกสารเล่มนี้ให้สัมฤทธิ์ผลขึ้นมา ดังรายนามต่อไปนี้

1. คุณสงวน บุญญฤทธิ์ (นามสกุลเดิม) เกษตรกรชาวสวนทุเรียน จังหวัดจันทบุรี อดีตลูกจ้างศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี สถาบันวิจัยพืชสวน ผู้ซึ่งเป็นบุคคลแรกที่จุดประกายให้คณะผู้จัดทำริเริ่มสนใจในการจัดทำฐานข้อมูลเชื้อพันธุ์ทุเรียนขึ้นมา

2. ผ.อ. สุขวัฒน์ จัทรปรณิก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี สถาบันวิจัยพืชสวน ที่ให้ความสนับสนุนอนุเคราะห์ด้านวิชาการ สถานที่ศึกษา นักวิชาการ ลูกจ้าง และให้คำปรึกษาตั้งแต่เริ่มต้นด้วยดีตลอดมา

3. นายชาติรี โสวรรณตระกูล นกอนุรักษ์ทุเรียนไทยแห่งสวนละอองฟ้า จังหวัดนครนายก ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลประวัติทุเรียนไทยและตัวอย่างพันธุ์ดั้งเดิมทุเรียนไทยเพื่อศึกษาข้อมูลจำนวนมากมาย

4. คณะที่ปรึกษาทุกท่านที่ให้คำปรึกษาด้วยดีตลอดมา

5. คณะผู้เรียงพิมพ์น้องๆ ลูกจ้างสำนักคุ้มครองพันธุ์พืชทุกท่านที่ทำงานกันอย่างเต็มที่ช่วยจัดทำร่างและเรียงพิมพ์เอกสารเล่มนี้อย่างอดทน

ท้ายสุดนี้คณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณท่านอธิบดีอนันต์ ดาโลดม อธิบดีกรมวิชาการเกษตรที่สนับสนุนทั้งทางด้านนโยบายและอนุมัติงบประมาณในการทำครั้งนี้

คณะผู้จัดทำ

## เอกสารประกอบการเรียบเรียง

- ไพโรจน์ ผลประสิทธิ์. 2503. สิ่งที่ได้จากการสำรวจทุเรียนในท้องที่ชนบุรีและนนทบุรี ปี 2501. กสิกรรม 33(3):192-200.
- วิจิตร ว่างน. 2526. ชนิดและพันธุ์ไม้ผลเมืองไทย. ภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 6-14 หน้า.
- หิรัญ หิรัญประดิษฐ์ นิลวรรณ ลีอังกูรเสถียร ไพบูรณ์ รัตนจันทร์ สงวน จันทรัฐ ศิวพร จินตนาวงศ์ และ ทรงพล สมศรี. 2531. การกำหนดมาตรฐานคุณภาพทุเรียน. เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา กำหนดมาตรฐานคุณภาพทุเรียนเงาะ และมะม่วงเพื่อการส่งออก. ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี.
- หิรัญ หิรัญประดิษฐ์ นิลวรรณ ลีอังกูรเสถียร ทรงพล สมศรี ไพโรจน์ มาศผล. 2531. การกำหนดมาตรฐานคุณภาพทุเรียนพันธุ์ชะนี หมอนทอง ก้านยาว. รายงานผลงานวิจัยเรื่องเต็ม. ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี.
- หิรัญ หิรัญประดิษฐ์ นิลวรรณ ลีอังกูรเสถียร สงวน จันทรัฐ ทรงพล สมศรี บุญมี เลิศรัตน์เดชากุล ไพโรจน์ มาศผล ไพโรจน์ ผลประสิทธิ์ และประกิจ ดวงพิกุล. 2531. การรวบรวมพันธุ์ทุเรียนที่จะสูญเสียพันธุ์. รายงานผลงานวิจัยเรื่องเต็ม. ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี.
- หิรัญ หิรัญประดิษฐ์ ทรงพล สมศรี อัมพิกา ปูนนจิต ไพโรจน์ ผลประสิทธิ์ และประกิจ ดวงพิกุล. 2532. การคัด Clone ทุเรียนพันธุ์ใหม่ซึ่งปลูกจากเมล็ดในภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคเหนือ. รายงานผลงานวิจัยเรื่องเต็ม. ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี.
- หิรัญ หิรัญประดิษฐ์ สุขวัฒน์ จันทรปรณิก และเสริมสุข สลักเพชร. 2541. เทคโนโลยีการผลิต ทุเรียน. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 38-47 หน้า.
- Anon, 1980. Tropical Fruit Descriptors. IBPGR. Rome.