



กระดานข่าวงานวิจัยใช้ได้จริง :

เสลาเปลือกนาง

พืชอาหาร พืชสมุนไพร

กลุ่มวิจัยพฤกษศาสตร์และฟิสิกส์พืช
สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร

Lagerstroemia venusta Wall. ex C. B. Clarke

ไม้พุ่มหรือไม้ต้น สูง 8-17 เมตร ลำต้นเปลาตรง
บางครั้งพบว่าที่บริเวณส่วนโคนลำต้นมีหนาม
ขนาดใหญ่ เปลือกสีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลแกมเทา
แตกเป็นร่อง เรือนยอดแผ่กว้างเป็นพุ่มทรงกระบอก
กิ่งอ่อนรูปสี่เหลี่ยม มีขนประปราย ใบเดี่ยว
เรียงตรงข้าม รูปขอบขนานหรือรูปรี
แกมรูปขอบขนาน ปลายแหลม เกือบกลม
หรือมน โคนเบี้ยวหรือสอบเรียว ขอบเรียบ
ส่วนปลายด้านบนขอบใบเป็นคลื่นเล็กน้อย
แผ่นใบหนาคล้ายแผ่นหนังบางๆ
ใบอ่อนมีขนประปรายที่เส้นกลางใบ ใบแก่เกลี้ยง
ดอกออกเป็นช่อแบบช่อแยกแขนง
ออกตามปลายกิ่งช่อดอกยาวถึง 45 ซม. ช่อโปร่ง
มีขนสั้นสีขาวประปราย ดอกตูมสีเขียวแกมสีชมพู
รูปประฆัง โคนสอบเรียวไม่มีสันนูนหรือมีจางๆ
จำนวน 6 สัน บริเวณร่องของแฉกกลีบเลี้ยง
มีครีบริ้วปลิ้นยื่นยาวออกไปเฉพาะส่วนบนของดอกตูม
กลีบเลี้ยงสีเขียวอ่อน รูปประฆังปลายแยก 6 แฉก
แต่ละแฉกรูปสามเหลี่ยม บานแผ่กว้าง
กลีบดอกสีชมพูหรือสีชมพูแกมสีม่วง
จำนวน 6 กลีบ รูปขอบขนาน ปลายมน
ขอบเป็นคลื่น มีก้านกลีบดอก
เกสรเพศผู้ติดที่ด้านในของหลอดกลีบเลี้ยง
รังไข่อยู่เหนือวงกลีบ รูปกลม
เกลี้ยง ผลแบบผลแห้งแตก รูปไข่
ผนังผลแข็งเมื่อแตกแยกออกเป็น 5 พู เมล็ดมีปีก

รายสัปดาห์ที่ ๓

ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

เสลาเปลือกนางมีดอกและทรงพุ่มที่
สวยงามสามารถนำมาปลูกเป็นไม้ประดับสวน
และริมทางหลวงได้ เนื้อไม้ใช้ทำเสาและเครื่องมือนอกกรรม

ผู้เขียน ปาจริย์ อินทะสุข นักวิชาการเกษตรชำนาญการ