



กระดานขาว

งานวิจัยที่ใช้ได้จริง :

พืชอาหาร พืชสมุนไพร

กลุ่มวิจัยพฤกษศาสตร์และพืชไร่พืชสวน
สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร

มหากาลัง

รายสัปดาห์ที่ ๓ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Curcuma latifolia* Rosc.
ชื่อวงศ์ : ZINGIBERACEAE
ชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ : ว่านชักมดลูกตัวเมีย



ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

พืชล้มลุกอายุหลายปี สูง 1-1.2 ม. ลำต้นใต้ดินเป็นเหง้า มีหัวสะสมอาหารรูปกระสวย ลำต้นเทียมเกิดจากกาบใบที่อัดแน่น ใบเดี่ยว มี 3-6 ใบ แผ่นใบด้านบนสีเขียวเข้ม ด้านล่างสีเขียวอ่อน เรียงสลับระนาบเดียว รูปใบหอก กว้าง 15-20 ซม. ยาว 50-60 ซม. ปลายเรียวแหลม โคนสอบเรียว ขอบเรียบ แผ่นใบบาง ก้านใบยาว 2-3 ซม. ช่อดอกแบบช่อกระจุกแยกแขนง สีชมพูเข้ม ออกจากลำต้นใต้ดิน รูปทรงกระบอก ตั้งขึ้น ยาวประมาณ 20 ซม. ดอกสีขาวอมเหลือง ใบประดับบนสีชมพูเข้ม ใบประดับล่างสีเขียวอ่อนหรือสีขาว รูปไข่กลับ กว้าง 2.7-3 ซม. ยาว 3.8-6 ซม. กลีบเลี้ยงโคนเชื่อมติดกันเป็นหลอด ยาวประมาณ 1 ซม. ปลายแยกเป็นสามแฉก กลีบดอกโคนเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 3 แฉก สีขาวนวล กลีบปากสีเหลืองอ่อน กลางกลีบมีแถบสีเหลืองเข้ม ปลายแยกออกเป็นแฉก 2 แฉกสั้น กลีบข้างรูปไข่กลับ ยาว 1.3-1.5 ซม. เกสรเพศผู้ มี 6 อัน มีสมบุรณ์เพียง 1 อัน รังไข่อยู่ใต้วงกลีบ ผลแบบผลแห้งแตก

ประโยชน์ : เหง้าใช้รักษาอาการของสตรี เช่น ประจำเดือนมาไม่ปกติ ปวดท้องระหว่างมีประจำเดือน ตกขาว ขับน้ำคาวปลา แก้อาการอาหารไม่ย่อย ริดสีดวงทวาร และไส้เลื่อน ดอกมีความสวยงาม สามารถนำมาปลูกเป็นไม้ประดับได้

ที่มาของข้อมูล : นายภัทรวีร์ พรหมนัส
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ