



พรรณไม้งามรอบอาคารพิพิธภัณฑ์พีชสิรินธร

Bangkok Herbarium (BK)

กลุ่มวิจัยพอกษาศาสตร์และพิพิธภัณฑ์พีช
สำนักดูแลองค์การพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร

รายลับภาคที่ 3 ประจำเดือน สิงหาคม 2561

จกนำ

ชื่อวิทยาศาสตร์

ชื่อวงศ์

ชื่อสามัญ

ชื่ออื่น

Barringtonia acutangula (L.) Gaertn.

LECYTHIDACEAE

กระโดนทุ่ง, กระโดนน้ำ (หนองคาย), กระโดนสร้อย (พิษณุโลก),
จึก (กรุงเทพ), จิกนา (ภาคใต้), ตอง, ปุยสาย (ภาคเหนือ), ลำไผ่ (อุตรดิตถ์)

Indian oak, Itchy tree.



ลักษณะทางพฤกษาศาสตร์

ไม้ต้น สูงได้ถึง 20 เมตร ใบรูปไข่กลับหรือแฉะรูปขอบขนาน ยาว 5-26 เซนติเมตร ปลายแหลมหรือแหลมยา โคนสอบเรียว แผ่นใบหนา ขอบจักฟันเลือย เส้นแขนงใบข้างละ 10-20 เส้น ก้านใบยาวได้ถึง 1.5 เซนติเมตร ช่อดอกแบบช่อกระจะห้อยลง ยาวได้ถึง 70 เซนติเมตร ก้านดอกสั้น หรือยาวได้ถึง 1 เซนติเมตร ฐานดอกยาว 1-4 มิลลิเมตร กลีบเลี้ยงรูปรีกว้าง ยาว 3-5 มิลลิเมตร ดอกสีชมพูหรืออมแดง กลีบรูปกลมหรือรูปใบพาย ยาว 0.5-1 เซนติเมตร เกสรเพศผู้เรียง 3 วง วงนอกยาวได้ถึง 2.5 เซนติเมตร วงในยาว 3-6 มิลลิเมตร ก้านเกสรเพศเมีย ยาว 1-2 เซนติเมตร ผลรูปรีแคบ รูปไข่ หรือเกือบกลม ยาว 2-6 เซนติเมตร ส่วนมากมีสันหรือครีบ 4-8 สัน มีเมล็ดเดียว รูปไข่ ยาว 1-4 เซนติเมตร

การกระจายพันธุ์

พบที่อินเดีย อัฟغانิสถาน ปากีสถาน บังกลาเทศ พม่า ภูมิภาคมาเลเซีย นิวกินี ออสเตรเลียตอนบน และหมู่เกาะแปซิฟิก ในไทยพบทุกภาค

สภาพนิเวศวัตถุ

ขึ้นตามริมน้ำ ความสูงถึงประมาณ 400 เมตร

การใช้ประโยชน์

ดอกและยอดอ่อนใช้รับประทานเป็นผักสดหรือผัดกับเนื้อ ลาง น้ำตก และขนมจีน ให้รสชาติมันปนฝาด ช่วยเพิ่มความอร่อยได้ดีมาก เปลือกและตันของจิกน้ำมีสรรพคุณใช้เบื้องปลา มักปลูกไว้เป็นไม้ประดับที่ริมน้ำริมตลิ่ง เนื่องจากมีชื่อดอกที่สวยงามแบลกตา และมีความแข็งแรง ทนน้ำท่วมขังได้เป็นอย่างดี นอกจากจะปลูกต้นจิกน้ำเพื่อความสวยงามไว้ริมตลิ่งแล้ว ต้นจิกน้ำก็ยังช่วยยึดหน้าดินริมตลิ่งได้อีกด้วย

