



พรรณไม้งามรอบอาคารพิพิธภัณฑ์พืชสิรินธร

Bangkok Herbarium (BK)

กลุ่มวิจัยพฤกษศาสตร์และพิพิธภัณฑ์พืช
สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร

รายสัปดาห์ที่ 1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

คัดเค้าเล็ก



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Benkara sinensis* (Lour.) Ridsdale

ชื่อวงศ์ RUBIACEAE

ชื่อสามัญ -

ชื่ออื่น เขี้ยวกระจง (ขอนแก่น), เขี้ยวจง (นครศรีธรรมราช), คัดเค้าหนู (ระยอง), โยทะกา (ประจวบคีรีขันธ์), ลิเถื่อน (ยะลา)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

มีลักษณะเป็นพุ่มรอเลื้อย เนื้อไม้แข็งเหนียว มีหนามแหลมแข็งและตรงเป็นคู่ที่โคนใบและตามกิ่งก้าน ใบเป็นใบเดี่ยวรูปไข่แกมขอบขนาน กว้าง 3-5 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม โคนใบสอบ เนื้อใบบาง ผิวใบเกลี้ยงทั้งสองด้าน ช่อดอกมีสีขาว ออกเป็นช่อกระจุกที่ปลายกิ่ง หรือชอกใบใกล้ปลายกิ่ง มีดอกย่อย 2-6 ดอก กลีบเลี้ยงสีเขียวรูปถ้วย โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดยาว 1.5-2 เซนติเมตร ปลายแยกเป็น 5 กลีบ แต่ละกลีบรูปหอก ขอบกลีบบิดเล็กน้อย เมื่อดอกบานมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5-3 เซนติเมตร ดอกบานไม่พร้อมกัน เริ่มบานในช่วงเย็นและส่งกลิ่นหอมแรงในช่วงกลางคืน ดอกบานวันเดียวแล้วโรยในช่วงเย็นของวันต่อมา ฤดูดอกบานเต็มต้นอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เมษายน

การกระจายพันธุ์

-

สภาพนิเวศวิทยา

พบตามขอบชายป่า ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเล 2000 เมตร
ปลูกได้ทั้งในที่ร่มรำไรและในแปลงกลางแจ้ง

การใช้ประโยชน์

ปลูกเป็นไม้ประดับที่มีดอกหอม

