



พรรณไม้งามรอบอาคารพิพิธภัณฑ์พืชสิรินธร

Bangkok Herbarium (BK)

กลุ่มวิจัยพฤกษศาสตร์และพิพิธภัณฑ์พืช
สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร



รายสัปดาห์ที่ 2 ประจำเดือนกันยายน 2561

พวงทองเถา

ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Callaeum septentrionale</i> (A.Juss.) D.M. Johnson
ชื่อวงศ์	Malpigiaceae
ชื่ออื่น	พวงทองปีกผีเสื้อ
ชื่อสามัญ	Yellow butterfly bush, Yellow orchid vine



ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ไม้พุ่มรอเลื้อย มักมีขนคล้ายไหมตามกิ่งอ่อน แผ่นใบด้านล่าง กลีบเลี้ยงและกลีบดอกด้านนอก ใบเรียงตรงข้าม รูปไข่ รูปขอบขนาน หรือรูปใบหอก ยาว 2-9 เซนติเมตร โคนมักมีต่อมข้างละ 1-3 ต่อม ก้านใบยาว 0.2-1 เซนติเมตร หูใบร่วมขนาดเล็ก ช่อดอกแบบช่อกระจุกหรือแยกแขนงแบบช่อซี่ร่ม ใบประดับขนาดเล็ก ก้านช่อยาวได้ถึง 1 เซนติเมตร ก้านดอกยาว 0.6-2.4 เซนติเมตร กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปสามเหลี่ยมขนาดเล็ก 4 กลีบที่โคนมีต่อมคู่ ขนาดประมาณ 1.2 มิลลิเมตร ดอกสีเหลือง มี 5 กลีบ รูปไข่กลับ มีหนึ่งกลีบขนาดเล็กกว่ากลีบอื่นเล็กน้อย ยาว 0.9-1.5 เซนติเมตร ขอบจักชายครุย มีก้านกลีบ เกสรเพศผู้ 10 อัน โคนเชื่อมติดกัน อับเรณูขนาดไม่เท่ากัน ปลายมีรยางค์ รังไข่มีขนคล้ายไหม ก้านเกสรเพศเมีย 3 อัน ยาวประมาณ 2 มิลลิเมตร ผลแยกเป็น 3 ซีก ยาว 5-6 มิลลิเมตร ปีกคู่ข้างยาว 2-5.5 เซนติเมตร กว้าง 1.5-2 เซนติเมตร ปีกหลังยาว 1-1.5 เซนติเมตร กว้างประมาณ 6 มิลลิเมตร ด้านนอกมีขนคล้ายไหม แต่ละซีกมีเมล็ดเดี่ยว

การกระจายพันธุ์ มีถิ่นกำเนิดในแคลิฟอร์เนียและเม็กซิโก ในประเทศไทยปลูกเป็นไม้ประดับ ในการใช้จัดสวน

สภาพนิเวศวิทยา พบตามบริเวณที่มีแสงแดดจัดถึงแดดรำไร เจริญเติบโตได้ดีในดิน ที่ร่วนซุย ระบายน้ำได้ดี

การใช้ประโยชน์ เป็นไม้ประดับ ปลูกเป็นซุ้มไม้เลื้อย มีดอกและผลสวยงามแปลกตา



ที่มา : สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา