



กระดานข่าวงานวิจัยใช้ได้จริง :

พืชอาหาร พืชสมุนไพร

เสี้อลาย

กลุ่มวิจัยพฤกษศาสตร์และฟิสิกส์พืช
สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร

ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Gastrochilus calceolaris* (Buch.-Ham. ex Sm.) D. Don

วงศ์ : Orchidaceae

ชื่ออื่น ๆ : ตีนเต่ากระ เสี้อดาวน้อย

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

กล้วยไม้อิงอาศัย สูง 3 - 7 ซม. ลำต้นรูปทรงกระบอกสั้น ใบรูปแถบหรือรูปขอบขนานกว้าง 2 - 3 ซม. ยาว 10 - 20 ซม. ปลายแยกเป็น 2 แฉกเล็กไม่เท่ากัน ดอก ออกเป็นช่อกระจุกตามซอกใบ ดอกในช่อมี 7 - 13 ดอก ดอกบานเต็มที่กว้าง 2 - 2.5 ซม. ช่อยาว 2 - 3 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอก สีเขียวอ่อนหรือสีเขียวอมเหลือง มีแต้มสีเลือดหมูกระจายทั่วทั้งกลีบ กลีบปากสีเหลืองอ่อนมีลักษณะเป็นถุง ปลายกลีบแผ่กว้างและมีขนฟูสีขาว กลางกลีบมีแต้มสีเหลืองและจุดประสีชมพูเข้ม เล้าเกสรสีเหลืองอมเขียว กลุ่มเรณูสีเหลืองสด มี 2 กลุ่ม มีก้านและแป้นเหนียว



การกระจายพันธุ์

พบตามป่าดิบเขาทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ของประเทศไทย ที่ระดับความสูง 1,100 - 1,200 เมตร ออกดอก ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ต่างประเทศพบที่ จีน เนปาล บังคลาเทศ อินเดีย พม่า เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย



การใช้ประโยชน์

มีศักยภาพในการนำมาพัฒนาและปลูกเป็นไม้ประดับ

ที่มาของข้อมูล : นาย ภัทรวีร์ พรหมนัส

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ