

## บานชื่นพันธุ์บ้านไร่พิงค์บอล (Banrai Pink Ball)

### ผู้ยื่นขอขึ้นทะเบียน

ชื่อ-สกุล                    ผู้อำนวยการศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
(รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี)

ที่อยู่                        239 (ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50230

โทรศัพท์                    053 944 043

### แหล่งที่มาและประวัติ

บานชื่นพันธุ์บ้านไร่พิงค์บอล (Banrai Pink Ball) เป็นบานชื่นในกลุ่มดอกสีชมพู มีจำนวนชั้นของกลีบดอก 7 ชั้น เกิดจากการพัฒนาพันธุ์โดยศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทำการรวบรวมพันธุ์บานชื่นจากพื้นที่ปลูกหลายจังหวัดในภาคเหนือ เช่น เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2532 ทั้งหมด จำนวน 219 สายพันธุ์ นำมาปลูกเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ที่มีความแข็งแรงและทนทานต่อโรคทั้งหมดจำนวน 147 สายพันธุ์ ในปี พ.ศ. 2540 และต่อมาในปี พ.ศ. 2547 ได้คัดเลือกสายพันธุ์ที่มีคุณลักษณะที่ดีให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ในแต่ละด้าน เช่น ไม้ประดับสนาม ไม้ตัดดอก และไม้กระถาง เป็นต้น โดยได้จำแนกตามกลุ่มสีและชั้นของกลีบดอก ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มสีได้ทั้งหมด 5 กลุ่มสี ได้แก่กลุ่มสีเหลือง ส้ม ชมพู บานเย็น และแดง แบ่งตามจำนวนชั้นของกลีบดอกได้ทั้งหมด 6 แบบ ได้แก่ กลุ่มดอกที่มีจำนวนชั้น 1 2 3 7 8 และ 9 ชั้น และในปี พ.ศ. 2550 ได้คัดเลือกสายพันธุ์ที่มีความสม่ำเสมอและสวยงามทั้งทรงต้น ลักษณะดอก และสีของกลีบดอก มีจำนวนชั้นของกลีบดอกหลายชั้น โดยทำการศึกษา ณ หน่วยงานกีฏวิทยา ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

### ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์

**ชนิด/ประเภท**                ไม้ดอกล้มลุกฤดูเดียว ชื่อวิทยาศาสตร์ *Zinnia elegans* วงศ์ Compositae

**ต้น**                            ลำต้นมีจำนวนข้อปล้องประมาณ 7-8 ข้อปล้อง มีลักษณะตั้งตรง ความสูงของต้นอยู่ระหว่าง 75-100 เซนติเมตร ความกว้างพุ่ม 70-80 เซนติเมตร ลำต้นมีสีเขียว มีขนอ่อนสีขาวปกคลุมอยู่โดยรอบ ลำต้นกลวง มีกิ่งแขนงเกิดขึ้นบริเวณซอกใบตรงรอยต่อระหว่างข้อปล้อง มีประมาณ 14-16 กิ่ง

**ใบ**                            เป็นใบเดี่ยวรูปใบหอก (lanceolate) ใบมีขนาดใหญ่ สีเขียวอ่อน เกิดตรงข้อของลำต้นหรือกิ่งอยู่เป็นคู่ๆมีการเรียงใบแบบตรงข้ามกัน ผิวใบมีขนหยาบ ขอบใบเรียบ (entire) ปลายใบแหลม โคนใบใหญ่มน ก้านใบสั้น ติดกับลำต้น

**ดอก/ช่อดอก**                ดอกเกิดตรงปลายยอด หรือปลายกิ่ง ซึ่งมีดอกย่อยเกิดตรงปลายก้านช่อดอกเดียวกันเรียงตัวอยู่บนฐานรองดอกโดยไม่มีก้านดอกย่อย และในช่อดอกนี้ประกอบด้วยดอกย่อย ๆ 2 ชนิด คือ ดอกวงนอกอยู่รอบนอกของดอก มีทั้งดอกสมบูรณ์เพศ และไม่สมบูรณ์เพศมี

จำนวนชั้นของกลีบประมาณ 7 ชั้น และดอกวงในอยู่ตรงกลางดอก ส่วนใหญ่เป็นดอกสมบูรณ์เพศมีกลีบดอกเชื่อมกันเป็นรูปทรงกระบอกอยู่เหนือรังไข่ ช่อดอกมีขนาดใหญ่กระจายออกจากศูนย์กลางเป็นวงกลม มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 7.5–9 เซนติเมตร ความยาวก้านดอก 5.5–8 เซนติเมตร กลีบดอกสีชมพูหรือ Red–Purple Group 68A เกสรตัวผู้มีสีเหลืองอยู่เป็นกระจุกตรงกลางดอกเห็นชัดเจน ส่วนเกสรตัวเมียสีเหลืองมีลักษณะคล้ายก้านปลาอยู่ติดกับกลีบประดับมีจำนวนเท่ากับกลีบประดับ

#### เมล็ด

เมล็ดมีขนาดใหญ่สีดำ เมล็ดค่อนข้างแบนทรงรี

#### ลักษณะอื่นๆ

1. อายุตั้งแต่เพาะเมล็ดถึงระยะออกดอก 50 เปอร์เซ็นต์ประมาณ 50–60 วัน
2. จำนวนดอกต่อต้นประมาณ 50–60 ดอก

#### ลักษณะเด่นพิเศษ

1. กลีบดอกสีชมพูหรือ Red–Purple Group 68A โดยใช้แผ่นเทียบสี RHS colour chart (2007)
2. ดอกมีขนาดใหญ่และก้านดอกยาวสามารถใช้เป็นไม้ตัดดอกได้ดีโดยมีอายุการปักแจกันโดยใช้น้ำเปล่าประมาณ 7 วัน
3. ดอกบานในเวลาเดียวกันเยอะทำให้ดอกพรุ่เต็มต้น



บานชื่นพันธุ์บ้านไร่พิงค์บอล (Banrai Pink Ball)