

## กุหลาบพันธุ์กุฟิงค์ 8

### ผู้ยื่นขอขึ้นทะเบียน

ชื่อ-สกุล	พระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์
ที่อยู่	พระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์ เลขที่ 1 หมู่ 12 ถ.ศรีวิชัย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์	053 219 915 , 089 434 3901
โทรสาร	053 225 793

### แหล่งที่มาและประวัติ

ในปี พ.ศ.2547 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้ทรงเสด็จฯ แปรพระราชฐานมาประทับ ณ พระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์ เพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจและทรงเยี่ยมราษฎรในภาคเหนือของ ไทยในช่วงเดือนมกราคม ถึง มีนาคมดังเช่นทุกปี ซึ่งกุหลาบในพระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ กุหลาบสมบูรณ์ ให้ดอกที่มีความสวยงามที่สุด

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชเสาวนีย์กับนายอำนาจ เดชะ ผู้ดูแล พระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์ระหว่างทรงพระราชดำเนินชมสวนกุหลาบในพระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์ว่า “ให้ ทดลองทำการผสมพันธุ์ดอกกุหลาบในพระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์เพื่อจะได้พันธุ์กุหลาบใหม่ ๆ ที่สวย ๆ เพิ่มขึ้นในประเทศไทย”

นายอำนาจ เดชะผู้ดูแล พระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์ จึงได้น้อมเกล้าฯ รับพระราชเสาวนีย์มา ดำเนินงานให้เป็นรูปธรรม โดยได้ตั้งคณะทำงานทดลองผสมพันธุ์กุหลาบในพระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์ขึ้น และมอบหมายให้ นายนิวัฒน์ ตรีบุญโณ หัวหน้างานกุหลาบพระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์ เป็นผู้รับผิดชอบใน การดำเนินการศึกษา ทดลอง ปรับปรุงพันธุ์กุหลาบ โดยการผสมเกสรจากดอกกุหลาบประดับสวนประเภทดอก ใหญ่ (Hybrid Tea) ที่ปลูกในพระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์ จนได้กุหลาบลูกผสมพันธุ์ใหม่ เป็นผลสำเร็จในปี พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็นปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา รวมใช้ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี

กุหลาบกุฟิงค์ 8 เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์แม่ คือ La Marseillaise และพันธุ์พ่อ คือ Flaming Peace ในปี 2550 ณ พระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์ กุหลาบกุฟิงค์ 8 ได้รับรางวัลการพัฒนาแหล่ง เรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์และกุหลาบลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ เพื่อการเรียนรู้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน ระดับดีเด่น ปี 2556

### ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์

ชนิดพืช/ประเภท	ไม้ตัดดอก ชื่อวิทยาศาสตร์ <i>Rosa hybrida</i> (L.) วงศ์ Rosaceae
ยอดอ่อน (Young shoot):	มีสีม่วง (anthocyanin coloration - present) ระดับเข้ม (intensity of anthocyanin coloration - strong)

**ลำต้น/ก้านดอก (Stem):** ทรงพุ่มสูง 1.0-1.3 เมตร ก้านดอกยาว 40-50 เซนติเมตร จำนวนหนามไม่มีหรือมีน้อยมาก (number of prickles - absent or very few)

**ใบ (Leaf):** ขนาดของใบ (leaf : size) ยาว 16 เซนติเมตร (length - 16 cm) กว้าง 14.7 เซนติเมตร (width - 14.7 cm) ใบมีสีเขียวเข้ม (intensity of green color on upper side - dark) และมีสีม่วง (anthocyanin coloration - present) ความมันวาวของใบไม่มีหรือมีน้อยมาก (glossiness of upper side - absent or very weak) ขอบใบย่อยไม่เป็นคลื่นหรือเป็นน้อยมาก (leaflet: undulation of margin - absent or very weak) รูปร่างใบย่อยเป็นรูปรีปานกลาง (terminal leaflet : shape of blade - medium elliptic) ฐานใบมน (terminal leaflet : shape of base - obtuse) ปลายใบเรียวแหลม (terminal leaflet : shape of apex - acuminate)

**ดอก (Flower):** รูปร่างดอกตูมเป็นรูปไข่ (flower bud : shape in longitudinal section - ovate) เป็นดอกประเภทกลีบซ้อน (flower : type - double) จำนวนกลีบดอก 48 กลีบ (number of petals - 48) จัดอยู่ในกลุ่มดอกสีชมพูเหลือง (color group - pink blend) สีบริเวณกลางดอกเป็นสีส้ม (color of the center - orange) ความหนาแน่นของกลีบดอกปานกลาง (density of petals - medium) เส้นผ่าศูนย์กลางของดอก 12.7 เซนติเมตร (flower : diameter - 12.7 cm) รูปร่างดอกเป็นแบบรูปดาว (flower : shape - star-shaped) ดอกมีกลิ่นหอมอ่อน (fragrance - weak) กลีบเลี้ยงมีหยักน้อยถึงปานกลาง (sepal : extensions - weak to medium) กลีบดอกค่อย ๆ เปิดออกทีละกลีบจากด้านนอก (reflexing of petals one-by-one - present) รูปร่างกลีบดอกเป็นรูปไข่กลับ (petal : shape - obovate) กลีบดอกไม่มีรอยหยักหรือมีน้อยมาก (petal : incisions - absent or very weak) ขอบกลีบดอกม้วนปานกลาง (reflexing of margin - medium) และไม่เป็นคลื่นหรือเป็นน้อยมาก (undulation - absent or very weak) ขนาดของกลีบดอก (petal : size) ยาว 6 เซนติเมตร (length - 6 cm) กว้าง 5.6 เซนติเมตร (width - 5.6 cm) จำนวนสีบนกลีบดอกด้านใน (ไม่รวมจุดที่ส่วนฐาน) มี 2 สี (number of colors on inner side (basal spot excluded) - two) สีหลักของกลีบดอกด้านในมีสีขาว รหัส RHS Color Chart - White 155A (main color on the inner side - White 155A) สีที่สองของกลีบดอกด้านในมีสีแดงม่วง รหัส RHS Color Chart - Red Purple N57C (secondary color on the inner side - Red Purple N57C) การกระจายตัวของสีที่สองอยู่บริเวณส่วนปลายของกลีบดอก (distribution of secondary color on the inner side - at apex) มีจุดที่ส่วนฐานบนกลีบดอกด้านใน (basal spot on the inner side - present) ขนาดของจุดเล็กมากถึงเล็ก (size of basal spot on the inner side - very small to small) และสีของจุดมีสีเหลืองอ่อน (color of basal spot on the inner side - light yellow)




แม่ La Marseillaise




พ่อ Flaming Peace



Diagram แสดงการผสมพันธุ์กุหลาบพันธุ์ 8



กุหลาบพันธุ์ภูฟิงค์ 8



กุหลาบพันธุ์กุพิงค์ 8



กุหลาบพันธุ์ภูพิงค์ 8