

# การปลูกผักบุ้งเจ็บ




สถาบันวิจัยพัฒนา  
กรมวิชาการเกษตร



ตารางที่ 1 การใช้สารป้องกันกำจัดโรคผักบุ้งเจ็บ

โรค	สารป้องกันกำจัดโรคพืช	อัตราการใช้	วิธีการใช้	หยุดการเจริญ
ราศนินมาخา	เมดาแลคซีด	5-15 กิโลม./มลติด 1 กิโลกรัม	คลุกเมล็ด ก่อนปลูก	- วัน
ใบขาด	แมมนิโคเรป (80% WP)	40-50 กิโลม./น้ำ้ 20 ลิตร	พ่นเมื่อพูบการรบوض่า	7 วัน
ใบไหม้	เมดาแลคซีด + แมมนิโคเรป (72% WP)	50 กิโลม./น้ำ้ 20 ลิตร	พ่นเมื่อพูบการรบوض่า	14 วัน

รวมความแม่นยำเรียบง่ายโดย  
นายอanhaway อธราราถังรอง นางสิตาดาภรณ์ บินทร์สิงห์



ตารางที่ 2 การใช้สารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูผักบุ้งเจ็บ

แมลง	สารป้องกันกำจัดแมลงศัตรู	อัตราการใช้	วิธีการใช้	หยุดการเจริญ
แมลง	สารป้องกันกำจัดแมลงศัตรู	อัตราการใช้	วิธีการใช้	หยุดการเจริญ
เห็บยอดผักกาดยาว	จิมคอติโนพริต (10% SL)	20 มล./น้ำ้ 20 ลิตร	พ่นเมื่อพูบการรบوض่า	14 วัน
หนอนกรรดที่	ไซปอร์เมทрин/ ฟอสฟอริล (6.25%/22.5%)	40-60 มล./น้ำ้ 20 ลิตร	เมื่อพูบน้ำน้ำออก ประมาณ 20% หลังน้ำออก	7 วัน
แมลงไฟหิน	เม็ต้าฟอกฟูริน (2.5% EC)	20-30 มล./น้ำ้ 20 ลิตร	ประมาณครึ่นเมื่อคงสภาพ	7-8 วัน
มาดเดส์ ทริโซเนมิก (BT)	60-80 กิโลม./น้ำ้ 20 ลิตร			14 วัน
				11 วัน



## สภาพพืชที่

ใกล้แหล่งน้ำและสะอาดต่อการนำมาใช้  
ตลอดฤดูปลูก ห่างไกลจากแหล่งมลพิษ

## ลักษณะเดิบ

ปลูกได้ในดินแบบทุกชนิด แต่ชอบดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย  
ขอบพื้นที่ขึ้นและต้องการความชื้นในดินสูงมาก มีค่าความ  
เป็นกรดเป็นด่าง 5.0-7.0

## สภาพภูมิอากาศ

แสงแดดเต็มที่ตลอดวัน อุณหภูมิที่เหมาะสมสมต่อการเจริญ  
เติบโตมากกว่า 25 องศาเซลเซียส ปลูกได้ตลอดปี

## พันธุ์กับนิยมปลูก

พันธุ์พิจิตรา 1 พันธุ์ใบไฟ

## การปลูก

### การเตรียมดิน

- ไถดักดินไว้ประมาณ 7-15 วัน แล้วไถพรวนอีก 1-2 ครั้ง
- ยกแปลงให้สูงขึ้น 10 เซนติเมตร กว้าง 1.5-2.0 เมตร ยาว 10-15 เมตร เว้นทางเดินระหว่างแปลง 40-50 เซนติเมตร
- ใส่ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมักที่สลายตัวดีอัตรา 2-4 ตัน/ไร่
- พรวนอย่างผิวน้ำดินให้ละเอียด ปรับให้เรียบเสมอ กันอย่าให้เป็นหลุมเป็นบ่อ

### วิธีการปลูก

- แท่งเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนในน้ำอุ่นนาน 6-12 ชั่วโมง เพื่อให้เมล็ดงอกดีขึ้น
- หัวน้ำให้กระจายทั่วทั้งแปลง โดยพยายามหัวน้ำให้เมล็ดพันธุ์ห่างกันเล็กน้อย
- กลบเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนด้วยดินร่วนหรือแกลบด้านบนประมาณ 0.5 เซนติเมตร
- คลุมด้วยฟาง รดน้ำเป็นฝอยละเอียดทั่วแปลง



## การดูแลรักษา

### การให้ปุ๋ย

- ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 (ญี่ปุ่น) อัตรา 15-20 กิโลกรัม/  
ไร่/ครั้ง โดยใส่ปุ๋ยครั้งแรกหลังปลูก 5-7 วัน และใส่ปุ๋ย  
ครั้งที่ 2 หลังปลูก 10-12 วัน ด้วยวิธีหัวน้ำแล้วรดน้ำตาม  
ทันที หรือใช้ปุ๋ยญี่ปุ่นอัตรา 10 กรัมละลายน้ำ 20 ลิตร  
 Rudyให้ทั่วแปลง

### การให้น้ำ

- ควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ จะให้โดยวิธีไดร์ก์ไดตามความ  
เหมาะสม
- ควรให้น้ำทันทีหลังจากใส่ปุ๋ยแล้ว
- ควรคุ้มดินเพื่อรักษาความชื้นของดินและลดการระเหย  
ของน้ำ ถ้าใช้เศษพืชต้องไม่มีส่วนขยายพันธุ์ หรือเมล็ด  
ติดมา ไม่ควรใช้แกลบคุ้ม เพราะหลังการพรวนดินกลบโคน  
แกลบจะสลายตัวทำให้ผักบุ้งจีนชะงักการเจริญเติบโต



## โรคและแมลงศัตรู

ป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูตามคำแนะนำบนฉลาก  
สารเคมี และตามคำแนะนำในตารางที่ 1 และ 2

## การเก็บเกี่ยว

- เมื่อผักบุ้งจีนมีอายุ 20-25 วันหลังปลูก หรือมีความสูง  
ประมาณ 30-35 เซนติเมตร ให้ถอนต้นผักบุ้งจีนออกจาก  
แปลงปลูกทั้งต้นและราก
- ควรตัดนำ่ก่อนถอนต้นผักบุ้งจีนมาจะถอนผักบุ้งจีนตัว  
เดียว รากไม่ขาดมาก

## วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

- หลังเก็บเกี่ยว ให้น้ำเข้าร่องทันที ไม่ควรวางไว้กลางแดด  
และไม่ควรวางบนพื้นผิดดินโดยไม่มีวัสดุรองรับ
- ล้างรากให้สะอาด เด็ดใบและแขนงที่โคนต้นออก นำมา  
ผึ่งให้แห้ง
- จัดเรียงต้นผักบุ้งจีนเป็นมัด เตรียมบรรจุภาชนะ เช่น  
ถุงพลาสติกที่เจาะรูรอบด้านเพื่อการจัดหน่ายต่อไป