

รายงานผลงานเรื่องเต็มสิ้นสุด ปี 2562

1. แผนงานวิจัย แผนบูรณาการวิจัยและพัฒนาพืชผักเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

2. โครงการวิจัย วิจัยและพัฒนาการผลิตชาโยเต้คุณภาพ

กิจกรรม

กิจกรรมย่อย

3. ข้อการทดลอง การทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดแมลงหัวข้าวในชาโยเต้

Efficacy Test of Insecticides for Controlling Whitefly, *Bemisia tabaci* (Gennadius) in Chayote

4. คณะผู้ดำเนินงาน

หัวหน้าการทดลอง วนิชญา ฉิมนาค	ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์
ผู้ร่วมงาน ลัดดาวลักษ์ อินทร์สังข์	สถาบันวิจัยพืชสวน
จิตอาภา จิจุบาล	ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์
ธัญพร งามงอน	ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์
สมศักดิ์ ศิริพลตั้งมั่น	สำนักวิจัยพัฒนาการอารักษาพืช
สุภา สุขโชคสกุล	สถาบันวิจัยพืชสวน

5. บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดแมลงหัวข้าวชาโยเต้ที่เหมาะสมโดยดำเนินการทดลองที่ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูง ในระหว่างปี 2561 – 2562 วางแผนการทดลองแบบ RCB 4 ชั้น 8 กรมวิธี ได้แก่ 1) buprofezin 25% WP อัตรา 30 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร 2) imidacloprid 70 % WG อัตรา 8 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร 3) carbosulfan 20 % EC อัตรา 50 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร 4) fipronil 5 % SC อัตรา 40 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร 5) thiamethoxam 25% WG อัตรา 10 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร 6) dinotefuran 10% WP อัตรา 20 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร 7) etofenprox 10% EC อัตรา 50 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร และ 8) ไม่นับสาร ดำเนินการพ่นสารตามกรมวิธี ผลการทดลองปี 2561 และ 2562 พบว่า สารป้องกันกำจัดแมลงหัวข้าวในชาโยเต้ที่มีแนวโน้มในการควบคุมแมลงหัวข้าว คือ etofenprox 10% EC (Trebon) อัตรา 50 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร imidacloprid 70 % WG (Provado) อัตรา 8 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร และ buprofezin 25% WP (Applaed) อัตรา 30 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร แต่การพ่นสารทุกกรมวิธีไม่สามารถป้องกันกำจัดแมลงหัวข้าวในระยะตัวเต็มวัยได้ 100% ดังนั้นขั้นตอนการเก็บเกี่ยว ต้องมีการจัดการที่ดี เพื่อป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายของโรคไวรัสไปด่างของชาโยเต้

คำสำคัญ: ชาโยเต้ แมลงหัวข้าว ประสิทธิภาพสาร

Abstract

This study aimed to demonstrate the effect of various insecticides against Whitefly, *Bemisia tabaci* (Gennadius) in Chayote at Phetchabun Highland Agricultural Research Center, Phetchabun province. Randomized Complete Block Design (RCBD) was used in this experiment with 8 treatments and 4 replications as following: 1) Spray buprofezin 25% WP 2) imidacloprid 70% WG 3) carbosulfan 20% EC 4) fipronil 5% SC 5) thiamethoxam 25% WG 6) dinotefuran 10% WP 7) etofenprox 10% EC and 8) Control. Conducting spraying according to the treatment of the experiment. Results in 2018 and 2019 showed that the insecticide in Chayote with a tendency to control whitefly is etofenprox 10% EC (Trebon) application rate 50 millilitres/20 liter water, imidacloprid 70 % WG (Provado) application rate 8 grams/20 liter water and buprofezin 25% WP (Applaed) application rate 30 grams/20 liter. All spraying treatments can't prevent 100% whitefly adult stage so harvesting process must have good management in order to prevent the spread of the virus, the leaves of the chayote.

Keywords: Chayote Whitefly Efficacy

6. คำนำ

ชาโยเต้ (Chayote: *Sechium edule* (Jacq.) Swartz) หรือฟักแมว มะระหวาน เป็นพืชอยู่ในวงศ์ Cucurbitaceae มีคุณค่าทางอาหารสามารถรับประทานได้ทั้งยอดอ่อน และผล จึงเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ มีการปลูกทั่วโลก เช่น ออสเตรเลีย อิตาลี สเปน อินโดนีเซีย เป็นต้น พับปลูกในพื้นที่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 500-1,700 เมตร ต้องการความชื้นสูง 80-85% ปริมาณน้ำฝน 1,500 - 2,000 มิลลิเมตร อุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 13 - 21 องศาเซลเซียส ซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ มีพื้นที่ปลูกชาโยเต้มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 88.99 ของประเทศไทย (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2560) มีผลผลิตส่งจำหน่ายตามแหล่งท่องเที่ยว และตลาดกลาง วันละประมาณ 5 ตัน เป็นหนึ่งอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้เป็นอย่างดี แต่เนื่องจากระยะเวลาการปลูก ข้าพื้นที่ยาวนานกว่าสิบปี ทำให้เป็นแหล่งสะสมของโรค-แมลง ทั้งนี้ได้มีการกำหนดควบคุมภัยด้วยชาโยเต้ ต้องมีความสมบูรณ์ ใบและก้าน ไม่แก่ มีสีเขียวสด ไม่แห้งช่อออกหรือมีผลติดมา สด สะอาด และปลอดภัยจากสารเคมี (www.hkm.hrdi.or.th, 2561)

แมลงหัวขาว จัดเป็นแมลงศัตรุชาโยเต้ที่สำคัญ สามารถเข้าทำลายได้ทุกรายละเอียด สามารถเข้าทำลายได้ทุกรายการ เจริญเติบโตของชาโยเต้ ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบและยอดอ่อนของพืช นอกจากนี้ยังพบว่าเป็นแมลงพาหะของเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคใบดำในพืชต่างๆ รวมทั้งในชาโยเต้ด้วย ปัจจุบันพบว่ามีเข้าระบบทำลายชาโยเต้ในพื้นที่ปลูกชำนาญ และพื้นที่ในเขตอื่นๆ ทำให้ชาโยเต้ไม่มีอาการใบดำ ผลผลิตที่ได้ไม่เป็นที่ต้องการของตลาด การป้องกันกำจัดแมลงหัวขาวซึ่งเป็นพาหะสำคัญของโรคนี้จึงมีความจำเป็นเพื่อลดจำนวนประชากรของแมลงหัวขาวลงและเป็นแนวทางที่จะใช้ป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคได้ จึงทดสอบประสิทธิภาพสารอื่นๆ เพื่อให้ได้สารป้องกันกำจัดแมลงหัวขาวที่มีประสิทธิภาพดี ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม

7. วิธีดำเนินการ

- อุปกรณ์

1. แปลงชาอยเต้ ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ พิกัดแปลง X0709427, Y1835240 ความสูงจากระดับน้ำทะเล 725 เมตร
2. สารเคมีที่ใช้ในการทดลอง buprofezin 25%WP imidacloprid 70%WG carbosulfan 20% EC fipronil 5%SC thiamethoxam 25% WG dinotefuran 10%WP. etofenprox 10%EC
3. วัสดุทางการเกษตร เช่น ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 ปุ๋ยมูลสัตว์ สารป้องกันกำจัดเชื้อรา เครื่องพ่นสารแบบสูบโดยสะพายหลัง ๆ
4. อุปกรณ์ตรวจนับแมลง สมุดบันทึกข้อมูล ฯลฯ

- วิธีการ

วางแผนการทดลองแบบ RCB 4 ชั้า 8 กรรมวิธี ดังนี้

1. buprofezin 25% WP (Applaed)	อัตรา 30 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร
2. imidacloprid 70% WG (Provado)	อัตรา 8 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร
3. carbosulfan 20% EC (Posse)	อัตรา 50 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร
4. fipronil 5% SC (Ascend)	อัตรา 40 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร
5. thiamethoxam 25% WG (Actara 25 WG)	อัตรา 10 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร
6. dinotefuran 10% WP (Stakle)	อัตรา 20 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร
7. etofenprox 10% EC (Trebon)	อัตรา 50 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร
8. ไม่พ่นสาร	

เตรียมพื้นที่ พื้นอื้ชาอยเต้ และทำค้างปลูกชาอยเต้ตามกรรมวิธี ขนาดแปลงย่อย 3×5 เมตร โดยแบ่งเป็น 2 แปลง ขนาด 1×5 เมตร ระยะห่าง 1 เมตร ทั้งหมด 32 แปลงย่อย ระยะห่างระหว่างแปลงย่อย 2 เมตร พ่นสารทดลองครั้งแรกเมื่อพบร่องรอยแมลงหรือข้าวในแปลง พ่นสารทดลองทุก 7 วัน จำนวน 4 ครั้ง และทำการตรวจนับจำนวนแมลงหรือข้าวก่อนและหลังพ่นสารทดลองทุก 7 วัน โดยการสุ่มนับ 50 ใบ จากต้นชาอยเต้ 10 ต้น ต่อแปลงย่อย ใน 2 例外กลาง

การบันทึกข้อมูล บันทึกจำนวนตัวเต็มวัยแมลงหรือข้าวที่พบแต่ละกรรมวิธี บันทึกผลกระทบของสารทดลองที่มีต่อต้นชาอยเต้ (phytotoxic) เปรียบเทียบผลการทดลองพ่นสารตามกรรมวิธีต่างๆ โดยวิเคราะห์ผลทางสถิติจำนวนตัวเต็มวัยแมลงหรือข้าวในแต่ละครั้งที่ตรวจนับด้วยโปรแกรม IRRISTAT โดยแปลงค่าข้อมูลจำนวนตัวเต็มวัยแมลงหรือข้าวที่ตรวจนับได้ด้วยค่า $\sqrt{X} + 0.5$ ก่อนวิเคราะห์ผลทางสถิติ ถ้าจำนวนตัวเต็มวัยแมลงหรือข้าวก่อนพ่นสารไม่แตกต่างกันทางสถิติ วิเคราะห์ความแปรปรวนหลังพ่นสารด้วยวิธี analysis of variance ถ้าจำนวนตัวเต็มวัยแมลงหรือข้าวก่อนพ่นสารแตกต่างกันทางสถิติ วิเคราะห์ความแปรปรวนหลังพ่นสารด้วยวิธี analysis of covariance จากนั้นเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธี DMRT

- เวลาและสถานที่ ระยะเวลาดำเนินการ :เริ่มต้น ตุลาคม 2559 สิ้นสุด เดือนกันยายน 2562

สถานที่ดำเนินการ : ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์

8. ผลการทดลองและวิจารณ์

การทดลองปี 2561

ผลการทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดแมลงหัวใจไชโยเต้ ทำการการตรวจนับตัวเต็มวัยแมลงหัวใจก่อนพ่นสารทดสอบ พบรจำนวนแมลงหัวใจเฉลี่ย 0.38 – 0.95 ตัวต่อใบ มีความแตกต่างกันทางสถิติ จีวิเคราะห์ข้อมูลหลังพ่นสารด้วยวิธี analysis of covariance

หลังการพ่นสารครั้งที่ 1 พบร่วมวิธีการพ่นสาร buprofezin, imidacloprid carbosulfan, fipronil, etofenprox, thiamethoxam dinotefuran และ พบรตัวเต็มวัยแมลงหัวใจเฉลี่ย 0.30, 0.30, 0.35, 0.38, 0.40, 0.50 และ 0.58 ตัวต่อใบ ตามลำดับ น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสาร ที่พบรเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 0.73 ตัวต่อใบ

หลังการพ่นสารครั้งที่ 2 พบร่วมวิธีการพ่นสาร fipronil, buprofezin, imidacloprid, thiamethoxam, dinotefuran และ etofenprox พบรตัวเต็มวัยแมลงหัวใจเฉลี่ย 0.43, 0.55, 0.58, 0.70, 0.63 และ 0.63 ตามลำดับ น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับกรรมวิธีการพ่นสาร carbosulfan และ กรรมวิธีไม่พ่นสาร ที่พบรเฉลี่ย 0.95 และ 0.98 ตัวต่อใบ ตามลำดับ สอดคล้องกับการทดลองของสุเทพและพวงผา (ไม่ปรากฏชื่อพิมพ์) ว่าสารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดแมลงหัวใจยาสูบทั้งระยะตัวอ่อนและตัวเต็มวัยในกะเพรา ได้แก่ buprofezin (Nepam 40%SC) อัตรา 20-40 มิลลิลิตรและ imidacloprid (Provado 70%WG) อัตรา 6-12 กรัม/น้ำ 20 ลิตร

หลังการพ่นสารครั้งที่ 3 พบร่วมวิธีการพ่นสาร etofenprox พบรตัวเต็มวัยแมลงหัวใจเฉลี่ยน้อยที่สุด 0.25 ตัวต่อใบ แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับทุกกรรมวิธี

หลังการพ่นสารครั้งที่ 4 พบร่วมวิธีการพ่นสาร imidacloprid พบรตัวเต็มวัยแมลงหัวใจน้อยที่สุด เฉลี่ย 0.25 ตัวต่อใบ แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับกรรมวิธีการพ่นสาร buprofezin และ etofenprox ที่พบรแมลงหัวใจ 0.35 และ 0.43 ตัวต่อใบ แต่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับกรรมวิธีการพ่นสาร carbosulfan, fipronil, thiamethoxam, dinotefuran และ กรรมวิธีไม่พ่นสาร โดยพบรเฉลี่ย 0.53, 0.58, 0.60, 0.76 และ 0.77 ตัวต่อใบ ตามลำดับ (Table 1) ซึ่งการใช้สาร imidacloprid สอดคล้องกับการทดลองของ กำพล และคณะ (2554) ที่รายงานว่าการใช้ imidacloprid ใน การควบคุมแมลงหัวใจ ในชาโยเต้สามารถให้ผลผลิตที่ได้คุณภาพร้อยละ 63.40

Table 1 Number of whitefly found in Chayote before and after various insecticides at Phetchabun Highland Agricultural Research Center on January to April 2018

Treatment	Application rate (g, ml/20 l.)	Mean number of whitefly/ leaf ¹					
		before		after treatment			
		treatment	1	2	3	4	
1. buprofezin 25% WP (Applaed)	30	0.45a	0.30a	0.55bc	0.30	0.35ab	

2. imidacloprid 70 % WG (Provado)	8	0.50ab	0.30a	0.58bc	0.40	0.25a
3. Carbosulfan 20 % EC (Posse)	50	0.52ab	0.35a	0.95c	0.60	0.53cd
4. Fipronil 5 % SC (Ascend)	40	0.38a	0.38a	0.43a	0.60	0.58bcd
5. Thiamethoxam 25% WG (Actara)	10	0.60abc	0.58ab	0.70bc	0.58	0.60cd
6. Dinotefuran 10% WP (Stakle)	20	0.95c	0.50ab	0.63bc	0.50	0.78d
7. Etofenprox 10% EC (Trebon)	50	0.90bc	0.40a	0.63bc	0.25	0.43abc
8. Control (ไม่พ่นสาร)	-	0.75abc	0.73b	0.98c	0.52	0.77d
CV%	-	41.00	40.20	44.00	56.10	28.00

¹ Mean followed by the same letters were not significantly different at 5% level by DMRT.

จากการสำรวจและบันทึกผลกระทบของสารเคมีต่อพืชพบว่าสาร dinotefuran ทำให้พืชเกิดอาการใบไหม้มากกว่าร้อยละ 40 ของพื้นที่ใบ (Figure 1)



Figure 1 Phytotoxic of plants in the process of spraying dinotefuran in 2018

การทดลองปี 2562

ผลการทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดแมลงหัวข้าวในชาโภเต้ ทำการตรวจสอบตัวตัวเมี้ยมวัยแมลงหัวข้าวก่อนพ่นสารทดสอบ พบรจำนวนแมลงหัวข้าวเฉลี่ย 0.68 – 1.60 ตัวต่อใบ มีความแตกต่างกันทางสถิติ จึงวิเคราะห์ข้อมูลหลังพ่นสารด้วยวิธี analysis of covariance

หลังการพ่นสารครั้งที่ 1 พบร่วมกับการพ่นสาร buprofezin พบรตัวตัวเมี้ยมวัยแมลงหัวข้าวน้อยที่สุดเฉลี่ย 0.23 ตัวต่อใบ และไม่แตกต่างกันทางสถิติกับทุกรรมวิธี

หลังการพ่นสารครั้งที่ 2 พบร่วมกับการพ่นสาร etofenprox พบรตัวตัวเมี้ยมวัยแมลงหัวข้าวน้อยที่สุดเฉลี่ย 0.20 ตัวต่อใบ น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับรرمวิธีการพ่นสาร fipronil, dinotefuran และรرمวิธีไม่พ่นสาร ที่พบรเฉลี่ย 0.97, 0.97 และ 0.95 ตัวต่อใบ ตามลำดับ และไม่แตกต่างกันทางสถิติกับรرمวิธีพ่นสาร buprofezin, imidacloprid, carbosulfan และ thiamethoxam พบรตัวตัวเมี้ยมวัยแมลงหัวข้าวเฉลี่ย 0.60, 0.75, 0.33 และ 0.35 ตัวต่อใบ ตามลำดับ

หลังการพ่นสารครั้งที่ 3 พบว่า กรรมวิธีการพ่นสาร dinotefuran พบรดตัวเต็มวัยแมลงหัวขวางเฉลี่ยน้อยที่สุด 0.08 ตัวต่อใบ น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับกรรมวิธีการพ่นสาร buprofezin และ carbosulfan ที่พบรดเฉลี่ย 0.43 และ 0.38 ตัวต่อใบ แต่ไม่แตกต่างกับกรรมวิธีที่พ่นสาร imidacloprid, fipronil, thiamethoxam, etofenprox และกรรมวิธีไม่พ่นสาร ที่พบรดเฉลี่ย 0.18, 0.20, 0.20, 0.10 และ 0.18 ตัวต่อใบ ตามลำดับ

หลังการพ่นสารครั้งที่ 4 พบว่า กรรมวิธีการพ่นสาร etofenprox พบรดตัวเต็มวัยแมลงหัวขวางเฉลี่ยที่สุด เฉลี่ย 0.03 ตัวต่อใบ น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับกรรมวิธีการพ่นสาร imidacloprid และ dinotefuran ที่พบรดเฉลี่ย 0.43 และ 0.40 ตัวต่อใบ แต่ไม่แตกต่างกับกรรมวิธีที่พ่นสาร buprofezin, carbosulfan, fipronil, thiamethoxam และกรรมวิธีไม่พ่นสาร ที่พบรดเฉลี่ย 0.10, 0.13, 0.28, 0.15 และ 0.33 ตัวต่อใบ ตามลำดับ (Table 2)

Table 2 Number of whitefly found in Chayote before and after various insecticides at Phetchabun Highland Agricultural Research Center on November to April 2019

Treatment	Application rate (g., ml/20 l)	Mean number of whitefly/ plant/ leaf ¹				
		before treatment	after treatment			
			1	2	3	4
1. buprofezin 25% WP (Applaed)	30	0.68a	0.23	0.60ab	0.43c	0.10ab
2. imidacloprid 70 % WG (Provado)	8	1.60c	0.70	0.75ab	0.18ab	0.43c
3. Carbosulfan 20 % EC (Posse)	50	0.70a	1.65	0.33ab	0.38bc	0.13abc
4. Fipronil 5 % SC (Ascend)	40	1.33bc	0.70	0.97b	0.20ab	0.28abc
5. Thiamethoxam 25% WG (Actara)	10	1.08ab	1.33	0.35ab	0.20ab	0.15abc
6. Dinotefuran 10% WP (Stakle)	20	1.28bc	0.88	0.97b	0.08a	0.40bc
7. Etofenprox 10% EC (Trebon)	50	0.85ab	1.50	0.20a	0.10a	0.03a
8. Control (ไม่พ่นสาร)	-	1.25bc	0.80	0.95b	0.18ab	0.33abc
CV%	-	28.20	76.80	63.10	64.50	83.30

¹ Mean followed by the same letters were not significantly different at 5% level by DMRT

จากการสำรวจและบันทึกผลกระทบของสารเคมีต่องานชีวภาพต่อพืชพบว่า สาร carbosulfan และ dinotefuran ทำให้พืชเกิดอาการใบไหม้มากกว่าร้อยละ 30 ของพื้นที่ใบ (Figure 2)



Figure 2 Phytotoxic of plants in the process of spraying carbosulfan and dinotefuran in 2019

จากผลการทดสอบสารป้องกันกำจัดแมลงหรีข้าวในชาโดยเต็斯มาเรตสูปเป็นเบื้องต้นได้ว่าสารที่มีแนวโน้มในการควบคุมแมลงหรีข้าว คือ etofenprox 10% EC (Trebon) อัตรา 50 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร imidaclorpid 70 % WG (Provado) อัตรา 8 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร และ buprofezin 25% WP (Applaed) อัตรา 30 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

คณะผู้วิจัยจึงได้ดำเนินการทดสอบสารป้องกันกำจัดแมลงหรีข้าวในชาโดยเต็สที่มีแนวโน้มสำหรับการควบคุมแมลงหรีข้าว โดยกำหนดให้มี 5 กรรมวิธี ๆ ละ 4 ชั้้ง ดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1) buprofezin 25% WP (Applaed) | อัตรา 30 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร |
| 2) imidaclorpid 70 % WG (Provado) | อัตรา 8 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร |
| 3) fipronil 5 % SC (Ascend) | อัตรา 40 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร |
| 4) etofenprox 10% EC (Trebon) | อัตรา 50 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร |
| 5) control (ไม่พ่นสาร) | |

ผลการทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดแมลงหรีข้าวในชาโดยเต็ ทำการตรวจนับตัวเดิมวัยแมลงหรีข้าวก่อนพ่นสารทดสอบ พบร่วมจำนวนแมลงหรีข้าวนเฉลี่ย 1.45 – 2.55 ตัวต่อใบ มีความแตกต่างกันทางสถิติ จึงวิเคราะห์ข้อมูลหลังพ่นสารด้วยวิธี analysis of covariance

หลังการพ่นสารครั้งที่ 1 พบร่วม กรรมวิธีการพ่นสาร buprofezin พบร่วมวัยแมลงหรีข้าน้อยที่สุดเฉลี่ย 0.74 ตัวต่อใบ แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับทุกกรรมวิธี

หลังการพ่นสารครั้งที่ 2 พบร่วม กรรมวิธีการพ่นสาร buprofezin พบร่วมวัยแมลงหรีขาน้อยที่สุดเฉลี่ย 0.78 ตัวต่อใบ แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับทุกกรรมวิธี

หลังการพ่นสารครั้งที่ 3 พบร่วม กรรมวิธีการพ่นสาร etofenprox พบร่วมวัยแมลงหรีขานเฉลี่ยน้อยที่สุด 0.66 ตัวต่อใบ น้อยกว่าและไม่แตกต่างกันทางสถิติกับกรรมวิธีการพ่นสาร buprofezin, imidaclorpid และ fipronil แต่แตกต่างอย่างนัยสำคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสาร ที่พบรเฉลี่ย 1.08 ตัวต่อใบ

หลังการพ่นสารครั้งที่ 4 พบว่า กรรมวิธีการพ่นสาร buprofezin พbutัวเต็มวัยแมลงหัวข่าน้อยที่สุดเฉลี่ย 0.36 ตัวต่อใบ แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับทุกกรรมวิธี (Table 3)

จากการทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดแมลงหัวข้าวพบว่าการพ่นสาร buprofezin และ etofenprox พbutัวเต็มวัยแมลงหัวข่าน้อยที่สุด ซึ่งสารดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่ออาการใบไหม้ของชาโภเต้

Table 3 Number of whitefly found in Chayote before and after various insecticides at Phetchabun Highland Agricultural Research Center on April to June 2019

Treatment	Application rate (gram, ml/ 20 liter water)	Mean number of whitefly/ plant/ leaf ¹				
		before treatment	after treatment			
			1	2	3	4
1. buprofezin 25% WP (Applaed)	30	2.55	0.74a	0.78a	0.81a	0.36a
2. imidacloprid 70 % WG (Provado)	8	2.26	1.03a	0.98a	0.76a	0.67a
3. Fipronil 5 % SC (Ascend)	40	2.01	1.41a	1.30a	0.77a	0.37a
4. Etofenprox 10% EC (Trebon)	50	1.99	1.70a	1.35a	0.66a	0.49a
5. Control (ไม่พ่นสาร)	-	1.45	2.09a	1.55a	1.80b	0.81a
CV%	-	40.30	76.40	40.10	63.10	65.20
RE%	-	101.00	125.30	-	164.50	100.70

¹ Mean followed by the same letters were not significantly different at 5% level by DMRT. Mean were the average of 4 replication

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ

สารป้องกันกำจัดแมลงหัวข้าวในชาโภเต้ที่มีแนวโน้มในการควบคุมแมลงหัวข้าว คือ etofenprox 10% EC (Trebon) อัตรา 50 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร imidacloprid 70 % WG (Provado) อัตรา 8 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร และ buprofezin 25% WP (Applaed) อัตรา 30 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร จากผลการทดลองทุกกรรมวิธีไม่สามารถป้องกันกำจัดแมลงหัวข้าวในระยะตัวเต็มวัยได้ 100% ดังนั้นการเฝ้าระวังและตรวจเช็คแมลงในแปลงจะมีความจำเป็น และต้องรีบทำการป้องกันกำจัดเมื่อพบแมลงหัวข้าวในแปลง รวมทั้งการจัดการวัชพืชในแปลงปลูก และบริเวณรอบแปลง ซึ่งอาจเป็นแหล่งอาศัยของแมลงได้ เพื่อเป็นการควบคุมจำนวนปริมาณประชากรของแมลงหัวข้าวให้น้อยลงและเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคใบดำ รวมทั้งขั้นตอนการเก็บเกี่ยว ต้องมีการจัดการที่ดี เพื่อป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายของโรคไวรัสไปด่างของชาโภเต้ได้

10. การนำไปใช้ประโยชน์

1. นำข้อมูลที่ได้ไปเผยแพร่ให้เกษตรกรผู้ปลูกชาโดยเต็ม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันกำจัดแมลงหวีขาว
2. ขยายผลต่อกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย จัดทำแปลงต้นแบบการป้องกันกำจัดแมลงหวีขาวในชาโดยเต็ม เพื่อให้เกษตรกรผู้ที่สนใจนำไปปรับใช้ได้ต่อไป

11. ขอบเขต

ขอบเขตผู้อำนวยการ และนักวิชาการ ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ และนักวิชาการ สถาบันวิจัย พืชสวน ที่ให้การสนับสนุน ให้คำปรึกษาแก่ไขปัญหาด้านวิชาการให้ได้ผลตามวัตถุประสงค์ และขอบเขต นักวิชาการกลุ่มวิจัยและวิเคราะห์ทางสถิติ งานวิจัยเกษตร สำหรับคำแนะนำด้านสถิติ รวมถึงขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ร่วมจัดทำแปลงทดลอง มา ณ โอกาสนี้

12. เอกสารอ้างอิง

กรมส่งเสริมการเกษตร. 2560. ชาโดยเต็ม (ฟิกเม้าว) ปี 2559.

www.agriinfo.doae.go.th/year60/plant/rortor/veget/91.pdf

กำแพง เมืองโคมพัส จิตอาภา ชมเชย ธัญพ. งามอน เยาวภา เต้าขัยภูมิ และสมเพชร พรเมืองดี. 2554.

“โครงการวิจัยและพัฒนาโโนโลยีการผลิตชาโดยเต็มอย่างมีคุณภาพ” ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ที่สูงเพชรบูรณ์ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2

สถาบันวิจัยและพัฒนาพืชที่สูง (องค์การมหาชน). 2559. ชาโดยเต็ม.

www.hkm.hrdi.or.th/knowledge/detail/67

สุเทพ สหายา และ พวงผกา อ่างมณี (ไม่ระบุปีที่พิมพ์). ทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดแมลงหวีขาว และหนอนของใบในผักสวนครัว(กะเพรา โทรศพ. และแมงลัก) สำนักวิจัยพัฒนาการอาหารภาคพื้น. สืบ ออนไลน์ <http://www.doa.go.th/research/attachment.php?aid=926>

Puntener, M. 1992. Manual for Field Trials in Plant Protection. 3rd ed. Agricultural Division, Ciba – Geigy Limited. Switzerland. 271 pp.