

## แบบรายงานผลเรื่องเต็มการทดลองที่สื้นสุด

### 1. ชุดโครงการวิจัย

#### 2. โครงการวิจัย

เทคโนโลยีการผลิตมะเขือเทศ

#### 3. ข้อการทดลอง

สำรวจและจำแนกพันธุ์มะเขือเทศเพื่อการปรับปรุงพันธุ์

#### 4. คณะผู้ดำเนินงาน

##### หัวหน้าการทดลอง

ว่าที่ร.ต.อรรถพล รุกขพันธ์ สังกัด ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกา

##### ผู้ร่วมงาน

นางจิรภาน ออสติน สังกัด ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกา

นางสาวรัชนี ศิริyan สังกัด ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกา

นางสาวเสาวนี เขตสกุล สังกัด ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกา

### 5. บทคัดย่อ

ดำเนินการสำรวจ รวบรวมเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศจากพื้นที่แปลงปลูกและแปลงรวมพันธุ์ของเกษตรกร ในภาคตะวันตก ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย จากมหาวิทยาลัย หน่วยงานของรัฐ และพันธุ์การค้าจากต่างประเทศ เดือนตุลาคม 2554 – กุมภาพันธ์ 2555 นำมาปลูกเปรียบเทียบที่แปลงทดลอง ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกา จำนวน 501 เบอร์ คัดเลือกเบอร์ที่มีลักษณะดีทั้งทางด้านสัณฐานวิทยาและการเกษตรได้ 162 เบอร์ แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มตามการใช้ประโยชน์ คือ กลุ่มเชอร์รี่ กลุ่มสีดา กลุ่มรับประทาน สดผลใหญ่ กลุ่มแปรรูป และกลุ่มต้นตอ และคัดเลือกลักษณะสำคัญที่ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ ได้แก่ กลุ่มที่ไม่มีรอยต่อขั้วผลและขั้วผลเหมือนกัน กลุ่มที่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้ในช่วงที่มีอุณหภูมิอากาศสูงทั้งการปลูกในแปลงและโรงเรือน ทำการทดสอบตัวเองเพื่อให้ได้สายพันธุ์แท้สำหรับใช้เป็นเชื้อพันธุ์ในการคัดเลือกใช้ปรับปรุงพันธุ์ต่อไป และประเมินคัดเลือกเบอร์มะเขือเทศเพื่อใช้เป็นพ่อ-แม่พันธุ์ในการสร้างลูกผสม โดยวิธีการทดสอบสมรรถนะการรวมตัวเฉพาะ (SCA) ของลูกผสมได้จำนวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเชอร์รี่ คือ #036-8 x #041, #036-8 x #396, #186 x #002-6, #362-1 x #041 และ #448 x #041 และกลุ่มแปรรูป คือ #045 x #017-1, #045-6 x #033-6-2, #398 x #409, #402 x #398 และ #402 x #403

### 6. คำนำ

มะเขือเทศ เป็นพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมพืชหนึ่งของประเทศไทย แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ มะเขือเทศสีส่องเงา จำนวนมากโดยนำไปใช้ปรุงรสและกลิ่นของอาหาร เช่น ส้มตำ และยังนำมะเขือเทศผลใหญ่สีแดงที่ปลูกส่งโรงงานอุตสาหกรรมมาบริโภคด้วย นอกจากนี้มีการนำมะเขือเทศผลเล็กหรือมะเขือเทศเชอร์รี่ มาวางจำหน่ายในห้องตลาด ปรากฏว่า ผู้บริโภคให้ความสนใจค่อนข้างมาก เพราะเป็นมะเขือเทศที่มีรสหวาน เมล็ดน้อย สามารถนำไปปรุงโดยตรงแทนผลไม้ได้

ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสนใจกับสุขภาพมากขึ้น การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์จะช่วยให้สุขภาพดี ดังนั้นมะเขือเทศจึงเป็นพืชอาหารที่มีความสำคัญต่อสุขภาพชนิดหนึ่ง เนื่องจากในผลสุกมะเขือเทศ

ประกอบด้วยสาร carotenoids ซึ่งเป็นเม็ดสีตามธรรมชาติที่พบทั่วไปในพืช แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ ได้แก่ กลุ่ม xanthophylls และกลุ่มที่ไม่มีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ ได้แก่ กลุ่ม carotenes โดยเฉพาะกลุ่ม carotene มีประมาณ 90-95 % ของปริมาณ carotenoids ทั้งหมด ไลโคปีน (lycopene) เป็นสารสำคัญในกลุ่ม carotenes พบมากในมะเขือเทศผลสีแดง ทำให้มะเขือเทศเป็นแหล่งสำคัญของสารต้านออกซิเดชัน อย่างไรก็ตาม ปริมาณของไลโคปีนมีความแตกต่างกันภายในสายพันธุ์มะเขือเทศ (Stahl และ Sies, 1996) ขณะที่เบต้าแครอทีน พบมากในมะเขือเทศผลสีส้มและแครอท เบต้าแครอทีน เป็นแหล่งของสารตั้งต้นในการสังเคราะห์วิตามินเอ ซึ่งเป็นสารสำคัญที่ช่วยในการมองเห็น (Zhang และ Stommel, 2000) เป็นสารต้านอนุมูลอิสระและช่วยลดความเจ็บป่วยจากโรคต่างๆ (Stommel, 2005) ทำให้ตลาดมะเขือเทศสำหรับผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับอาหารสุขภาพ เพิ่มมากขึ้น

จากบันทึกช่วยจำในการประชุมสัมมนาสรุปความก้าวหน้าและทิศทางงานวิจัยกลุ่มคลัสเตอร์มะเขือเทศของไทย จำกปัญหาที่พบและมีผู้เสนอแนวทางแก้ปัญหาในประเด็นเรื่องพันธุ์ ได้แก่ การพัฒนาพันธุ์มะเขือเทศที่ทนทานต่อสภาพอากาศร้อนจะช่วยปัญหารือ่องคุณภาพผลผลิต การใช้พันธุ์มะเขือเทศที่พัฒนาพันธุ์ในประเทศไทย มาส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเพื่อป้อนโรงงานอุตสาหกรรม จะช่วยลดปัญหารือ่องปริมาณผลผลิต ตกต่ำได้ พันธุ์มะเขือเทศครัวมีใบมาก หรือใบไม่ถูกทำลาย จะช่วยในเรื่องการสร้างรงคงคตุสีแดง และเพิ่มปริมาณสารไลโคปีนได้ และการออกพันธุ์ใหม่ ควรมีความชัดเจนในเรื่องของการใช้ประโยชน์โดยแยกเป็นพันธุ์เพื่อบริโภคสด และเพื่ออุตสาหกรรม ประเด็นในเรื่องโรค ได้แก่ โรคที่สำคัญที่เครื่องข่ายต้องให้พันธุ์มะเขือเทศมีความต้านทาน ได้แก่ โรคเหี่ยวน้ำ (Bacterial wilt) โรคเหี่ยวนเหลือง (Fusarium wilt) และโรคใบหจิกเหลือง จากไวรัส (TYLCV) และการประเมินความต้านทานโรค ต้องมีการประเมินในหลายๆ พื้นที่เพื่อยืนยันความต้านทานโรค ประเด็นในเรื่องเทคโนโลยีการผลิต การจัดการ ได้แก่ พัฒนาพันธุ์ที่สามารถนำมาเป็น root stock ที่ดีเป็นแนวทางที่สามารถแก้ไขปัญหารोคเหี่ยวน้ำในมะเขือเทศได้ดีอีกด้วย ทำการวิจัยเพื่อหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการผลิตมะเขือเทศ จะเป็นแนวทางการแก้ปัญหาด้านปริมาณผลผลิตที่ลดลงได้ ประเด็นในเรื่องแนวโน้มในอนาคตเรื่องการตลาดมะเขือเทศถึงความเป็นไปได้ของตลาดมะเขือเทศรับประทานสดผลเด็กที่จะขยายตัวจาก Premium market ออกสู่ Fresh market นอกจานนี้ยังได้เสนอข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์สำหรับประเด็นวิจัยของเครือข่ายมะเขือเทศ ได้แก่ สภาพอากาศปัจจุบันส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพผลผลิตมะเขือเทศทั้งด้านสีที่จางลง ผลผลิตต่ำ ค่าความหวานลดลง อายุการสุกแก่ที่สั้นลง จนเกิดปัญหาในเรื่องความคงของเมล็ดที่ลดลงตามไปด้วย

การปรับปรุงพันธุ์เป็นวิธีการที่สำคัญที่สุดที่ทำให้ได้ลูกผสมที่มีคุณภาพดี ให้ผลผลิตสูง โดยขั้นตอนในการปรับปรุงพันธุ์นั้นจำเป็นต้องมีการพัฒนาสายพันธุ์แท้ การประเมินคุณค่าของสายพันธุ์แท้ และการทดสอบคุณสมบัติโดยสายพันธุ์แท้ที่เหมาะสมในการนำมาเป็นเชื้อพันธุ์กรรมมนัญญา มีพื้นฐานทางพันธุกรรมที่แตกต่างกันและมีความหลากหลาย ซึ่งอาจจะยังขาดลักษณะที่จำเป็นต่อทางการเกษตร เช่น การให้ผลผลิตที่สม่ำเสมอ การต้านทานการหักล้ม การต้านทานโรคและแมลง การมีความสามารถในการผสมที่ดี เป็นต้น การสำรวจรวมและจำแนกเชื้อพันธุ์กรรมของมะเขือเทศ และการทดสอบสมรรถนะความสามารถในการรวมตัว “Combining ability” จึงมีความจำเป็นและเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการปรับปรุงพันธุ์ต่อไป

## 7. วิธีการดำเนินการ

### ขั้นตอนและวิธีการวิจัย

ดำเนินการสำรวจและเก็บเมล็ดมะเขือเทศในพื้นที่ ภาคตะวันตก ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยสัมภาษณ์และคัดเลือกต้นมะเขือเทศที่เป็นพันธุ์พื้นเมืองและพันธุ์การค้าที่เกษตรกรปลูกซ้ำๆ ในพื้นที่เดิมหลายปี ทำการสำรวจตั้งแต่ ตุลาคม 2554 – กุมภาพันธ์ 2555 นำมาปลูกทดสอบในสภาพแเปลงนและโรงเรือน ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ปลูกเบอร์ลั่ง 10 ต้น ทำการเพาะมะเขือเทศแต่ละสายพันธุ์ในระบบเพาะเมล็ดที่มีส่วนผสมของดิน ปุ๋ยอินทรีย์ และชีวภาพแล้วปลูกในถุงพลาสติก ขนาด  $4 \times 6$  นิ้ว โดยมีอัตราส่วนผสมของดิน ปุ๋ยอินทรีย์ และชีวภาพ 2 : 1 : 1 ตามลำดับ หลังจากนั้นประมาณ 3 สัปดาห์ จึงย้ายลงปลูกในแปลง โดยมีระยะปลูก  $0.5 \times 1.0$  เมตร (ต้น x แถว) แปลงปลูกกว่าวนปูนขาว อัตรา 250 กก./ไร่ ปุ๋ยอินทรีย์ อัตรา 4 ตัน/ไร่ ปุ๋ยเคมีรองกันหลุมสูตร 15-15-15 อัตรา 30 กก./ไร่ หลังจากนั้นใส่ปุ๋ยเคมีสูตรเดิมหลังปลูก 15-20 วัน และใส่ปุ๋ยสูตร 12-24-12 อัตรา 30 กก./ไร่ ทุก 15 วัน และปุ๋ยสูตร 13-13-21 อัตรา 30 กก./ไร่ เมื่อผลเจริญเติบโตเต็มที่และใกล้เปลี่ยนสี ทำการบันทึกข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่

#### ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมพันธุ์มะเขือเทศจากแหล่งปลูกต่างๆ (ดำเนินการในปี 2555-2556)

- 1) รวบรวมมะเขือเทศทั้งพันธุ์ผลเล็กและผลใหญ่จากแหล่งปลูกในภาคต่างๆ ของประเทศไทย
- 2) ปลูกมะเขือเทศพันธุ์ต่าง ๆ ที่รวบรวมในแปลงทดลอง ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ทำการผสมตัวเอง (selfing) เพื่อให้ได้พันธุ์แท้ และบันทึกข้อมูลตามแผนการทดลอง

#### ขั้นตอนที่ 2 ทดสอบสมรรถนะการรวมตัวเฉพาะ (SCA) (ดำเนินการในปี 2557)

- 1) ปลูกมะเขือเทศเพื่อทำการศึกษาสมรรถนะการรวมตัวเฉพาะ (SCA) ของมะเขือเทศ โดยทำการศึกษาลักษณะผลผลิต องค์ประกอบผลผลิต และลักษณะทางการเกษตรของคุณภาพ เพื่อทำการคัดเลือกพันธุ์ที่มีศักยภาพ นำข้อมูลที่ได้ใช้พิจารณาคัดเลือกพันธุ์พ่อ-แม่ในการผลิตมะเขือเทศพันธุ์ลูกผสมต่อไป การบันทึกข้อมูล

หลังจากปลูกมะเขือเทศในแปลงเบอร์ลั่ง 10 ต้น และผสมตัวเองไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง และมะเขือเทศแสดงลักษณะทางสัณฐานวิทยาเหมือนกันทั้ง 10 ต้น จึงทำการบันทึกข้อมูล ได้แก่

1. ลักษณะประจำพันธุ์ตามแบบฟอร์ม (เอกสารนวากที่ 1) ที่ปรับปรุงตาม การบันทึกลักษณะทางพฤกษศาสตร์ตามแบบของ International Plant Genetic Resources Institute (IPGRI) ที่บรรยายลักษณะของมะเขือเทศ (*Lycopersicon spp.*) และรายละเอียดในการตรวจสอบลักษณะของพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียน เป็นพันธุ์พืชใหม่ตามชนิดพืชที่ได้ประกาศให้เป็นพันธุ์พืชใหม่ที่จะได้รับการคุ้มครองตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ชนิดพืชมะเขือเทศ (*Lycopersicon esculentum L.*)

2. ลักษณะทางการเกษตร คือ ความสูงต้น ความกว้างทรงพุ่ม วันเริ่มสร้างปุ่มตذاอก วันดอกแรกบาน และวันดอกบาน 50 เปอร์เซ็นต์

3. ลักษณะผลผลิต ได้แก่ จำนวนช่องต่อตัน จำนวนผลต่อช่อง จำนวนผลต่อตัน น้ำหนักต่อผล และน้ำหนักผลต่อตัน

4. ลักษณะคุณภาพผลผลิต ได้แก่ ความหนาเนื้อ ความตึงผิวของเปลือกผล จำนวนช่องว่างภายในผล และค่า TSS

5. บันทึกการทนทานต่อโรค แมลง และการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อม ของเออร์ที่แสดงลักษณะดีเด่น

**เกณฑ์ในการคัดเลือกมะเขือเทศกลุ่มเชอร์รี่และกลุ่มแพรรูป**

**มะเขือเทศกลุ่มเชอร์รี่**

- ผลผลิตมากกว่า 2 กิโลกรัม/ตัน การเจริญเติบโตทางลำต้นดี ทนทานโรค ทั้งการปลูกในถุงหูยาวและถุงดูดผ่าน
- ผลมีขนาดเล็ก น้ำหนัก 12-15 กรัมต่อผล ก้านช่อผลยาว ติดลูกสม่ำเสมอห้องช่อง
- ความตึงผิวของเปลือกมากกว่า  $0.30 \text{ kg/m}^2$
- ค่า TSS มากกว่า  $8^\circ\text{brix}$  (การสำรวจจากเอกสารผู้รับซื้อ 2555)
- ข้อผลเล็ก
- สีผลสม่ำเสมอ

**มะเขือเทศกลุ่มแพรรูป**

- ผลผลิตสูง มากกว่า 3 กิโลกรัม/ตัน เจริญเติบโตดี ทนทานโรค เหมาะสมทั้งการปลูกในถุงหูยาวและถุงดูดผ่าน
- ผลมีน้ำหนักมากกว่า 40 กรัมต่อผล
- รูปร่างผลเป็นไปตามมาตรฐานมะเขือเทศเพื่อการอุตสาหกรรม เน้น ผิวเรียบ ไม่มีร่อง ไม่มีหลุมเยี้ยว
- ความตึงผิวของเปลือกมากกว่า  $0.40 \text{ kg/m}^2$  และเปลือกไม่เป็นกาเกเหนียว
- ค่า TSS มากกว่า  $4^\circ\text{brix}$
- ข้อผลเล็ก หลุดง่าย สีผลสวยงาม สีเข้ม รสชาติดี

ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น ตุลาคม 2554 สิ้นสุด กันยายน 2557

สถานที่ดำเนินการ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ

**8. ผลการทดลองและวิจารณ์**

**ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมพันธุ์มะเขือเทศจากแหล่งปลูกต่างๆ และประเมินคัดเลือกเบอร์ที่มีคักษภาพ (ดำเนินการในปี 2555-2556)**

จากการสำรวจและเก็บเมล็ดมะเขือเทศเดือนตุลาคม 2554 – กุมภาพันธ์ 2555 สามารถรวบรวมได้ 501 เบอร์ มีการปลูกทดสอบและคัดเลือก 9 ครั้ง คือ

ตุลาคม 2554 – กุมภาพันธ์ 2555 สำรวจ รวบรวมมะเขือเทศจากแหล่งต่างๆ

พฤษจิกายน 2554	ปลูกในแปลงและผสมตัวเอง	ครั้งที่ 1
มิถุนายน 2555	ปลูกในโรงเรือนและผสมตัวเอง	ครั้งที่ 2
พฤษจิกายน 2555	ปลูกในแปลงและผสมตัวเอง	ครั้งที่ 3
มิถุนายน 2556	ปลูกในโรงเรือนและผสมตัวเอง	ครั้งที่ 4
พฤษจิกายน 2556	ปลูกในแปลงและผสมตัวเอง	ครั้งที่ 5
	ปลูกทดสอบสมรรถนะการรวมตัวเฉพาะ (SCA)	ครั้งที่ 1
มิถุนายน 2557	ปลูกในโรงเรือนและผสมตัวเอง	ครั้งที่ 6
	ปลูกทดสอบสมรรถนะการรวมตัวเฉพาะ (SCA)	ครั้งที่ 2
พฤษจิกายน 2557	ปลูกในแปลงและผสมตัวเอง	ครั้งที่ 7
	จำนวน 82 เบอร์ ซึ่งยังไม่นิ่งและมีลักษณะดี (สีน้ำตาลเข้ม)	(สีน้ำตาลเข้ม)

โดยการปลูกทดสอบและผสมตัวเองในสภาพแปลงจะทำการปลูกช่วงฤดูหนาวเดือนพฤษจิกายน ซึ่งเป็นช่วงฤดูปกติของการปลูกมะเขือเทศในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ และปลูกในโรงเรือนช่วงฤดูฝนเดือนมิถุนายน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายจากการโดนน้ำท่วมซึ่งในแปลงเพื่อให้สามารถทำการผสมดอกได้จำนวน 2 ครั้งต่อปี

การรวบรวมเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศจากพื้นที่แปลงเกษตรกรและชาวบ้านภาคตะวันตก ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย จากแปลงรวบรวมพันธุ์ของเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ จากมหาวิทยาลัยที่มีการทดลองด้านพันธุ์ของมะเขือเทศ และเมล็ดพันธุ์การค้าจากต่างประเทศ มารวบรวมและปลูกเปรียบเทียบจำนวน 501 เบอร์ ในเดือนพฤษจิกายน 2554 และคัดเลือกต้นที่มีลักษณะดีทั้งทางด้านสัณฐานวิทยาและลักษณะทางการเกษตร ทำการผสมตัวเอง (selfing) เพื่อให้ได้สายพันธุ์แท้ทุกครั้งที่ปลูก จนถึงการผสมตัวเองรุ่นที่ 6 เดือนปีกันยายน 2557 สามารถคัดเบอร์ที่มีคุณภาพทางการเกษตรและมีความหลากหลายได้ 162 เบอร์ ตามเกณฑ์การคัดเลือกของกลุ่มต่างๆ (ตารางผนวกที่ 1) ครอบคลุมการใช้งานของมะเขือเทศ 5 กลุ่มหลักที่สำคัญ คือ 1) กลุ่มมะเขือเทศเชอร์รี่ 2) กลุ่มมะเขือเทศสีดา 3) กลุ่มมะเขือเทศปรรูป (โรงงาน) 4) กลุ่มรับประทานสดผลใหญ่ มีน้ำหนักต่อผลมากกว่า 40 กรัม และ 5) กลุ่มมะเขือเทศที่เหมาะสมใช้เป็นต้นตอ นอกจากนี้ยังมีมะเขือเทศอีก 82 เบอร์ ที่มีแนวโน้มแสดงลักษณะข้างต้นที่ดี แต่ยังไม่เป็นสายพันธุ์แท้จำเป็นต้องทำการผสมตัวเองและคัดเลือกในสภาพแปลงต่อไปเพื่อเก็บเชื้อพันธุกรรมมะเขือเทศที่ดีเหล่านี้ไว้

### การจัดกลุ่มมะเขือเทศตามการใช้ประโยชน์

จัดกลุ่มมะเขือเทศแต่ละชนิดตามการใช้ประโยชน์ของผลและต้น ได้เป็น 5 กลุ่ม และมีเบอร์มะเขือเทศที่คัดเลือก ดังนี้

#### 1. กลุ่มเชอร์รี่

มะเขือเทศกลุ่มผลเล็กที่มีน้ำหนักผลอยู่ในช่วง 12 - 15 กรัม สามารถรับประทานได้่าย เป็นกลุ่มที่มีลักษณะเด่นคือ ขนาดผลเล็ก น้ำหนักต่อผลน้อย รสชาติหวาน หอม มีค่า TSS มากกว่า 8 °Brix ก้านช่อออกต้องยาวและติดผล紧密 รูปร่างผลมีหลายแบบ ได้แก่ แบน กลม รี รูปไข่ รูปไข่กลับ และรูปแพร์ และมีสีสันเมื่อสุก หลากหลาย ได้แก่ แดง ชมพู ส้ม เหลือง ม่วง ส่วนมากจะมีกลิ่นหอม มีการเจริญเติบโตทางลำต้นแบบ

ทอตเลือย มีข้อของซ่อดอกเว้นกับข้อใบพุกๆ 3 ข้อ และมีส่วนน้อยที่มีการเจริญเติบโตแบบกึ่งทอตเลือย มีข้อของซ่อดอกเว้นกับข้อใบพุกๆ 2 ข้อ สามารถคัดเลือกตันที่มีลักษณะด้านสัณฐานวิทยาและการเกษตรที่ดีได้จำนวน 72 เบอร์ คือ #002-6, #006-1, #007, #009-10, #011-1-5, #015-2-9, #022, #035, #036-8, #036-10, #040-10, #041, #046, #048-1, #050-9, #051-2-5, #052-1-2-5, #051-3, #068-1-3, #074, #081, #083, #084, #088-3, #142, #171-3, #171-5, #172-20, #173-10, #173-13, #181-1-2, #181-2-2, #186, #194, #198-7, #202, #262, #281-1, #296, #300, #303, #318, #325-1, #328, #329, #331-1, #332, #333, #334-1, #336, #339-2, #340, #343-1, #343-2, #344, #346, #347-2, #348, #350, #351, #352-3, #357-1, #357-2, #361-1, #362-1, #363-1, #366-2, #371-2, #374, #381, #399 และ #448

## 2. กลุ่มสีดา

มะเขือเทศกลุ่มผลเล็กที่มีน้ำหนักผลมากกว่า 20 กรัม แต่มีลักษณะที่แยกออกจากกลุ่มเชอร์รี่ด้านรสชาติที่เปรี้ยว มีปริมาณกรดสูง และมีค่า TSS ไม่เกิน 4 °brix ผลเมื่อสุกมีสีชมพูถึงชมพูเข้ม รูปร่างผลทรงรี รูปไข่ และรูปแพร์ มะเขือเทศกลุ่มสีดาเป็นการใช้ประโยชน์เฉพาะกลุ่มแต่ปริมาณบริโภคสูงและมีราคาแพง ในช่วงเวลาที่ขาดแคลนมะเขือเทศกลุ่มสีดาแม่ค้าจะหันมาใช้กลุ่มแพรรูปแทน แต่ก็ไม่ได้รับความนิยมมากนัก สามารถคัดเลือกตันที่มีลักษณะด้านสัณฐานวิทยาและการเกษตรที่ดีได้ จำนวน 10 เบอร์ คือ #099-1-1, #102-1, #165-6, #166-1-4, #169-1-4, #183, #277, #297-1, #297-2 และ #298

## 3. กลุ่มรับประทานสด ผลใหญ่

มะเขือเทศกลุ่มผลใหญ่ที่มีน้ำหนักผลมากกว่า 40 กรัม และอาจสูงถึง 400 กรัม เนื่องจากเป็นผลที่มีขนาดใหญ่การใช้ประกอบอาหารจึงหลากหลายตั้งแต่การนำมาต้มเป็นผักของมะเขือเทศรูปร่างผลจีบแบบฟักทองที่มีรสเปรี้ยว จนถึงการผ่าเป็นแผ่นบางๆ วางเคียงกับเนื้อหรือไข่ปิ้ง มะเขือเทศกลุ่มนี้มักจะมีแกนกลางใหญ่และหักเป็นหลายแฉก มีปริมาณเนื้อมาก น้ำในผลมาก แต่เปลือกผลบางช้าได้ง่าย ผู้บริโภคต้องการค่า TSS มากกว่า 4 °brix รูปร่างผลมีหลายแบบ ได้แก่ ผลจีบแบบฟักทอง แบบ แป่น กลม รี และรูปไข่ และมีสีสันเมื่อสุกหลากหลาย ได้แก่ แดง ชมพู ส้ม เหลือง ม่วง เขียว สามารถคัดเลือกตันที่มีลักษณะด้านสัณฐานวิทยาและการเกษตรที่ดีได้ จำนวน 55 เบอร์ คือ #001, #003, #004, #005, #010, #012-2, #013, #014-1-4, #015-3-9, #017-1, #017-2, #018-10, #019, #020-1, #020-5, #025, #026-1-5, #026-2, #028, #029-4, #030, #031-6, #042, #176, #199-7, #200-1, #203, #263, #281-2, #302, #310, #322, #324-1, #324-2, #337, #338, #341, #353, #354, #356, #360, #369, #370-2, #372, #373, #383-1, #383-2, #384-1, #385, #386, #388-2, #389, #393-1, #394-1 และ #379

## 4. กลุ่มแปรรูป (โรงงาน)

มะเขือเทศกลุ่มผลใหญ่ที่มีน้ำหนักผลมากกว่า 40 กรัม รูปร่างผลส่วนมากรูปร่างรี หรือรีค่อนข้างกลม ผลสุกมีสีแดงหรือชมพูเข้ม ลักษณะที่เป็นที่ต้องการของตลาด คือ ผลแข็ง ปลายผลไม่แหลมหรือมีติ่ง ความตึงบริเวณกลางผลมากกว่า 0.40 กก./ $m^2$  ค่า TSS มากกว่า 4 °brix มีจำนวนช่องว่างภายในผลไม่เกิน 4 ช่อง กลีบเลี้ยงและขั้วผลมีขนาดใหญ่ หลุดได้ง่าย และผลสุกสมำเสมอพร้อมกันทั้งตันเพื่อให้เก็บเกี่ยวได้ง่าย สามารถคัดเลือกตันที่มีลักษณะด้านสัณฐานวิทยาและการเกษตรที่ดีได้ จำนวน 25 เบอร์ คือ #033-6-1, #033-6-2,

#034, #036-1-3, #038-2-2-4, #043-6, #044-2, #044-10, #045-6, #088-1, #089, #090-1-4, #094, #150, #177, #185, #364, #365-1, #398, #402, #403, #409, #413, #414 และ #415

## 5. กลุ่มต้นตอ

มะเขือเทศกลุ่มนี้พิจารณาจากการเจริญเติบโตและความทนทานต่อโรค แมลงและสภาพแวดล้อม ช่วงเวลาต่างๆ เป็นหลัก เพื่อใช้เป็นเชื้อพันธุกรรมของต้นมะเขือเทศที่ใช้พิจารณาคัดเลือกเป็นต้นตอสำหรับ เสียบยอดมะเขือเทศพันธุ์ดี เกณฑ์ที่ใช้พิจารณาในการคัดเลือกเป็นต้นตอ คือ ลำต้น嫩อใบเลี้ยงมีขนาดใหญ่ การเจริญเติบโตดี เป็นกลุ่มที่มีการเจริญเติบโตแบบทอดเลือยหรือกึงทอดเลือย การที่ผลสุกแสดงอาการ cracking และเยือกหุ้มเมล็ดมีสีเขียวมักจะสัมพันธ์กับการทนทานกับโรคไวรัสใบหักเหลือง หรือมีปืนต้านทาน TYLCV สามารถคัดเลือกต้นที่มีลักษณะด้านสัณฐานวิทยาที่ดีได้ จำนวน 19 เบอร์ คือ #010, #013, #014-1-4, #015-2-1, #043-6, #142, #171-4, #171-5, #202, #296, #300, #333, #340, #357-1, #376-2, #401, #432, #439 และ #441

พันธุ์มะเขือเทศที่ไม่มีรอยต่อขั้วผล (jointless) และมีขั้วผลหนึ่นียว

เป็นลักษณะของพันธุกรรมที่เป็นที่ต้องการในการปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศกลุ่มผลิตเพื่ออุตสาหกรรม และเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องจักร เนื่องจากการที่ข้าวผลรวมทั้งกลีบเลี้ยงไม่ติดมากับผลขณะเก็บเกี่ยวจะช่วยลด ขันตอนและแรงงานในการคัดแยกและปลิดข้าวผลออก ซึ่งสามารถร่วบรวมและคัดเลือกกลุ่มที่ไม่มีรอยต่อข้าว ผลได้ 7 เบอร์ เป็นมะเขือเทศกลุ่มเซอร์รี่ 1 เบอร์ คือ #362-2 และกลุ่มแปรรูป 6 เบอร์ คือ #038-1-1, #038-2-2-4, #177, #179-2, #199-7, #201-1 และ #365-2 กลุ่มที่มีข้าวผลเนียนยวไม่หลุดติดมากับผลที่ปลิดได้ 6 เบอร์ เป็นมะเขือเทศกลุ่มเซอร์รี่ 3 เบอร์ คือ #048-10, #083 และ #355-2 และกลุ่มแปรรูป 3 เบอร์ คือ #045-6, #094 และ #201-1

พันธุ์มะเขือเทศที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพที่มีอุณหภูมิอากาศสูง

การคัดเลือกมະเขือเทศกลุ่มที่มีความทันทนาต่อสภาพอุณหภูมิอากาศสูงมากกว่า 35 องศาเซลเซียส ต่อวัน เป็นที่สนใจของนักปรับปรุงพันธุ์มະเขือเทศทั้งชาวไทยและต่างประเทศมานาน จิตจำนงเคยศึกษาความมีชีวิตของลักษณะเกษตรพืชผักของมະเขือเทศพันธุ์ที่นิยมปลูกในประเทศไทยในช่วงที่มีอากาศร้อน ในปี 2520 พบร่วมกับพันธุ์มະเขือเทศที่ลักษณะเกษตรพืชผักมีชีวิตดีที่สุด คือ กลุ่มสีดา ซึ่งสอดคล้องกับการบันทึกข้อมูลในแปลงที่กลุ่มสีดา สามารถให้ผลผลิตได้ดีมากกว่ากลุ่มอื่นๆ แต่ทั้งนี้ผลกระทบของมະเขือเทศที่โดนแสงแดดจัดตลอดทั้งวันก็มีแนวโน้มที่สีจะซีดจางกว่าผลที่อยู่ภายใต้เงา ดังนั้นแนวทางการคัดเลือกพันธุ์มະเขือเทศกลุ่มสีดาเพื่อการปลูกในสภาพอากาศร้อนนองจากต้องการผลผลิตต่อต้นมากแล้ว ยังจำเป็นต้องเลือกเบอร์ที่ยังมีการไว้ใบในช่วงที่ผลกำลังสุกมากกว่าเบอร์อื่นๆ เนื่องจาก โดยธรรมชาติแล้วมະเขือเทศกลุ่มสีดาและกลุ่มแปรรูป (โรงงาน) ส่วนใหญ่จดอยู่ในการเจริญแบบไม่ทอดยอด ส่งผลให้การเจริญเติบโตทางลำต้นหยุดในช่วงที่ให้ผลผลิตและสารอาหารจากใบจะเคลื่อนย้ายมาที่ผลจนหมด ทำให้ใบเที่ยวเหลือพื้นที่ใบน้อย แสงแดดสามารถส่องผ่านเข้ามาสัมผัสถกับเปลือกผลทำให้สีซีดได้ง่าย

Aref A. and Abdul-Baki (1991) พบว่า การมีอุณหภูมิสูงจะชักนำให้ดอกร่วง เปอร์เซ็นต์การติดผลน้อย และการพัฒนาของผลไม่สมบูรณ์ และพบว่าพันธุ์หนร้อนและพันธุ์ไม่นร้อนมีเปอร์เซ็นต์การติดผล 70 และ 30 เปอร์เซ็นต์ และผลผลิตต่างกันมากถึง 410 และ 11 กรัมต่อต้น ตามลำดับ อีกทั้งแนะนำว่าลักษณะที่เหมาะสมในการใช้คัดเลือกระดับการหนร้อนของพันธุ์มะเขือเทศ ได้แก่ ลักษณะความสมบูรณ์ของดอก การบานของดอก การติดผล ผลผลิต คุณภาพผลผลิต และคุณภาพของเมล็ด (%การงอก) ซึ่งสอดคล้องกับ Hanna, H.Y. and T.F. Hernandez (1982) และ Berry, S.Z. and M.R. Uddin (1988) ได้คัดเลือกพันธุ์มะเขือเทศหนร้อนโดยพิจารณาการจากการบานของดอกและการติดผลเป็นหลัก เพราะกระบวนการการทั้งสองนี้จะมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเป็นอันดับแรกและมีความสัมพันธ์โดยตรงต่อการพัฒนาของผลและการให้ผลผลิต ซึ่งได้ปรับปรุงแบบบันทึกข้อมูล (ตารางผนวกที่ 1) ให้มีลักษณะที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกเหล่านี้อยู่ด้วยแล้ว สามารถคัดเลือกมะเขือเทศที่ให้ผลผลิตได้ดีในการปลูกสภาพแปลง จำนวน 30 เบอร์ คือ #002-6, #018-3, #022, #036-10, #037-9, #039-2, #046, #050-9, #068-1-3, #083, #303, #331-1, #332, #344, #347, #355-1, #359-2, #362-1, #362-2, #366-2, #387-1, #387-2, #396, #397, #047, #389, #102-1, #111-1, #164-1-4 และ #298 และการปลูกในโรงเรือนที่มุ่งด้วยหลังคาใส และตาก่ายในล่อนสีขาวจะมีอุณหภูมิอากาศสูงกว่าภายนอกโรงเรือน 4 – 6 องศาเซลเซียส และมีแสงสว่างน้อยกว่าส่องให้ต้นมะเขือเทศมีปล้องยืดยาวกว่าเดิมทุกเบอร์ และมะเขือเทศบางเบอร์ไม่สามารถสร้างช่อดอกได้ หรือมีจำนวนดอกต่อช่อมากแต่เปอร์เซ็นต์การติดผลน้อย ในขณะที่บางเบอร์ก็ยังมีการสร้างช่อดอกและติดผลได้ดี จึงทำการคัดเลือกเบอร์ที่มีศักยภาพการปลูกในสภาพโรงเรือนที่ดี ได้จำนวน 25 เบอร์ คือ #002-6-1, #036-8, #045-6, #051-2-5, #083, #277, #297-1, #297-2, #302, #325, #328, #331-1, #332, #339-1, #344, #369, #374, #386, #387-2, #402, #403, #413, #449, #452 และ #455

## ขั้นตอนที่ 2 ทดสอบสมรรถนะการรวมตัวเฉพาะ (SCA) (ดำเนินการในปี 2557)

จากการประเมินคัดเลือกมะเขือเทศต้นที่มีลักษณะทางการเกษตรที่ดี และมีลักษณะเด่นที่เหมาะสม บางประการได้คัดเลือกมะเขือเทศสำหรับใช้เป็นพ่อ-แม่พันธุ์ จำนวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเชอร์รี่และกลุ่มแพรรูป (โรงงาน) เพื่อสร้างลูกผสมใหม่สำหรับแนะนำเกษตรกรต่อไป 1) กลุ่มเชอร์รี่มี 7 เบอร์ ได้แก่ #002-6, #036-8, #041, #186, #362-1, #396 และ #448 ทำการผสมแบบพักกันหมด และคัดเลือกลูกผสมที่มีลักษณะดี 5 คู่ คือ #036-8 x #041, #036-8 x #396, #186 x #002-6, #362-1 x #041 และ #448 x #041 2) กลุ่มแพรรูป (โรงงาน) มี 8 เบอร์ ได้แก่ #017-1, #033-6-2, #045, #045-6, #398, #402, #403 และ #409 ทำการผสมแบบพักกันหมด และคัดเลือกลูกผสมที่มีลักษณะดี 5 คู่ผสม คือ #045 x #017-1, #045-6 x #033-6-2, #398 x #409, #402 x #398 และ #402 x #403 ซึ่งลูกผสมที่ได้จากการประเมินภายในแปลงทดลองศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ปี 2557 นี้จะนำไปทดสอบอีกแห่งที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนมในฤดูหนาวและฤดูฝน ปี 2558

## 9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ

## สรุปผลการทดลอง

จากการรวบรวมเม็ดพันธุ์มะเขือเทศจำนวน 501 เบอร์ ทำการปลูกทดสอบ แบ่งกลุ่มและคัดเลือกเบอร์ที่มีลักษณะดีเด่นทั้งด้านสัณฐานวิทยาและลักษณะทางการเกษตรพร้อมจัดทำข้อมูลลักษณะประจำพันธุ์ เพื่อใช้เป็นแหล่งพันธุกรรมในการปรับปรุงพันธุ์ต่อไป โดยสามารถผสมตัวเองเพื่อให้ได้สายพันธุ์แท้จำนวน 6 ครั้ง คัดเลือกได้ 162 เบอร์ จัดแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม คือ กลุ่มเชอร์รี่ 72 เบอร์ กลุ่มสีดา 10 เบอร์ กลุ่มรับประทานสดผลใหญ่ 55 เบอร์ กลุ่มแปรรูป (โรงงาน) 25 เบอร์ และกลุ่มต้นตอซึ่งไม่ได้แยกตามการใช้ประโยชน์แบบอื่น 19 เบอร์ จัดแบ่งพันธุ์มะเขือเทศที่ไม่มีรอยต่อขั้วผลและขั้วผลหนีบเพื่อใช้เป็นพันธุกรรมในการปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศอุตสาหกรรมได้ 13 เบอร์ นอกจากนี้ได้คัดเลือกพันธุ์มะเขือเทศที่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้ดีในช่วงที่มีอุณหภูมิอากาศสูง (ฤดูแล้ง) ของการปลูกในแปลงได้ 30 เบอร์ และการปลูกในโรงเรือนได้ 25 เบอร์

สามารถประเมินคัดเลือกมะเขือเทศเพื่อใช้เป็นพ่อ-แม่พันธุ์ในการสร้างลูกผสม โดยวิธีการทดสอบสมรรถนะการรวมตัวเฉพาะ (SCA) ของลูกผสมได้จำนวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเชอร์รี่มีพ่อ-แม่เป็นคู่ผสม 7 เบอร์ สามารถคัดเลือกลูกผสมที่มีลักษณะดี 5 คู่ คือ #036-8 x #041, #036-8 x #396, #186 x #002-6, #362-1 x #041 และ #448 x #041 และกลุ่มแปรรูป (โรงงาน) มีพ่อ-แม่เป็นคู่ผสม 8 เบอร์ สามารถคัดเลือกลูกผสมที่มีลักษณะดี 5 คู่ผสม คือ #045 x #017-1, #045-6 x #033-6-2, #398 x #409, #402 x #398 และ #402 x #403

## ข้อเสนอแนะ

เม็ดมะเขือเทศแต่ละเบอร์ที่คัดเลือกไว้ต้องมีการปลูกใหม่เพื่อรักษาพันธุ์ทุก 3-4 ปี ควบคู่กับการส่งเม็ดพันธุ์ไปเก็บไว้ที่ธนาคารเม็ดพันธุ์ และการทดลองที่ใช้เวลาเพียง 2 ปี ทำให้ยังมีมะเขือเทศอีก 82 เบอร์ที่ยังไม่เป็นสายพันธุ์แท้และยังไม่ได้บันทึกลักษณะประจำพันธุ์ควรทำการปลูกและคัดเลือกต่อ เนื่องจากได้ทำการคัดเลือกและผสมตัวเอง (selfing) มาแล้ว 4 – 6 ครั้ง และมีแนวโน้มที่จะได้ลักษณะพันธุกรรมที่หลากหลายเพิ่มเติม

## 10. การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ได้เม็ดพันธุ์มะเขือเทศทั้งพันธุ์ผลเล็กและผลใหญ่ที่มีข้อมูลลักษณะประจำพันธุ์และลักษณะทางการเกษตรที่ดีเด่น เพื่อใช้เป็นแหล่งซื้อพันธุกรรมสำหรับคัดเลือกพันธุ์พ่อ-แม่ ในการผลิตมะเขือเทศพันธุ์ลูกผสม และใช้เป็นต้นตอ

## 11. เอกสารอ้างอิง

กรุง สีตตะธนี. 2553. การปลูกมะเขือเทศในฤดูกาลต่างๆ. [http://www.rdi.kps.ku.ac.th/tvrc/public/public2\\_tomato.pdf](http://www.rdi.kps.ku.ac.th/tvrc/public/public2_tomato.pdf) [16 มีนาคม 2552]

จิตจำنج ทุมแสน. 2520. การศึกษาพันธุ์มะเขือเทศที่เหมาะสมต่อการปลูกในฤดูร้อนของประเทศไทย.

วิทยานิพนธ์ปริญญาโท. ภาควิชาพืชสวน. กรุงเทพฯ.

นิรนาม. 2553. บันทึกช่วยจำในการประชุมสัมมนาสรุปความก้าวหน้าและทิศทางงานวิจัยกลุ่มคลัสเตอร์มะเขือเทศของไทย. มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 4 หน้า

เบลเยียม เจริญพานิช สุนทร เนตรศิริ สรุษพงษ์ รัตนโกศล งามตา วรรธนะวาสิน และอนันต์ ปัญญา เพิ่ม. 2532. การเปรียบเทียบมะเขือเทศบริโภคสดสำหรับถูกผู้คนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รายงานผลงานวิจัยประจำปี 2532 ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ. หน้า 369-382.

เบลเยียม เจริญพานิช พันธุ์ศักดิ์ แก่นหอม และจิรภา พุทธิวงศ์. 2537. การเปรียบเทียบพันธุ์มะเขือเทศลูกผสมชั้วที่ 6 สำหรับปลูกในถูกผู้คน รายงานผลงานวิจัยประจำปี 2537 ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ. หน้า 153-164.

วันเพ็ญ. 2553. การคัดเลือกและประเมินพันธุ์มะเขือเทศต้านทานไวน้ำสีบงกเหลือง. เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาสรุปความก้าวหน้าและทิศทางงานวิจัยกลุ่มคลัสเตอร์มะเขือเทศไทย. มหาวิทยาลัยขอนแก่น. หน้า 2

อุดม คำชา และวิฐุร์ย์ หนองสูง. 2548-2549. การเปรียบเทียบพันธุ์มะเขือเทศรับประทานสดผลเล็กทันทานโรคเที่ยวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย *Ralstonia solanacearum* รายงานผลงานวิจัยประจำปี 2548-2549 ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ. หน้า 139-151.

Aref A. Abdul-Baki. 1991. Tolerance of Tomato Cultivars and Selected Germplasm to Heat Stress. JASHS November 1991 vol. 116(6). 1113-1116.

Bar-Tsur, A., J. Rudich, and B. Bravdo. 1985. High temperature effectson CO<sup>2</sup> gas exchange in heat-tolerant and sensitive tomatoes. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 110:582-586.

Berry, S.Z. and M.R. Uddin. 1988. Effect of high temperature onfruit-set in tomato cultivars and selected germplasm. Hort. Sci. 23:606-608.

Firona N., R. Shakeda, M.M. Peetb, D.M Pharrb, E. Zamskic, K. Rosenfelda, L. Althana and E. Pressmana. 2006. Pollen grains of heat tolerant tomato cultivars retain higher carbohydrate concentration under heat stress conditions. Scientia Horticulturae vol.109 (3):212–217.

Hanna, H.Y. and T.F. Hernandez. 1982. Response of six tomato genotypes under summer and spring weather conditions in Louisiana. Hort. Sci. 17(5) :758-769.

Iwahori S. 1965. High temperature injuries in tomato. IV. Development of normal flower buds and morphological abnormalities of flower buds treated with high temperature. J. Japan Soc. Hort. Sci (34):33-41.

Lohara D.P. and W.E Peatb. 1998. Floral characteristics of heat-tolerant and heat-sensitive tomato (*Lycopersicon esculentum* Mill.) cultivars at high temperature. Scientia Horticulturae vol.73(1):53–60.

S. Sato, M. M. Peet, J. F. Thomas. 1991. Physiological factors limit fruit set of tomato (*Lycopersicon esculentum* Mill.) under chronic, mild heat stress. JASHS. vol. 116(6):1113-1116.

Stommel, J.R. 2005. USDA 02L1058 and 02L1059: Cherry tomato breeding lines with high fruit  $\beta$ -carotene content. HortScience 40: 1569-1570.

## 11. ภาคผนวก



ภาพผนวกที่ 1 การเตรียมแปลงก่อนปลูกมะเขือเทศใหม่จะปลูกปอเท่องเพื่อตัดวงจรชีวิตของไส้เดือนฝอย



ภาพผนวกที่ 2 การเพาะเมล็ดมะเขือเทศเบอร์ที่คัดเลือก เบอร์ล 10 ต้น



ภาพพนวกที่ 3 ต้นกล้ามache เขื่อเทศที่อายุ 10 วันหลังเพาะเมล็ด ซึ่งพร้อมที่จะย้ายปลูกลงถุงเพาะชำขนาดใหญ่ สำหรับการปลูกในโรงเรือน



ภาพพนวกที่ 4 การทำคันดินเพื่อกลบปุ่ย ครั้งที่ 1 และคลุมฟางข้าวแห้งเพื่อกำจัดวัชพืช รักษาความชื้นในดิน



ภาพพนวกที่ 5 การปลูกมache เขื่อเทศในแปลงช่วงฤดูฝน (ซ้าย) และการผสมตัวเองของต้นที่คัดเลือก (ขวา)



ภาพพนวกที่ 6 การทำค้างมะเขือเทศตามลักษณะการเจริญเติบโตแบบทดสอบเลี้ยงของมะเขือเทศกลุ่มเซอร์รี



ภาพพนวกที่ 7 ผลมะเขือเทศแต่ก้าดีง่ายในการปลูกช่วงฤดูฝน



ภาพพนวกที่ 8 มะเขือเทศกลุ่มสีดา (ซ้าย) และ กลุ่มเซอร์รี (ขวา) ที่สามารถให้ผลผลิตได้ดีในการปลูกช่วงฤดูฝน



ภาพพนวกที่ 9 มะเขือเทศกลุ่มสีดา (ซ้าย) และ กลุ่มเชอร์รี่ (ขวา) ที่สามารถให้ผลผลิตได้ดีในการปลูกช่วงฤดูฝน



ภาพพนวกที่ 10 มะเขือเทศกลุ่มสีดาที่มีใบปีกคลุ่มขณะผลสุกจะมีผลสีเข้ม (#183) และใบเที่ยวแห้งขณะผลสุกผลจะโคนเดดทำให้สีซีดขาว (#169-1-4)



ภาพพนวกที่ 11 ต้นมะเขือเทศปลูกในโรงเรือน ที่อายุ 30 วันหลังเพาะเมล็ด



ภาพพนวกที่ 12 ต้นมะเขือเทศกลุ่มในโรงเรือน ทำการผสานเกษตรระหว่างเบอร์ เพื่อเตรียมเมล็ดพันธุ์ใช้ทดสอบ สมรรถนะการรวมตัวเฉพาะ (SCA) มีอุณหภูมิระหว่างผสานเกษตรค่อนข้างสูง ที่กกลางวันเฉลี่ย 36.45 องศา เชลเซียส และกลางคืนเฉลี่ย 29.41 องศาเซลเซียส



ภาพพนวกที่ 13 มะเขือเทศกลุ่มเซอร์รีมัคแสดงอาการมีจำนวนดอกต่อช่อมากแต่มีเปอร์เซ็นต์การติดผลน้อย (ซ้าย) หรือจำนวนผลที่สมบูรณ์ในช่อน้อย (ขวา)




ภาพพนวกที่ 14 กลีบดอกมะเขือเทศไม่ร่วงและรัดผลอ่อนทำให้ผลมีรูปร่างผิดปกติจากลักษณะประจำพันธุ์ (ซ้าย) และอาการผลขาดแคลเซียม (ขวา) โดยจะแสดงอาการบริเวณส่วนปลายของผล



ภาพพนวกที่ 15 การปลูกมะเขือเทศในโรงเรือนมักพบผลมะเขือเทศที่มีเมล็ดลีบในกลุ่มเชอร์รี่ (ซ้าย) และผลที่ไม่สร้างเมล็ดในกลุ่มแปรรูป (ขวา)



ภาพพนวกที่ 16 ต้นมะเขือเทศที่คัดเลือกปลูกในโรงเรือนและทำการทดสอบเพื่อนำไปทดสอบสมรรถนะการรวมตัวเฉพาะ (SCA) หลังจากน้ำท่วมในโรงเรือนสูง 0.5 เมตร เป็นเวลา 10 วัน ต้นเดือนตุลาคม 2556



ภาพพนวกที่ 17 ลูกผสานมะเขือเทศเพื่อนำมาเมล็ดไปทดสอบสมรรถนะการรวมตัวเฉพาะ (SCA) ในสภาพแปลง



ภาพพนวกที่ 18 คู่ผสานทดสอบสมรรถนะการรวมตัวเฉพาะ (SCA) ของมะเขือเทศเบอร์ที่มีลักษณะทางการเกษตรดี

ตารางผนวกที่ 1 เกณฑ์การคัดเลือกมะเขือเทศและจัดกลุ่มตามประโยชน์การใช้งาน

ลำดับที่	เกณฑ์การคัดเลือก	วิธีการคัดเลือก	รายละเอียด
1	รูปแบบการเจริญเติบโต	การเจริญเติบโตของลำต้น ณ วันออกบาน 50 % แบ่งเป็น 4 กลุ่ม	1 เตี้ย (Dwarf) 2 ไม่ทอดเลี้ยง (Determinate) 3 กึ่งทอดเลี้ยง (Semi-determinate) 4 ทอดเลี้ยง (Indeterminate)
2	ความสมบูรณ์ของทั้งต้น	พิจารณาจากทั้ง 10 ต้น/ เบอร์ ให้คะแนน 1 - 3	1 มีความสมบูรณ์ต้นไม่ดี 2 มีความสมบูรณ์ต้นปานกลาง 3 มีความสมบูรณ์ต้นดี
3	ความเร็วออกบาน 50 %	พิจารณาจากทั้ง 10 ต้น/ เบอร์ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม	1 นานเร็ว (< 10 วันหลังปลูก) 2 นานปานกลาง (10 – 20 วันหลัง ปลูก) 3 นานช้า (> 20 วันหลังปลูก))
4	ความสมำเสมอ (uniform)	พิจารณาจากทั้ง 10 ต้น/ เบอร์	1 ไม่สมำเสมอ 2 สมำเสมอ
5	ชนิดของผล / การใช้ ประโยชน์	จัดกลุ่มตามการใช้ประโยชน์ ได้ 5 กลุ่ม	1 กลุ่มเชอร์รี่ (12 - 15 กรัม) 2 กลุ่มสีดา (สีชมพู รสเปรี้ยว) 3 กลุ่มทานสด ผลใหญ่ (> 40 กรัม) 4 กลุ่มแปรรูป (โรงงาน) 5 กลุ่มต้นตอ
6	สีของผิวเปลือกผล	ระบุเป็นสี	-
7	ความดก	พิจารณาจากทั้ง 10 ต้น/ เบอร์ให้คะแนน 1 – 3	1 ไม่ดก 2 ดกปานกลาง 3 ดกมาก
8	ความแน่นเนื้อ	พิจารณาจากทั้ง 10 ต้น/ เบอร์ให้คะแนน 1 – 3	1 ความแน่นเนื้อ $< 0.30 \text{ kg/m}^2$ 2 ความแน่นเนื้อ $0.30 - 0.40 \text{ kg/m}^2$ 3 ความแน่นเนื้อ $> 0.40 \text{ kg/m}^2$
9	ค่า TSS ( $^{\circ}\text{brix}$ )	วัดค่าด้วย Refractometer จากผลสุกเต็มที่ จำนวน 3 ผล	- กลุ่มเชอร์รี่ต้องการ $> 8 \text{ }^{\circ}\text{brix}$ - กลุ่มรับประทานผลสดต้องการ $> 4 \text{ }^{\circ}\text{brix}$ - กลุ่มสีดาต้องการ $3 - 4 \text{ }^{\circ}\text{brix}$ - กลุ่มแปรรูปต้องการ $> 4 \text{ }^{\circ}\text{brix}$

# เอกสารผนวกที่ 1 แบบบันทึกลักษณะสัณฐานและลักษณะเกษตรของมะเขือเทศ

Descriptors for Tomato (*Lycopersicon spp.*)

เบอร์ .....

## CHARACTERIZATION

ลักษณะสังเกต (เติบโตเร็ว/ช้า แต่งกิ่งมาก ออกรดออกเร็ว/ช้า ทนโรค ทนแล้ง ทนฝน การตอบสนองต่อปุ๋ย รสชาติดี เป็นต้น)

ลักษณะดีเด่น .....

### คำอธิบายลักษณะประจำพันธุ์

#### 1. การเติบโตทางลำต้น

##### 1.1 ต้นกล้า บันทึกเมื่อใบบูรพาแตกเต็มที่และปลายยอดยาวประมาณ 5 มิลลิเมตร

1.1.1 สีลำต้นส่วนใต้ใบเลี้ยง :

1 สีเขียว / 2 สีม่วง ¼ จากพื้นดิน / 3 สีม่วง ½ จากพื้นดิน / 4 สีม่วง

1.1.2 ความเข้มของสีลำต้นส่วนใต้ใบเลี้ยง :

3 ตื้า / 5 กลาง / 7 สูง

1.1.3 ขนาดริเวณลำต้นใต้ใบเลี้ยง :

0 ไม่มี / 1 มี

1.1.4 ความหนาแน่นของขนบนลำต้น :

3 ประปะรย / 5 ปานกลาง / 7 หนาแน่น

1.1.5 ความยาวใบเลี้ยง (มม.) จำนวน 10 ใน จาก 10 ต้น :

เฉลี่ย

1.1.6 ความกว้างใบเลี้ยง (มม.) จำนวน 10 ใน จาก 10 ต้น :

เฉลี่ย

##### 1.2 ลักษณะต้นพืช บันทึกเมื่อผลซึ่ง 2 และ 3 เริ่มสุก

ลำต้น 1.2.1 รูปแบบการติด Moto สังเกตหั้งแปลงหลังจากมีการตัดแต่งกิ่งล่างออกแล้ว :

1 ต้นตี้ / 2 ไม่ต้อดยอด / 3 กิ่งยอดยอด / 4 ยอดยอด

1.2.2 ขนาดต้นพืช วัดรอบของลำต้นระหว่างข้อของใบเลี้ยงและข้อของใบจริงใบแรก (10 ต้น) :

เฉลี่ย

3 ขนาดเล็ก (< 4 ซม.) / 5 ขนาดกลาง (4-5 ซม.) / 7 ขนาดใหญ่ (> 5 ซม.)

1.2.3 ความสูงต้น ณ วันดอกแรกบาน สูง 10 ต้น วัดจากข้อของใบเลี้ยงถึงบุปลายยอดที่สูงสุด :

เฉลี่ย

3 สั้น (<50 ซม.) / 5 ปานกลาง (50-100 ซม.) / 7 ยาว (>100 ซม.)

1.2.4 ความกว้างทรงทั่วไป ณ วันดอกแรกบาน สูง 10 ต้น วัดส่วนของใบที่กว้างที่สุด :

เฉลี่ย

3 สั้น (<50 ซม.) / 5 ปานกลาง (50-100 ซม.) / 7 ยาว (>100 ซม.)

1.2.5 ความหนาแน่นของขนบนลำต้น :

3 ประปะรย / 5 ปานกลาง / 7 หนาแน่น

1.2.6 ความยาวของปล้อง ปล้องที่เป็นจุดกำหนดของช่องช่องดอกแรก :

เฉลี่ย

3 สั้น (<7 ซม.) / ปานกลาง (7-8 ซม.) / ยาว (> 8 ซม.)

ใบ

1.2.7 ความหนาแน่นของใบ :

3 ประปะรย / 5 ปานกลาง / 7 หนาแน่น

1.2.8 จำนวนใบต่อช่อดอกแรก :

เฉลี่ย

3 น้อย / 7 มาก

1.2.9 พิเศษของใบ :

3 กิ่งตี้ / 5 แൺราบ / 7 ห้อยลง

1.2.10 รูปทรงของใบ (ใบจากข้อต้นที่ไปจากช่อดอกแรก นับจำนวน 10 ใบ) :

1 Dwarf / 2 Potato leaf type / 3 Standard / 4 Peruvianum / 5 Pimpinellifolium / 6 Hirsutum / 7 อื่นๆ (ระบุ)

1.2.11 สีของแผ่นใบ :

1 เขียวเข้ม / 2 เขียว / 3 เขียวอ่อน / 9 อื่นๆ (ระบุ)

เฉลี่ย

1.2.12 จำนวนใบเยื่อย :

1 จำนวน 3 ใบ / 2 จำนวน 5 ใบ / 3 จำนวน 7 ใบ หรือมากกว่า

1.2.13 ความกว้างของใบ ส่วนที่กว้างที่สุด :

เฉลี่ย

1 แคบ (< 5 ซม.) / 2 ปานกลาง (5-10) / 3 กว้าง (> 10 ซม.)

1.2.14 ความยาวของใบ จากโคนก้านใบไปถึงปลายใบ :

เฉลี่ย

1 สั้น (<10 ซม.) / 2 ปานกลาง (10-20 ซม.) / 3 ยาว (>20 ซม.)

1.2.15 ใบแรกบนแกนกลางใบ :

1 มี / 2 ไม่มี

#### 2 ช่อดอกและผล

##### 2.1 ลักษณะช่อดอก บันทึกข้อมูลจำนวน 1 ดอกของแต่ละช่อดอก จาก 10 ต้น โดยเลือกช่อดอกที่ 2 หรือ 3

2.1.1 ชนิดของช่อดอก สังเกตช่อดอกที่ 2 หรือ 3 จำนวน 10 ต้น :

1 Generally uniparous / 2 Both (partly uniparous, partly multiparous) / 3 Generally multiparous

2.1.2 จำนวนกลีบดอก นับจำนวน 10 ดอก จาก 10 ต้น :

เฉลี่ย

2.1.3 สีของวงกลีบดอก :

- 1 ขาว / 2 เหลือง / 3 ส้ม / 4 อิฐๆ (ระบุ) \_\_\_\_\_
- 2.1.4 รูปแบบของวงกลีบดอกขณะบาน : \_\_\_\_\_ เนื่องด้วย \_\_\_\_\_  
1 ปีติ / 2 เปิด
- 2.1.5 ความยาวกลีบดอก (มม.) ใช้จำนวน 1 กลีบต่อดอกต่อต้น จำนวน 10 ต้น : \_\_\_\_\_ เนื่องด้วย \_\_\_\_\_
- 2.1.6 ความยาวกลีบเลี้ยง (มม.) ใช้จำนวน 1 กลีบต่อดอกต่อต้น จำนวน 10 ต้น : \_\_\_\_\_ เนื่องด้วย \_\_\_\_\_
- 2.1.7 ตำแหน่งก้านเกรสเพเมีย เทียบกับตำแหน่งของเกรสเพคผู้ จำนวน 1 ดอกต่อต้น จำนวน 10 ต้น :  
1 อุยต์ต่ำกว่าเกรสเพคผู้ / 2 อุยต์ระดับเดียวกับเกรสเพคผู้ / 3 อุยต์สูงกว่าเกรสเพคผู้ / 4 อุยต์สูงกว่าเกรสเพคผู้มาก
- 2.1.8 รูปร่างก้านชูเกรสเพเมีย :  
1 ปกติ / 2 แผลบน / 3 หยักกลีบ
- 2.1.9 ขนาดก้านชูเกรสเพเมีย :  
0 ไม่มี / 1 มี
- 2.1.10 ความยาวก้านนกสรพศัฎ្យ (รวมทั้งก้านชูเกรสเพคผู้และอับลดของเรซู 10 ดอก จาก 10 ต้น) : \_\_\_\_\_ เนื่องด้วย \_\_\_\_\_
- 2.1.11 จำนวนวันสร้างปุ่มติดออก ตั้งแต่เริ่มเพาะเมล็ด จำนวน 10 ดอก จาก 10 ต้น : \_\_\_\_\_ เนื่องด้วย \_\_\_\_\_
- 2.1.12 จำนวนวันดอกแรกบาน ตั้งแต่เริ่มเพาะเมล็ด จำนวน 10 ดอก จาก 10 ต้น : \_\_\_\_\_ เนื่องด้วย \_\_\_\_\_
- 2.1.13 จำนวนวันดอกบาน 50 เปอร์เซ็นต์ต่อแป๊ลง ตั้งแต่เริ่มเพาะเมล็ด :  
1 สั้น (<35 วัน) / 2 ยาว (> 35 วัน)
- 2.2 ลักษณะผล บันทึกข้อมูลจำนวน 3 ผล ของช่อผลที่ 2 หรือ 3 เลือกผลที่โตเต็มที่และได้รับการผสมแบบธรรมชาติ จำนวน 1 ช่อต่อต้น จำนวน 10 ต้น
- 2.2.1 สีผิวของผลขณะผลอ่อน :  
1 เขียวเหลืองขาว / 3 เขียวอ่อน / 5 เขียว / 7 เขียวเข้ม / 9 เขียวเข้มมาก
- 2.2.2 สีเขียวบนไฟล์ผล :  
0 ไม่มี (สีปกติ) / 1 มี (มีสีเขียว ในขณะที่ผลสุกเป็นสีแดง)
- 2.2.3 ความเข้มของสีเขียวบนไฟล์ (ถ้ามี) :  
3 เล็กน้อย / 5 ปานกลาง / 7 เข้ม
- 2.2.4 สีแต้มบนไฟล์ผล :  
0 ไม่มี / 1 มี
- 2.2.5 รูปร่างของไฟล์ผล :  
1 แบน / 3 บุบลีกน้อย / 5 บุบลีปานกลาง / 7 บุบลีมาก
- 2.2.6 ขนาดผิวเปลือกผล :  
3 ประป้าย / 5 ปานกลาง / 7 หนาแน่น
- 2.2.7 รูปร่างผล :  
1 กลมแบน / 2 ค่อนข้างกลมแบน / 3 กลม / 4 กลมสูง / 5 รูปหัวใจ / 6 รูปทรงกรอบกอก / 7 รูปผลแพร์ / 8 รูปทรงรี / 9 อิฐๆ (ระบุ) \_\_\_\_\_
- 2.2.8 ขนาดผล :  
1 เล็กมาก (<3 ซม.) / 2 เล็ก (3-5 ซม.) / 3 ปานกลาง (5.1-8 ซม.) / 4 ใหญ่ (8.1-10 ซม.) / 5 ใหญ่มาก (>10 ซม.)
- 2.2.9 ความเหลือง (ครั้งยัง) ของผลในต้นเดียววัน :  
3 ต่ำ (แปรปรวนมาก) / 5 ปานกลาง (แปรปรวนน้อย) / 7 สูง (ไม่แปรปรวน)
- 2.2.10 น้ำหนักผล :  
1 เบา (<30 กรัม) / 2 ปานกลาง (30-50 กรัม) / 3 หนัก (> 50 กรัม)
- 2.2.11 ความยาวผลที่ระยะสุดแรก : \_\_\_\_\_ เนื่องด้วย \_\_\_\_\_
- 2.2.12 ความกว้างผลที่ระยะสุดแรก วัดส่วนกว้างที่สุดของผล : \_\_\_\_\_ เนื่องด้วย \_\_\_\_\_
- 2.2.13 สีผิวของผลขณะสุก :  
1 เขียว / 2 เหลือง / 3 ส้ม / 4 ชมพู / 5 แดง / 6 อิฐๆ (ระบุ) \_\_\_\_\_
- 2.2.14 ความเข้มของสีผิวของผลขณะสุก :  
3 เล็กน้อย / 5 ปานกลาง / 7 เข้ม
- 2.2.15 รูปร่างผลหลังจากผลเปลี่ยนสี  
1 กลมแบน / 2 ค่อนข้างกลมแบน / 3 กลม / 4 กลมสูง / 5 รูปหัวใจ / 6 รูปทรงกรอบกอก / 7 รูปผลแพร์ / 8 รูปทรงรี / 9 อิฐๆ (ระบุ) \_\_\_\_\_
- 2.2.16 ลายเส้นบนผิวผลสุก :  
0 ไม่มี / 1 มี
- 2.2.17 ลายจุดละลายบนผลสุก :  
0 ไม่มี / 1 มี
- 2.2.18 ริ้วรอยบนผิวผล :  
0 ไม่มี / 1 มี
- 2.2.19 ความเข้มแรงของวงกลีบเลี้ยง (ร่วงร่ายไหน) :  
1 ไม่แรงมาก / 3 ไม่เข้มแรง / 5 ปานกลาง / 7 แข็งแรง
- 2.2.20 ความยาวก้างของผลที่หลุดจากข้าว :  
3 ร่าย / 5 ปานกลาง / 7 ยาว
- 2.2.21 ความยาวก้านผล วัดจากก้านผลต้นที่ติดกับกิ่งของกลีบเลี้ยง : \_\_\_\_\_ เนื่องด้วย \_\_\_\_\_
- 2.2.22 ความยาวก้านผลจากรอยร่อง (abscission layer) ถึงวงกลีบเลี้ยง : \_\_\_\_\_ เนื่องด้วย \_\_\_\_\_
- 2.2.23 การมีหรือไม่มีรอยร่อง (jointless pedicel) :  
0 ไม่มี / 1 มี
- 2.2.24 ความยากง่ายในการลอกเปลือก : \_\_\_\_\_

- 3 ง่าย / 5 ปานกลาง / 7 ยาก
- 2.2.25 สีผิวของเนื้อผลเมื่อสุก หลังจากปอกเปลือกแล้ว : .....  
1 สีเขียว / 2 เหลือง ..... เนลี่ย
- 2.2.26 ความหนาของผนังผล : .....  
3 บาง (<3.0 มม.) / 5 ปานกลาง (3.0-5.0 ซม.) / 7 หนา (>5.0 ซม.) ..... เนลี่ย
- 2.2.27 สีของผนังผลด้านใน : .....  
1 เขียว / 2 เหลือง / 3 ส้ม / 4 ชมพู / 5 แดง / 6 อินๆ (ระบุ) ..... เนลี่ย
- 2.2.28 รูปร่างผลเมื่อตัดตามยาว : .....  
1 กลม / 2 เป็นเหลี่ยม / 3 ไม่สมมาตร ..... เนลี่ย
- 2.2.29 สี/ความเข้มของแกนผล : .....  
1 เขียว / 2 ขาว / 3 จีด / 4 เข้มปานกลาง / 5 เข้ม ..... เนลี่ย
- 2.2.30 ขนาดของแกนกลางผล ผ้าผลตามยาวและวัดส่วนที่กว้างที่สุด : .....  
3 แคบ (<1.0 ซม.) / 5 กลม (1.0-2.0 ซม.) / 7 ใหญ่ (> 2.0 ซม.) ..... เนลี่ย
- 2.2.31 จำนวนช่องว่างภายในผล : ..... เนลี่ย
- 2.2.32 รูปร่างรอยแผลของเกรสรเพคเมีย (ก้นผล) : .....  
1 จุด / 2 รูปดาว / 3 เส้นตรง / 4 ไม่สมมาตร ..... เนลี่ย
- 2.2.33 รูปร่างของก้นผล : .....  
1 เว้า / 2 แบน / 3 แหลม / 4 มน / 5 อินๆ (ระบุ) ..... เนลี่ย
- 2.2.34 ความแน่นของผล บันทึกหลังจากเก็บเกี่ยวผลสุก 10 วัน : .....  
1 อ่อนนุ่ม / 2 ปานกลาง / 3 แข็ง ..... เนลี่ย
- 2.2.35 ค่า TSS บันทึกหลังจากเก็บเกี่ยวผลสุก 10 วัน: ..... เนลี่ย

### 3 เมล็ด

- 3.1 รูปร่างเมล็ด : .....  
1 กลม / 2 รูปไข่ / 3 สามเหลี่ยมปลายแหลม ..... เนลี่ย
- 3.2 น้ำหนัก 1000 เมล็ด : ..... เนลี่ย
- 3.3 สีของเมล็ด : .....  
1 เหลืองอ่อน / 2 เหลืองเข้ม / 3 เทา / 4 น้ำตาล / 5 น้ำตาลเข้ม / 6 อินๆ (ระบุ) ..... เนลี่ย
- 3.4 อายุเก็บเกี่ยว ตั้งแต่เริ่มออกเป็นต้นกล้าถึง 50 % ของต้นที่ปลูกมีผลสุกอย่างน้อย 1 ผล : .....  
1 พันธุ์บنا (<50 วัน) / 2 พันธุ์กลาง (51-70 วัน) / 3 พันธุ์หนัก (>70 วัน) ..... เนลี่ย

**ลักษณะทางการเกษตร** 1) คลุนช่อดอกที่ 2 หรือ 3 จำนวน 1 ช่อในต้นที่คัดเลือก (หรืออย่างน้อย 3 ดอกเพื่อให้ได้ 3 ผล)  
2) เก็บข้อมูลจาก 10 ต้น

- |   |                   |       |        |
|---|-------------------|-------|--------|
| 1 | จำนวนดอกต่อช่อ    | ..... | เนลี่ย |
| 2 | จำนวนช่อดอกต่อต้น | ..... | เนลี่ย |
| 3 | จำนวนผลต่อช่อ     | ..... | เนลี่ย |
| 4 | จำนวนผลต่อต้น     | ..... | เนลี่ย |
| 5 | น้ำหนักผลต่อต้น   | ..... | เนลี่ย |