

## ข้อมูลพืชสำหรับการพยากรณ์และเตือนภัยศัตรูพืชสำหรับพืชที่ สวพ. 2

### ชนิดพืช ทุเรียน

เดือน	ระยะพืช	ศัตรูพืชที่พบ	ลักษณะอาการที่อาจพบ	แนวทางในการป้องกันกำจัดในพื้นที่
พฤษภาคม	เก็บเกี่ยว	เพลี้ยแป้ง	<p>ดูดกินน้ำเลี้ยงจากบริเวณกิ่ง ซึ่งออกผลอ่อน ผลแก่ โดยมีเม็ดช่วยคาดพ้าไปตามส่วนต่าง ๆ ของพืช ส่วนที่ถูกทำลายจะแคระแกร็น และจะมีการเริบโต นอกจากนี้ เพลี้ยแป้งจะขับน้ำหวานออกมาก เป็นเหตุให้ราดเข้าทำลายช้ำ ถ้าเพลี้ยแป้งเข้าทำลายทุเรียนผลเล็ก จะทำให้ผลแคระแกร็นไม่เริบโตต่อไป แต่ถ้าเป็นทุเรียนผลใหญ่จะไม่มีความเสียหายต่อเนื้อของทุเรียน แต่ทำให้คุณภาพของผลทุเรียนเสียไป</p> 	<ol style="list-style-type: none"> <li>หากพบเพลี้ยแป้งระบาดเล็กน้อยให้ตัดส่วนที่ถูกทำลายทิ้ง</li> <li>เมื่อพบเพลี้ยแป้งปริมาณน้อยบนผลทุเรียนใช้เ喷ปปิด หรือใช้น้ำพ่นให้เพลี้ยแป้งหลุดไป หรือการใช้น้ำผสมไวร์ตอร์อยล์ 67% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ช่วยในการกำจัดเพลี้ยแป้งได้ดี</li> <li>เนื่องจากเพลี้ยแป้งแพร่ระบาดโดยมีเม็ดพาไป การป้องกันโดยใช้ผ้าชุบสารฆ่าแมลง เช่น มาลาไท้อน 83% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ คาร์บาริล 85% WP อัตรา 10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นไว้ตามกิ่งสามารถป้องกันไม่ให้เม็ดควบเพลี้ยแป้งไปยังส่วนต่าง ๆ ของทุเรียน และต้องซุบสารฆ่าแมลงข้าวทุก 10 วัน หรือการพ่นสารฆ่าแมลงไปที่โคนต้น จะช่วยป้องกันมดและลดการเข้าทำลายของเพลี้ยแป้งได้มาก</li> <li>ใช้สารฆ่าแมลง คาร์บาริล 85% WP อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเฉพาะท้นที่พบเพลี้ยแป้งทำลาย</li> </ol>

กรมวิชาการเกษตร

## ข้อมูลพืชสำหรับการพยากรณ์และเตือนภัยศัตรูพืชสำหรับพืชที่ สวพ. 2

### ชนิดพืช ทุเรียน

เดือน	ระยะพืช	ศัตรูพืชที่พบ	ลักษณะอาการที่อาจพบ	แนวทางในการป้องกันกำจัดในพื้นที่
พฤษภาคม	เก็บเกี่ยว	หนอนเจ้าผล	<p>เข้าทำลายทุเรียนตั้งแต่ผลเล็ก อายุประมาณ 2 เดือน จนถึงผลใหญ่ทำให้ผลเป็นแผล อาจเป็นผลให้ผลเน่า และร่วงเนื่องจากเชื้อราเข้าทำลายซ้ำ การที่ผลมีรอยแมลงทำลายทำให้ขายไม่ได้ราคา ถ้าหากหนอนเจ้ากินเข้าไปจนถึงเนื้อผล ทำให้บริเวณดังกล่าวเน่าเนื่องจากสุก ภายนอกผลทุเรียนจะสังเกตเห็นมูกและรังของหนอนได้อย่างชัดเจน และจะมีน้ำไหลเยิ่มเมื่อทุเรียนใกล้แก่ ผล ทุเรียนที่อยู่ชิดติดกันหนอนจะเข้าทำลายมากกว่าผลที่อยู่เดียว ๆ เพราะแมลงเสือชอบวางไข่บริเวณรอยสัมผัสเนื้อ</p>    	<ol style="list-style-type: none"> <li>หมั่นตรวจสอบทุเรียน เมื่อพบรอยทำลายของหนอน ให้ใช้มีหือลดวงแข็งเขี้ยวหันหนอนออกมาทำลาย</li> <li>ผลทุเรียนที่เน่าและร่วง เพราะถูกหนอนทำลายควรเก็บทำลายโดยการเผาไฟหรือฝัง</li> <li>ตัดแต่งผลทุเรียนที่มีจำนวนมากเกินไป โดยเฉพาะผลที่อยู่ติดกันควรใช้กิ่งไม้หรือกابมะพร้าวคั้นระหว่างผล เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเต็มวัยวางไข่หรือตัวหนอนเข้าหลบอาศัย</li> <li>การห่อผลด้วยถุงมุ้งในล่อน ถุงรีเมค หรือถุงพลาสติกสีขาวขุ่นเจาะรูที่บริเวณขอบล่าง เพื่อให้หยดน้ำร้ายออก โดยเริ่มห่อผลตั้งแต่ผลทุเรียนมีอายุ 6 สัปดาห์ เป็นต้นไป จะช่วยลดความเสียหายได้</li> <li>สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพเมื่อจำเป็นต้องใช้ เช่น แอลมเบค-ไซยาโลทริน 2.5% EC ยัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเฉพาะส่วนผลทุเรียนที่พบรการทำลายของหนอนเจ้าผล</li> </ol>

**กรมวิชาการเกษตร**