


- ความต้านทานต่ำ - อัตราการตาย ค่อนข้างสูง-สูงมาก = เปอร์เซ็นต์ด้วงหมัดฝักตาย 60-100%
- ความต้านทานปานกลาง - อัตราการตาย ปานกลาง-ค่อนข้างต่ำ = เปอร์เซ็นต์ด้วงหมัดฝักตายคาบเกี่ยว 0-40%, 40-60% หรือ 60-100%
- ความต้านทานสูง - อัตราการตาย ต่ำ-ต่ำมาก = เปอร์เซ็นต์ด้วงหมัดฝักตาย 0-40%

การตอบสนองต่อสารกำจัดแมลงชนิดต่าง ๆ ต่อการตายของด้วงหมัดฝักที่ทำลายพืชผักตระกูลกะหล่ำ
ในแหล่งปลูกจังหวัดกาญจนบุรี ในปี พ.ศ.2568



- ความต้านทานต่ำ - อัตราการตาย ค่อนข้างสูง-สูงมาก = เพอร์เซ็นต์ด้วงหมัดฝักตาย 60-100%
- ความต้านทานปานกลาง - อัตราการตาย ปานกลาง-ค่อนข้างต่ำ = เพอร์เซ็นต์ด้วงหมัดฝักตายคาบเกี่ยว 0-40%, 40-60% หรือ 60-100%
- ความต้านทานสูง - อัตราการตาย ต่ำ-ต่ำมาก = เพอร์เซ็นต์ด้วงหมัดฝักตาย 0-40%

การตอบสนองต่อสารกำจัดแมลงชนิดต่าง ๆ ต่อการตายของด้วงหมัดฝักที่ทำลายพืชผักตระกูลกะหล่ำ
ในแหล่งปลูกจังหวัดนครปฐมในปี พ.ศ.2568




- ความต้านทานต่ำ - อัตราการตาย ค่อนข้างสูง-สูงมาก = เปอร์เซ็นต์ด้วงหมัดฝักตาย 60-100%
- ความต้านทานปานกลาง - อัตราการตาย ปานกลาง-ค่อนข้างต่ำ = เปอร์เซ็นต์ด้วงหมัดฝักตายคาบเกี่ยว 0-40%, 40-60% หรือ 60-100%
- ความต้านทานสูง - อัตราการตาย ต่ำ-ต่ำมาก = เปอร์เซ็นต์ด้วงหมัดฝักตาย 0-40%

การตอบสนองต่อสารกำจัดแมลงชนิดต่าง ๆ ต่อการตายของด้วงหมัดฝักที่ทำลายพืชผักตระกูลกะหล่ำ
ในแหล่งปลูกจังหวัดเพชรบูรณ์ในปี พ.ศ.2568



- ความต้านทานต่ำ - อัตราการตาย ค่อนข้างสูง-สูงมาก = เปอร์เซ็นต์ด้วงหมัดฝักตาย 60-100%
- ความต้านทานปานกลาง - อัตราการตาย ปานกลาง-ค่อนข้างต่ำ = เปอร์เซ็นต์ด้วงหมัดฝักตายคาบเกี่ยว 0-40%, 40-60% หรือ 60-100%
- ความต้านทานสูง - อัตราการตาย ต่ำ-ต่ำมาก = เปอร์เซ็นต์ด้วงหมัดฝักตาย 0-40%

การตอบสนองต่อสารกำจัดแมลงชนิดต่าง ๆ ต่อการตายของด้วงหมัดฝักที่ทำลายพืชฝักตระกูลกะหล่ำ
ในแหล่งปลูกจังหวัดเชียงรายในปี พ.ศ.2568



- ความต้านทานต่ำ - อัตราการตาย ค่อนข้างสูง-สูงมาก = เปอร์เซ็นต์ด้วงหมัดฝักตาย 60-100%
- ความต้านทานปานกลาง - อัตราการตาย ปานกลาง-ค่อนข้างต่ำ = เปอร์เซ็นต์ด้วงหมัดฝักตายคาบเกี่ยว 0-40%, 40-60% หรือ 60-100%
- ความต้านทานสูง - อัตราการตาย ต่ำ-ต่ำมาก = เปอร์เซ็นต์ด้วงหมัดฝักตาย 0-40%

การตอบสนองต่อสารกำจัดแมลงชนิดต่าง ๆ ต่อการตายของด้วงหมัดฝักที่ทำลายพืชผักตระกูลกะหล่ำ
ในแหล่งปลูกจังหวัดหนองบัวลำภูในปี พ.ศ.2568



- ความต้านทานต่ำ - อัตราการตาย ค่อนข้างสูง-สูงมาก = เปอร์เซ็นต์ด้วงหมัดฝักตาย 60-100%
- ความต้านทานปานกลาง - อัตราการตาย ปานกลาง-ค่อนข้างต่ำ = เปอร์เซ็นต์ด้วงหมัดฝักตายคาบเกี่ยว 0-40%, 40-60% หรือ 60-100%
- ความต้านทานสูง - อัตราการตาย ต่ำ-ต่ำมาก = เปอร์เซ็นต์ด้วงหมัดฝักตาย 0-40%

การตอบสนองต่อสารกำจัดแมลงชนิดต่าง ๆ ต่อการตายของด้วงหมัดฝักที่ทำลายพืชผักตระกูลกะหล่ำ
ในแหล่งปลูกจังหวัดขอนแก่นในปี พ.ศ.2568