



# พรรณไม้งามรอบอาคารพิพิธภัณฑ์พืชสิรินธร

Bangkok Herbarium (BK)

กลุ่มวิจัยพฤกษศาสตร์และพิพิธภัณฑ์พืช  
สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร

รายสัปดาห์ที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

## ลำไยเครือ

ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Dimocarpus longan</i> Lour. var. <i>obtusus</i> (Pierre) Leenh.
ชื่อวงศ์	SAPINDACEAE
ชื่อสามัญ	-
ชื่ออื่น	ลำไยเถา (ภาคตะวันออก), ลำไยเทียน (กรุงเทพฯ)

### ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

เป็นไม้พุ่มรอเลื้อยขนาดใหญ่ สูงได้ถึง 6 เมตร เปลือกลำต้นเรียบ สีน้ำตาล ทรงพุ่มแน่นทึบ ไม่มีรูปร่างที่แน่นอน กิ่งก้านที่แตกมาใหม่จะชูขึ้น ถ้าไม่มีที่เกาะเกี่ยวก็จะงอและห้อยลง ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียว ปลายคู่ ใบย่อยมี 3-5 คู่ ออกเป็นคู่ตรงข้ามกัน ใบย่อยกว้าง 2-3 เซนติเมตร ยาว 4-6 เซนติเมตร รูปร่างใบเป็นรูปรีหรือรูปหอก ส่วนปลายใบและฐานใบค่อนข้างป้าน ใบด้านบนมีสีเขียวเข้ม กว้างด้านล่าง ผิวด้านบนเรียบ ส่วนผิวด้านล่างสากเล็กน้อย ขอบใบเรียบไม่มีหยัก ตัวใบมักม้วนลงไปทางหลังใบตามยาวของตัวใบ ดอกออกเป็นช่อแยกแขนงที่ปลายยอด และอาจเกิดจากตาข้าง ช่อดอกยาวประมาณ 20-30 เซนติเมตร มีดอกย่อยขนาดเล็กจำนวนมาก ดอกสีขาวหรือขาวอมเหลือง เส้นผ่านศูนย์กลางดอก 6-8 มิลลิเมตร ผลลำไยเถามีรูปทรงกลมหรือทรงแป้นเล็กน้อย เส้นผ่านศูนย์กลางผล 2.5 -3.5 เซนติเมตร ผลแก่มีสีเขียวปนน้ำตาลหรือสีน้ำตาลอมชมพู ผิวเปลือกบาง เรียบ มีตุ่มเล็กๆ ปกคลุมที่ผิวเปลือกด้านนอก เนื้อบาง ฉ่ำน้ำ รสหวาน เมล็ดมีลักษณะกลม เส้นผ่านศูนย์กลางเมล็ด 1.5 - 2.0 เซนติเมตร ผิวมัน สีน้ำตาลเข้มจนถึงดำ ส่วนของเมล็ดที่ติดกับข้าวผล มีลักษณะเป็นวงกลมสีขาว ซึ่งเป็นตำแหน่งที่แทงออกมาของต้นกล้า

### การกระจายพันธุ์

ในประเทศไทยพบในเขตจังหวัดสุรินทร์และชลบุรี (เกาะเสม็ดสาร)

### สภาพนิเวศวิทยา

ขึ้นตามป่าละเมาะ ไร่ร้างทะเล และบนพื้นที่โล่งชายป่าดิบแล้ง  
ระดับความสูง 0-200 เมตร ออกดอกเดือน เมษายน-มิถุนายน  
ผลเดือน พฤษภาคม-กันยายน



### การใช้ประโยชน์

เป็นพืชหายาก

