



กระดานขาว

งานวิจัย ใช้ได้จริง :

พืชอาหาร พืชสมุนไพร

มะเขือพวง

จะเคาะคะ, ตะโกงลาโน, ปอลอ, ปอลือ, มะเขือละคร, มะแคว้งกั่ว, มะแคว้งกุลา, มะแคว้ง, มะแคว้งข้าง, รับจกกลม, หมากคั่ง

Solanum torvum Sw.

Devil's fig, Prickly nightshade, Turkey berry, Pea aubergine

Family SOLANACEAE

ไม้พุ่มสูง 0.4-2 เมตร ลำต้นและกิ่งก้านเมื่อยังอ่อน พบขนรูปดาวหนาแน่น และมีหนามประปราย ลักษณะของหนามสั้นตรงและเรียวยาว 0.5-0.6 เซนติเมตร เมื่อต้นเจริญเต็มที่พบหนามรูปโค้งประปราย ใบเดี่ยว เรียงสลับ ก้านใบยาว 1-6 เซนติเมตร พบขนรูปดาวหนาแน่น และหนามประปราย แผ่นใบกว้าง 2.8-18 เซนติเมตร ยาว 4.5-19 เซนติเมตร รูปรีกกว้าง หรือ รูปไข่ ส่วนใหญ่มีลักษณะไม่สมมาตร โคนใบเฉียง หรือตัด หรือคล้ายหัวใจ ขอบใบหยักข้างละ 2 หยัก แต่ละหยักลึก 0.5-1.5 เซนติเมตร หรือขอบใบค่อนข้างเรียบ ปลายใบแหลม ที่ผิวใบด้านบนพบขนรูปดาวประปราย ส่วนที่ผิวใบด้านล่างพบขนรูปดาวหนาแน่น พบหนามประปราย หรือไม่พบ ดอกช่อเชิงหลั่น ดอกย่อยมีก้านยาวไม่เท่ากัน เรียงสลับบน แกนกลาง ดอกย่อยด้านนอกช่อมีก้านยาวมากที่สุด ดอกย่อยถัดไปในช่อ มีก้านสั้นลดหลั่นจนถึงกลางช่อ ช่อดอกยาว 2-5 เซนติเมตร ก้านช่อยาว 0.2-4 เซนติเมตร พบขนรูปดาวหนาแน่น ดอกย่อยขาว ประกอบด้วย ก้านดอกย่อยยาว 0.6-0.9 เซนติเมตร วงกลีบเลี้ยง ปลายแยก 5 แฉก แต่ละแฉกลึก 0.3-0.4 เซนติเมตร รูปหอกแกม รูปไข่แคบ พบขนประปราย วงกลีบดอกเชื่อมกันปลายแยก 5 แฉก แต่ละแฉกลึกประมาณ 0.3 เซนติเมตร เกสรเพศผู้ 5 อัน เกสรเพศเมีย 1 อัน อยู่เหนือวงกลีบ ผลกลม ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีเหลือง เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5-1.3 เซนติเมตร ก้านผลยาว 1-1.5 เซนติเมตร เมล็ดรูปกลม ขนาด ประมาณ 0.2 เซนติเมตร

มีถิ่นกำเนิด และการกระจายพันธุ์บริเวณเขตร้อนทั่วโลก การใช้ประโยชน์ ผลอ่อนรับประทานกับน้ำพริก หรือใส่แกง

